



ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

27 Απριλίου 2023

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2838

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Γ2δ/7414

Τροποποίηση της υπ' αρ. 77213/2017 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και τρόπος αποστολής στοιχείων διοικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές στην Ανώνυμη Εταιρεία Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.)» (Β' 3699).

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο δεύτερο του ν. 4286/2014 «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων- σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη εταιρεία»-Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (Α' 194).

2. Το π.δ. 68/2021 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρώτριας Υπουργού και Υφυπουργών» (Α' 155).

3. Το π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α' 148).

4. Την υπό στοιχεία Υ32/09-09-2021 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας, Ασημίνα Γκάγκα» (Β' 4185).

5. Την υπ' αρ. 10748/2021 υπουργική απόφαση, με θέμα «Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Διεθνούς Στατιστικής

Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας (ICD-International Classification of Diseases)» (Β' 782).

6. Την υπ' αρ. 82848/2021 υπουργική απόφαση, με θέμα «Έκδοση Καταλόγου Κωδικών της Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων» (Β' 814).

7. Το υπ' αρ. 56/2023 έγγραφο της ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.

8. Την υπ' αρ. 22670/2023 εισήγηση της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

9. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Την τροποποίηση της υπ' αρ. 77213/2017 υπουργικής απόφασης «Διαδικασία και τρόπος αποστολής στοιχείων διοικητικού και ιατρικού φακέλου ασθενών από τα δημόσια νοσοκομεία και τις ιδιωτικές κλινικές στην Ανώνυμη Εταιρεία Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. Α.Ε.)» (Β' 3699) ως εξής:

Στο άρθρο 1 με τίτλο «Στοιχεία από τον διοικητικό και ιατρικό φάκελο ασθενή και περιεχόμενο αρχείων ανά ασθενή» προστίθεται παράγραφος Β και η παράγραφος με τίτλο «Προϋποθέσεις υλοποίησης» θεωρείται παράγραφος Α. Η παράγραφος Β έχει ως κατωτέρω:

Β. Η καταχώρηση των κωδικών του καταλόγου της Ελληνικής Τροποποίησης της Διεθνούς Ταξινόμησης Διαγνώσεων Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας ICD-10-GrM, όπως ισχύει (σχετικό 2), και του καταλόγου της Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων (σχετικό 3), όπως ισχύει, γίνεται με βάση τις «Γενικές και Ειδικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης Νοσημάτων και Ιατρικών Πράξεων» του παρ. Δ της παρούσας.

Ε.
Κ.
Ο.
Κ.

Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης

1^η Έκδοση

Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης
Νοσοκομειακών Υπηρεσιών
Αθήνα

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Επιμέλεια έκδοσης: Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών
(ΚΕΤΕΚΝΥ)

1^η Έκδοση

© για την Ελληνική έκδοση: ΚΕΤΕΚΝΥ, 2019

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης, 1^η Έκδοση

Το Σύστημα Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών (Συ.Κ.Ν.Υ.) ή, εφεξής, Ελληνικό Σύστημα DRG, επί τη βάση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αποζημίωσης ανά περιστατικό νοσηλείας εισήχθη στον χώρο της υγείας με τον νόμο 4286/2014, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. Αποσκοπεί στην ορθολογική κατανομή των διαθέσιμων για νοσοκομειακή περίθαλψη πόρων και βασίζεται στην ταξινόμηση των περιστατικών σε Διαγνωστικά Ομοιογενείς Ομάδες (Diagnosis Related Groups, DRG), ανάλογα με τα ειδικά δημογραφικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά χαρακτηριστικά των νοσηλευόμενων ασθενών, όπως αυτά καταχωρίζονται με εξειδικευμένα συστήματα κωδικοποίησης.

Για να επιτευχθεί η διαφανής και δίκαιη αποζημίωση των νοσοκομειακών μονάδων, ανάλογα με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι κλινικά παρόμοιες νοσηλείες ταξινομούνται στο ίδιο DRG και, επομένως, αποζημιώνονται κατά τον ίδιο τρόπο. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο αν η ταξινόμηση των νοσηλείων σε DRG βασίζεται σε καταλόγους κωδικοποίησης νοσημάτων και ιατρικών πράξεων οι οποίοι είναι συμβατοί με το σύστημα DRG. Οι κατευθυντήριες οδηγίες ρυθμίζουν και ενισχύουν αυτή τη διαδικασία, ώστε να καθίσταται με σαφή τρόπο η κωδικοποίηση νοσηλείων, ακόμα και για τις πιο πολύπλοκες περιπτώσεις.

Οι Γενικές και Ειδικές Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης βασίστηκαν στις Αυστραλιανές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης (ICD-10-AM, Australian Coding Standards, First Edition, 1998) και στις αντίστοιχες Γερμανικές (German Coding Guidelines, version 2013). Αναφέρονται στη χρήση των συστηματικών καταλόγων και των αλφαβητικών ευρετηρίων του ICD-10-GrM και της Ελληνικής Ταξινόμησης Ιατρικών Πράξεων (ΕΤΙΠ), όπως ισχύουν.

Οι Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης χωρίζονται στα ακόλουθα μέρη:

- Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης
 - Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης διαγνώσεων νόσων
 - Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης ιατρικών πράξεων
- Ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης

Το πρώτο μέρος αποτελείται από γενικές οδηγίες για την κωδικοποίηση διαγνώσεων νόσων και ιατρικών πράξεων. Εμπεριέχει τους ορισμούς της Κύριας και Δευτερεύουσας Διάγνωσης και Οδηγίες για την κωδικοποίηση Ιατρικών Πράξεων. Στις Ειδικές Κατευθυντήριες Οδηγίες περιγράφονται συγκεκριμένες περιπτώσεις που χρησιμεύουν ως παραδείγματα για την καλύτερη κατανόηση των Γενικών Οδηγιών ή που αποτελούν εξαιρέσεις από τις Γενικές Κατευθυντήριες Οδηγίες.

Σε περιπτώσεις απόκλισης μεταξύ των οδηγιών για την χρήση του ICD-10-GrM ή/και της ΕΤΙΠ υπερισχύουν οι Κατευθυντήριες Οδηγίες.

Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες είναι ένα Σύστημα Κανόνων το οποίο υποστηρίζει την ακριβή καταχώριση των ιατρικών δεδομένων, ώστε να επιτευχθεί, μέσω μια αυτοματοποιημένης διαδικασίας, η ταξινόμηση του περιστατικού σε μια ομάδα DRG. Ταυτόχρονα, διασφαλίζουν την ενιαία και με ομοιόμορφο τρόπο κωδικοποίηση παρόμοιων περιστατικών νοσηλείας σε όλες τις νοσοκομειακές μονάδες και ενισχύουν την ποιότητα της κωδικοποίησης.

Η χρήση αναλυτικών Κατευθυντήριων Οδηγιών στις νοσοκομειακές μονάδες της Ελλάδας εφαρμόζεται για πρώτη φορά και απαιτείται ειδική εκπαίδευση και προσαρμογή των χρηστών, όσον αφορά:

- (α) τη σωστή επιλογή των απαραίτητων πληροφοριών από τον ιατρικό φάκελο του ασθενούς,
- (β) τη χρήση του ICD-10-GrM και της ETIP,
- (γ) την τήρηση των ίδιων των Κατευθυντήριων Οδηγιών.

Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις στις οποίες μέχρι σήμερα η κωδικοποίηση των ιατρικών πράξεων είχε δευτερεύοντα ρόλο, είναι απαραίτητη η εκπαίδευση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού, τόσο στη χρήση των κατευθυντήριων οδηγιών όσο και στη χρήση των ταξινομήσεων. Εξέχουσα σημασία για αυτά τα περιστατικά κατέχουν οι οδηγίες για τη χρήση των ταξινομήσεων ICD-10-GrM και ETIP, καθώς περιέχουν διευκρινίσεις και περιορισμούς.

Οι Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης θα αναπροσαρμόζονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε να ακολουθούν την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης, τις τροποποιήσεις των ελληνικών ταξινομήσεων ICD-10-GrM και ETIP, καθώς και την εμπειρία από την εφαρμογή του Ελληνικού Συστήματος DRG.

Η τελική ευθύνη για την καταγραφή των διαγνώσεων, ειδικά της κύριας διάγνωσης και των ιατρικών πράξεων, **βαρύνει τον θεράποντα ιατρό**, ακόμα και εάν η κωδικοποίηση έχει ανατεθεί σε κάποιο άλλο άτομο.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης νοσημάτων

- D001 Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης
- D002 Κύρια διάγνωση
- D003 Δευτερεύουσες διαγνώσεις
- D004 Σύνδρομα
- D005 Δευτεροπαθείς καταστάσεις και προγραμματισμένες επεμβάσεις αντιμετώπισής τους
- D006 Οξεία και χρόνια νοσήματα
- D007 Εισαγωγή για χειρουργική επέμβαση/ιατρική πράξη, που δεν διενεργήθηκε
- D008 Πιθανές διαγνώσεις
- D009 Οι κωδικοί «άλλο» και «μη καθορισμένο»
- D010 Συνδυαστικοί κωδικοί
- D011 Κωδικοποίηση διπλής ή αμφοτερόπλευρη εντόπισης
- D012 Πολλαπλή κωδικοποίηση
- D013 Κοινά αποδεκτοί όροι που χρησιμοποιούνται στον συστηματικό κατάλογο νοσημάτων
- D014 Κοινά αποδεκτοί όροι που χρησιμοποιούνται στο αλφαθητικό ευρετήριο
- D015 Ιατρογενή νοσήματα και διαταραχές

Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης ιατρικών πράξεων

- P001 Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης ιατρικών πράξεων
- P003 Σημειώσεις και κοινά αποδεκτοί όροι για τη χρήση της ΕΤΙΠ
- P004 Μη ολοκληρωμένη ή ημιτελής ιατρική πράξη
- P005 Πολλαπλές ιατρικές πράξεις, ιατρικές πράξεις που διαφέρουν ως προς το μέγεθος, τη διάρκεια ή τον αριθμό και αμφοτερόπλευρες ιατρικές πράξεις
- P006 Λαπαροσκοπικές/αρθροσκοπικές/ενδοσκοπικές ιατρικές πράξεις
- P007 Ενδοσκόπηση πολλαπλών ανατομικών περιοχών
- P008 Κλινική εξέταση υπό γενική αναισθησία

- R009 Αναισθησία
R013 Επαναδιάνοιξη μιας χειρουργημένης περιοχής/επανεπέμβαση
R014 Ιατρικές πράξεις, οι οποίες δεν χρήζουν κωδικοποίησης
R015 Λήψη και μεταμόσχευση οργάνων
R016 Διακομιδή σε άλλο νοσοκομείο για διενέργεια ιατρικής πράξης και επιστροφής εντός 24 ωρών

ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα

- 0101 HIV/AIDS
0103 Βακτηριαμία, σηψαιμία, SIRS και ουδετεροπενία

2 Νεοπλάσματα

- 0201 Επιλογή και σειρά καταχώρισης των κωδικών
0206 Γειτνιάζουσες περιοχές
0208 Υφηση συμπτωμάτων σε περίπτωση κακοήθους ανοσοϋπερπλαστικού νοσήματος και λευχαιμίας
0209 Ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος
0212 Έγχυση κυτταροτοξικών ουσιών στην ουροδόχο κύστη
0214 Λεμφαγγειακή καρκινωμάτωση
0215 Λέμφωμα

3 Νοσήματα του αίματος, των αιμοποιητικών οργάνων και ορισμένες διαταραχές με συμμετοχή του ανοσοποιητικού συστήματος

4 Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα

- 0401 Σακχαρώδης διαβήτης
0403 Κυστική ίνωση

5 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς

- 0501 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών (ναρκωτικά, αλκοόλ και νικοτίνη)

6 Νοσήματα του νευρικού συστήματος

- 0601 Εγκεφαλικό επεισόδιο
0603 Τετραπληγία και παραπληγία, μη τραυματικής αιτιολογίας

7 Νοσήματα του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του

- 0702 Καταρράκτης: Δευτερογενής εισαγωγή φακού
0704 Ανεπάρκεια και απόρριψη μωσχεύματος κερατοειδούς

8 Νοσήματα του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης

0801 Βαρηκοΐα ή κώφωση

9 Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος

0901 Ισχαιμική καρδιοπάθεια

0902 Οξύ πνευμονικό οίδημα

0903 Καρδιακή ανακοπή

0904 Υπερτασική καρδιοπάθεια (I11.-)

0905 Υπερτασική νεφροπάθεια (I12.-)

0906 Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια (I13.-)

0908 Πρόσθετες ιατρικές πράξεις που σχετίζονται με καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις

0909 Αναθεώρηση καρδιοχειρουργικής επέμβασης ή επανεπέμβαση καρδιάς και περικαρδίου

0911 Βηματοδότες/απινιδωτές

0912 Εισαγωγή για σύγκλιση αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας ή αφαίρεση αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης

10 Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος

1001 Μηχανικός αερισμός

11 Νοσήματα του πεπτικού συστήματος

1101 Σκωληκοειδίτις

1102 Συμφύσεις

1103 Έλκος στομάχου με γαστρίτιδα

1105 Αιμορραγία πεπτικού

1107 Αφυδάτωση σε γαστρεντερίτιδα

12 Νοσήματα του δέρματος και του υποδόριου ιστού

1205 Πλαστική χειρουργική

13 Νοσήματα του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού**14 Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος**

1401 Αιμοκάθαρση

1403 Πρωκτογεννητικά οξυτενή κονδυλώματα

1406 Επεμβάσεις αποκατάστασης σε ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM)

15 Κύηση, τοκετός και λοχεία

1501 Ορισμός γέννησης ζώντος και θνησιγενούς νεογνού, αποβολής

1504 Επιπλοκές μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση (O08.-)

1505 Πρόωρος τερματισμός της κύησης

- 1506 Αυτόματος κολπικός τοκετός μονόδυμης κύησης
- 1507 Έκβαση
- 1508 Διάρκεια της κύησης
- 1509 Τοκετός σε πολύδυμη κύηση
- 1510 Επιπλοκές κατά την κύηση
- 1511 Προσδιορισμός της κύριας διάγνωσης σε περίπτωση τοκετού
- 1512 Ανώμαλη προβολή και θέση εμβρύου
- 1514 Μειωμένες εμβρυϊκές κινήσεις
- 1515 Ουλή μήτρας
- 1518 Τοκετός πριν από την εισαγωγή της μητέρας
- 1519 Πρόωρος τοκετός, πρόωρες ωδίνες και ψευδής έναρξη τοκετού
- 1520 Αύξηση χρονικής διάρκειας και παράταση κύησης
- 1521 Παρατεταμένος τοκετός
- 1524 Παράταση της φάσης εξώθησης σε επισκληρίδια αναισθησία
- 1525 Προγραμματισμένη και επείγουσα καισαρική τομή

16 Ορισμένες καταστάσεις που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο

- 1601 Νεογνά
- 1602 Ορισμός των καταστάσεων που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο
- 1603 Ειδικά μέτρα υποστήριξης για το νοσούν νεογνό
- 1604 Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας νεογνού/Νόσος υαλοειδούς μεμβράνης/Ελλειψη επιφανειοδραστικού παράγοντα
- 1605 Σύνδρομο μαζικής εισρόφησης και παροδική ταχύπνοια νεογνού
- 1606 Υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια [ΥΙΕ]

17 Συγγενείς ανωμαλίες, δυσπλασίες και χρωμοσωμικές ανωμαλίες

18 Συμπτώματα, σημεία και παθολογικά ευρήματα που δεν ταξινομούνται αλλού

- 1804 Ακράτεια
- 1805 Πυρετικοί σπασμοί
- 1806 Διαγνώσεις που σχετίζονται με τον πόνο και ιατρικές πράξεις θεραπείας του

19 Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες

- 1902 Επιτολής τραυματισμοί
- 1903 Κάταγμα και εξάρθρωμα
- 1905 Ανοικτά τραύματα και κακώσεις
- 1909 Απώλεια των αισθήσεων
- 1910 Τραυματισμός του νωτιαίου μυελού (με μετατραυματική παραπληγία και τετραπληγία)
- 1911 Πολλαπλά τραύματα

- 1914 Θερμικά ή χημικά εγκαύματα
- 1915 Κακοποίηση και κακομεταχείριση ενηλίκων και παιδιών
- 1916 Δηλητηρίαση από φάρμακα, ναρκωτικά και βιολογικά δραστικές ουσίες
- 1917 Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων (μετά από λήψη σύμφωνα με την ιατρική οδηγία)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Γενικοί κανόνες για την κωδικοποίηση (ΠΟΥ)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

1. Συμβουλές κωδικοποίησης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη
2. Συμβουλές κωδικοποίησης για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τη Σήψη
3. Συμβουλές κωδικοποίησης για τα νεοπλάσματα
4. Συμβουλές κωδικοποίησης για την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

Ευρετήριο Κωδικών ICD-10-GrM

Ευρετήριο Κωδικών ΕΤΙΠ

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΑΓΓΟ	Ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων
ΕΚΟΚ	Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης
ΕΣ	Επιφάνεια Σώματος
ΕΤΙΠ	Ελληνική Ταξινόμηση Ιατρικών Πράξεων
ΚΠΠ	Καρδιοπνευμονική παράκαμψη
ΜΚΑ	Μη καθορισμένο αλλιώς
ΜΤΑ	Μη ταξινομημένος αλλού
ΠΟΥ	Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
ΥΙΕ	Υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια
ΧΜΛ	Χρόνια μυελογενής λευχαιμία
AIDS	Acquired immune deficiency syndrome
CPAP	Continuous Positive Airway Pressure – Συνεχής θετική πίεση αεραγωγών
DRG	Diagnosis Related Groups – Διαγνωστικά Ομοιογενείς Ομάδες
GVHD	Graft-versus-host-disease – νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή
HIV	Human Immune Deficiency Virus
ICD	International Classification of Diseases
ICD-10-GrM	Κατάλογος Κωδικών της Διεθνούς Στατιστικής Ταξινόμησης Νόσων και Συναφών Προβλημάτων Υγείας - Ελληνική Τροποποίηση
ICPM	International Classification of Procedures in Medicine
SAPS	Simplified Acute Physiology Score
SIRS	Systemic inflammatory response syndrome – Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης
TISS	Therapeutic Intervention Scoring System

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

I. Γενικές υποδείξεις

Οι Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης (ΕΚΟΚ) διέπονται από τους ακόλουθους κανόνες:

1. Όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες χαρακτηρίζονται από έναν 4ψήφιο κωδικό, π.χ. D001.
2. Οι Γενικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης Νοσημάτων αποτελούνται από ένα «D» (Disease) ακολουθούμενο από έναν τριψήφιο αριθμό.
3. Οι Γενικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης Ιατρικών Πράξεων αποτελούνται από ένα «P» (Procedure) ακολουθούμενο από έναν τριψήφιο αριθμό.
4. Οι Ειδικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης αποτελούνται από τον διψήφιο αριθμό του κεφαλαίου της ταξινόμησης ICD-10-GM ακολουθούμενο από έναν διψήφιο αριθμό.

Σε πολλές Κατευθυντήριες Οδηγίες παρατίθενται παραδείγματα ή/και λίστες με κωδικούς ICD-10-GM ή/και ΕΤΙΠ. Αυτά τα παραδείγματα ή/και οι λίστες δεν περιλαμβάνουν απαραίτητα όλους τους πιθανούς σχετικούς κωδικούς. Για την ανεύρεση των κατάλληλων κωδικών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παραπομπές στα «Περιλαμβάνονται», «Εξαιρούνται» και στις «Σημειώσεις» των αντίστοιχων ταξινομήσεων.

Οι Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες, για λόγους σαφήνειας, αφορούν κυρίως ολοκληρωμένες νοσηλείες. Ωστόσο, μία νοσηλεία δεν αντιστοιχεί αναγκαστικά σε μία μόνο περίπτωση αποζημίωσης. Όταν η χρέωση ενός DRG περιλαμβάνει κατ' εξαίρεση περισσότερες από μία νοσηλείες, ή/και ιατρικές πράξεις που προηγήθηκαν ή ακολούθησαν αυτές, τότε πρέπει όλες οι διαγνώσεις και ιατρικές πράξεις να περιγράφονται στον ηλεκτρονικό ιατρικό φάκελο. Επομένως, πολλές ιατρικές πράξεις μπορούν αθροιστικά να περιληφθούν σε μία περίπτωση αποζημίωσης (για περισσότερες πληροφορίες ανατρέξτε στους Κανόνες Χρέωσης του Ελληνικού Καταλόγου DRG).

II. Κωδικοί

Οι Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης παραπέμπουν σε κωδικούς των ταξινομήσεων ICD-10-GrM και ETIP. Αυτοί οι κωδικοί παρατίθενται **με διάφορους τρόπους**.

Οι κατευθυντήριες οδηγίες περιέχουν οδηγίες κωδικοποίησης που αφορούν μεμονωμένους (τερματικούς) κωδικούς ή ομάδα (μη τερματικών) κωδικών.

Σε μερικές περιπτώσεις αναφέρεται στις κατευθυντήριες οδηγίες ότι μια κατηγορία κωδικών περιέχει υποκατηγορίες, οι οποίες και περιγράφονται. Σε άλλες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται εκφράσεις όπως «πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός από/να κωδικοποιείται ένας κωδικός από τους» που υποδηλώνουν την ύπαρξη υποκατηγοριών. Σε αυτές τις περιπτώσεις ισχύουν οι οδηγίες κωδικοποίησης για όλους τους τερματικούς κωδικούς που περιλαμβάνονται στην υποκατηγορία.

Για την ιατρική καταγραφή και τεκμηρίωση πρέπει να χρησιμοποιείται πάντα ο κωδικός για το συγκεκριμένο νόσημα ή/και ιατρική πράξη με τη μεγαλύτερη δυνατή διαφοροποίηση (τερματικός).

Στην παρακάτω λίστα παρατίθενται χαρακτηριστικά παραδείγματα κωδικών.

Τρόπος παρουσίασης των κωδικών στις Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης

Υπενθυμίζεται για τους χρήστες του συστήματος Gr-DRG ότι οι κωδικοί της ταξινόμησης ICD-10-GrM υποδιαιρούνται σε κωδικούς 3^{ων}, 4^{ων} μέχρι και 5 χαρακτήρων (π.χ. E10.01 *Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης, με κώμα, καθορισμένος ως απορρυθμισμένος*), ενώ οι κωδικοί της ETIP υποδιαιρούνται σε μέχρι και 6 υποδιαίρεσεις, οι οποίες αποδίδονται αποκλειστικά με αριθμούς. Οι πρώτες τρεις υποδιαίρεσεις αποδίδονται με τα πρώτα 3 ψηφία κάθε κωδικού. Οι επόμενες 3 υποδιαίρεσεις αποδίδονται με διψήφιους αριθμούς και διαχωρίζονται μεταξύ τους με τη μεσολάβηση μιας τελείας (π.χ. 307.02.00.02 *Επινεφριδεκτομή, χωρίς ωσθηκεκτομή, λαπαροσκοπικά*).

1. ICD-10-GrM

Παραδείγματα κωδικών	Κείμενο (πλάγια γραφή)	Η Κατευθυντήρια Οδηγία αφορά:
E10-E14	<i>Σακχαρώδης διαβήτης</i>	Την ομάδα με όλες τις υποκατηγορίες.
E10-E14, 4 ^{ος} χαρακτήρας „5”	<i>Σακχαρώδης διαβήτης με επιπλοκές από τα περιφερικά αγγεία</i>	Τον 4 ^ο χαρακτήρα μιας ομάδας (σε αυτήν την περίπτωση 4 ^{ος} χαρακτήρας „5”), συμπεριλαμβανομένων όλων των κωδικών που υπάγονται σε αυτήν.

E10–E14, 5 ^{ος} χαρακτήρας „1”	<i>Σακχαρώδης Διαβήτης καθορισμένος ως απορρυθμισμένος</i>	Τον επιλεγμένο 5 ^ο χαρακτήρα των κωδικών 4 ^{ων} χαρακτήρων „2 - .6 καθώς και .8 και .9” (σε αυτήν την περίπτωση 5 ^{ος} χαρακτήρας „1”).
E11.–	<i>Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 2]</i>	Τους κωδικούς 3 ^{ων} χαρακτήρων με όλες τις υποκατηγορίες τους.
E11.5-	<i>Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 2] με επιπλοκές από τα περιφερικά αγγεία</i>	Την κατηγορία (4 ^{ων} χαρακτήρων) με όλους τους κωδικούς που υπάγονται σε αυτήν.
E11.x0	<i>Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 2], μη καθορισμένος ως απορρυθμισμένος</i>	Τους κωδικούς 5 ^{ου} χαρακτήρα της ομάδας 3 ^{ων} χαρακτήρων (σε αυτήν την περίπτωση 5 ^{ος} χαρακτήρας „0”).
I20.0	<i>Ασταθής στηθάγχη</i>	Ακριβώς αυτόν τον κωδικό (τερματικός κωδικός).
M23.2-	<i>Βλάβη του μηνίσκου από παλαιότερη ρήξη ή τραυματισμό</i>	Την κατηγορία (4 ^{ων} χαρακτήρων) με όλους τους κωδικούς που υπάγονται σε αυτήν.
M23.2- [0-9]	<i>Βλάβη του μηνίσκου από παλαιότερη ρήξη ή τραυματισμό</i>	Τους κωδικούς 5 χαρακτήρων μιας υποκατηγορίας 4 ^{ων} χαρακτήρων. Κάποιες φορές συνοψίζονται οι 5 ^{οι} χαρακτήρες σε λίστες για περισσότερους κωδικούς. Η αγκύλη [0-9] υποδεικνύει στο παράδειγμά μας ποιοι 5 ^{οι} χαρακτήρες έχει νόημα να συνδυαστούν με τη συγκεκριμένη υποκατηγορία 4 ^{ων} χαρακτήρων.
M23.2- [1,2]	<i>Βλάβη του μηνίσκου από παλαιότερη ρήξη ή τραυματισμό</i>	Δύο επιλεγμένους κωδικούς 5 χαρακτήρων (5 ^{ος} χαρακτήρας „1” και 5 ^{ος} χαρακτήρας „2”), που συνδυάζονται με τη συγκεκριμένη υποκατηγορία 4 ^{ων} χαρακτήρων.

2. ΕΤΙΠ

Παραδείγματα κωδικών	Κείμενο (πλάγια γραφή)	Η Κατευθυντήρια Οδηγία αφορά:
342	<i>Χειρουργικές επεμβάσεις του οισοφάγου</i>	Τον κωδικό 3 ^{ων} υποδιαίρεσεων με όλους τους τερματικούς κωδικούς που υπάγονται σε αυτόν (σε αυτήν την περίπτωση τους κωδικούς 4 ^{ων} υποδιαίρεσεων 342.00 έως 342.09 με όλους τους κωδικούς 5 και 6 υποδιαίρεσεων).
342.00	<i>Τομή του οισοφάγου</i>	Τον κωδικό 4 ^{ων} υποδιαίρεσεων με όλους τους τερματικούς κωδικούς 5 & 6 υποδιαίρεσεων που υπάγονται σε αυτόν.
342.00.00	<i>Οισοφαγομυοτομή</i>	Τον κωδικό 5 υποδιαίρεσεων και όλους τους τερματικούς κωδικούς που υπάγονται σε αυτόν.
342.00.00.00	<i>Οισοφαγομυοτομή, ανοικτά χειρουργικά, διακοιλιακά</i>	Ακριβώς αυτόν τον κωδικό (τερματικός κωδικός).
342.00.00, .01, .02	<i>Τομή του οισοφάγου</i>	Τρεις συγκεκριμένους κωδικούς 5 & 6 υποδιαίρεσεων που υπάγονται σε αυτόν τον κωδικό 4 ^{ων} υποδιαίρεσεων (σε αυτήν την περίπτωση 342.00).

Παραδείγματα περιπτώσεων

Οι Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης περιέχουν παραδείγματα περιπτώσεων που συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόησή τους. Στα παραδείγματα αυτά μετά την περιγραφή μιας κλινικής περίπτωσης ακολουθούν οι κωδικοί που πρέπει να χρησιμοποιηθούν και με πλάγια γραμματοσειρά τα αντίστοιχα κείμενα των ταξινομήσεων (ICD-10-GrM ή/και ΕΤΙΠ).

Τα κείμενα που αφορούν το ICD-10-GrM ακολουθούν κατά κανόνα πιστά τον συστηματικό κατάλογο του, ενώ τα κείμενα που αφορούν την ΕΤΙΠ έχουν υποστεί μικρές μετατροπές, ώστε να αφαιρεθούν περιττές πληροφορίες και να αποφευχθούν μεγάλες, ασαφείς διατυπώσεις. Ασφαλώς και περιέχουν σε κάθε περίπτωση όλες τις απαραίτητες πληροφορίες του κάθε κωδικού ΕΤΙΠ.

Αρκετά παραδείγματα αποδίδουν την ολοκληρωμένη κωδικοποίηση ενός περιστατικού νοσηλείας με όλους τους σχετικούς κωδικούς διαγνώσεων και ιατρικών πράξεων.

Σε άλλες περιπτώσεις παρατίθενται μόνο οι κωδικοί που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη κατευθυντήρια οδηγία, π.χ. οι κωδικοί διαγνώσεων απουσιάζουν από παραδείγματα που αποσαφηνίζουν τον τρόπο κωδικοποίησης ιατρικών πράξεων, ή οι

κωδικοί ιατρικών πράξεων δεν περιέχονται σε παραδείγματα που διευκρινίζουν τον τρόπο κωδικοποίησης διαγνώσεων.

Σε παραδείγματα που χρησιμοποιούνται κωδικοί ICD-10-GrM που αφορούν «μη καθορισμένα» νοσήματα, πρέπει να κωδικοποιούνται οι διαγνώσεις σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν την ταξινόμηση ICD-10-GrM.

Στα παραδείγματα διαγνώσεων καθώς και ιατρικών πράξεων δεν αναφέρεται η πλευρά του σώματος και γι' αυτό παρατίθενται οι κωδικοί ICD-10-GrM και ΕΤΙΠ χωρίς τα διακριτικά (R= δεξιά, L=αριστερά, B=αμφοτερόπλευρα). Εξαιρέσεις αποτελούν για τους κωδικούς διαγνώσεων τα παραδείγματα 1 και 2 στην ΕΚΟΚ D011 *Κωδικοποίηση διπλής ή αμφοτερόπλευρης εντόπισης* (σελίδες 21 και 22) και για τους κωδικούς ιατρικών πράξεων το παράδειγμα 4 στην ΕΚΟΚ P005 *Πολλαπλές ιατρικές πράξεις/ιατρικές πράξεις που διαφέρουν ως προς το μέγεθος, τη διάρκεια ή τον αριθμό/αμφοτερόπλευρες ιατρικές πράξεις* (σελίδα 54).

Η παρουσίαση των παραδειγμάτων για την πολλαπλή κωδικοποίηση ακολουθεί τους κανόνες της ΕΚΟΚ D012 *Πολλαπλή κωδικοποίηση* (σελίδα 22), π.χ. οι αυτόνομοι κωδικοί του συστήματος σταυρού αστερίσκου φέρουν πάντα έναν σταυρό, ενώ οι εξαρτημένοι φέρουν πάντα έναν αστερίσκο. Οι εξαρτημένοι κωδικοί που φέρουν θαυμαστικό είναι άλλοτε προαιρετικοί και άλλοτε υποχρεωτικοί.

Η απαραίτητη επεξεργασία των δεδομένων περιγράφεται αναλυτικά με τα ανάλογα παραδείγματα στην ΕΚΟΚ D012 *Πολλαπλή κωδικοποίηση* (σελίδα 22). Στην παρούσα φάση (βλέπε Ορισμό Ελληνικού Συνόλου Δεδομένων) τα δεδομένα είναι δομημένα με τέτοιο τρόπο, ώστε να προβλέπεται πεδίο για αυτόνομη και εξαρτημένη διάγνωση τόσο για την κύρια όσο και για κάθε δευτερεύουσα διάγνωση. Το πεδίο για την εξαρτημένη διάγνωση προορίζεται για τον εκάστοτε κωδικό δευτερεύουσας διάγνωσης (κωδικό με «*» ή «!»).

Στο λογισμικό ομαδοποίησης DRG (Grouped) καταχωρίζεται μόνο η διάγνωση στο πεδίο «αυτόνομος κωδικός της κύριας διάγνωσης» ως κύρια διάγνωση. Όλες οι άλλες διαγνώσεις αντιμετωπίζονται από το λογισμικό σύστημα ως δευτερεύουσες.

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στην παρουσίαση των παραδειγμάτων των κατευθυντήριων οδηγιών κωδικοποίησης δεν έχει προβλεφθεί διαχωρισμός μεταξύ αυτόνομου και εξαρτημένου κωδικού ούτε επαναλαμβάνονται ίδιοι κωδικοί. Οι Κατευθυντήριες Οδηγίες εξυπηρετούν αποκλειστικά την αποτύπωση των διαγνώσεων και ιατρικών πράξεων στους αντίστοιχους κατάλληλους κωδικούς. Δεν ρυθμίζουν λεπτομέρειες που αφορούν τη μεταφορά αυτών των κωδικών σε συστήματα ιατρικής πληροφορικής.

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

D001

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης αναφέρονται σε:

ICD-10-GrM Συστηματικό Κατάλογο Νοσημάτων, και

ICD-10-GrM Αλφαβητικό Ευρετήριο

D001 Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης

Η καταγραφή των νοσημάτων και των ιατρικών πράξεων αποτελεί ευθύνη του θεράποντα ιατρού. Παρόλο που τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα παίζουν σημαντικό ρόλο στη διαδικασία κωδικοποίησης, υπάρχουν κάποια νοσήματα που δεν μπορούν πάντα να επιβεβαιωθούν με κλινικά ή εργαστηριακά ευρήματα. Η νόσος Crohn π.χ. δεν επιβεβαιώνεται πάντα με βιοψία.

Ο θεράπων ιατρός είναι υπεύθυνος για:

- την επιβεβαίωση διαγνώσεων που περιγράφονται μεν, αλλά δεν αποδεικνύονται με βάση τον ιατρικό φάκελο του ασθενή,
και
- τη διευκρίνιση αποκλίσεων μεταξύ των αντικειμενικών ευρημάτων και των καταγεγραμμένων στον ιατρικό φάκελο παρατηρήσεων.

Συχνά δεν τονίζεται επαρκώς η σημασία της συνεπούς και ολοκληρωμένης καταγραφής και ενημέρωσης του ιατρικού φακέλου. Χωρίς αυτήν τη μορφή καταγραφής, είναι πολύ δύσκολη, αν όχι αδύνατη, η εφαρμογή όλων των κατευθυντήριων οδηγιών κωδικοποίησης.

Επικείμενο ή επαπειλούμενο νόσημα

Όταν ένα νόσημα αναφέρεται στον ιατρικό φάκελο ως επικείμενο ή επαπειλούμενο, αλλά δεν εκδηλώνεται τελικά κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, πρέπει να διαπιστώνεται αν αυτό περιλαμβάνεται ως «επικείμενο» ή ως «επαπειλούμενο» στους καταλόγους του ICD-10-GrM, είτε στο κύριο είτε στο δευτερεύον λήμμα (βλέπε επίσης ΕΚΟΚ D013 Κοινά αποδεκτοί όροι που χρησιμοποιούνται στον συστηματικό κατάλογο νοσημάτων (σελίδα 31) και ΕΚΟΚ D014 Κοινά αποδεκτοί όροι που χρησιμοποιούνται στο αλφαβητικό ευρετήριο (σελίδα 36)). Εάν υπάρχει αντίστοιχος κωδικός στο ICD-10-GrM, πρέπει να καταχωρίζεται. Αν δεν υπάρχει αντίστοιχος κωδικός στους καταλόγους του ICD-10-GrM, τότε το «επικείμενο» ή «επαπειλούμενο» νόσημα δεν καταχωρίζεται.

D002

Παράδειγμα 1

Ένας ασθενής εισάγεται με επαπειλούμενη γάγγραινα κάτω άκρου, η οποία μετά την άμεση ιατρική αντιμετώπιση τελικά αποφεύγεται.

Δεν υπάρχει κωδικός «γάγγραινα, επικείμενη ή επαπειλούμενη» στον συστηματικό κατάλογο νοσημάτων ICD-10-GrM, επομένως η συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει να κωδικοποιηθεί με βάση το υποκείμενο νόσημα: π.χ. ως αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων με εξέλκωση.

170.23 Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με εξέλκωση

Στον συστηματικό κατάλογο νοσημάτων ICD-10-GrM υπάρχει ειδική κωδικοποίηση (ή αντίστοιχες σημειώσεις) μόνο για λίγες παθήσεις, που θεωρούνται «επαπειλούμενες».

Για τη διάγνωση «επαπειλούμενη αποβολή», υπάρχει π.χ. ο κωδικός O20.0 *Επαπειλούμενη αποβολή*. Η διάγνωση «επαπειλούμενο έμφραγμα μυοκαρδίου» συμπεριλαμβάνεται στον κωδικό I20.0 *Ασταθής στηθάγχη*.

D002 Κύρια διάγνωση

Η κύρια διάγνωση ορίζεται ως:

«Η διάγνωση η οποία, κατόπιν διερεύνησης, διαπιστώνεται ότι αποτελεί την κύρια αιτία εισαγωγής και νοσηλείας του ασθενή».

Ο όρος «κατόπιν διερεύνησης» περιγράφει την αξιολόγηση των ευρημάτων κατά τη λήξη της νοσηλείας, προκειμένου να καθοριστεί η κύρια αιτία νοσηλείας του ασθενή. Τα ευρήματα που αξιολογούνται στο πλαίσιο αυτό μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες που αντλούνται από το ιατρικό και το νοσηλευτικό ιστορικό, την ψυχιατρική εκτίμηση, τη διαβούλευση με άλλες ειδικότητες, την κλινική εξέταση, τις διαγνωστικές εξετάσεις ή ιατρικές πράξεις, τις παθολογοανατομικές ή ακτινολογικές εξετάσεις και τις χειρουργικές επεμβάσεις. Ευρήματα που σχετίζονται με το κόστος νοσηλείας και γίνονται γνωστά μετά την έξοδο του ασθενή από το νοσοκομείο, πρέπει να χρησιμοποιούνται για την κωδικοποίηση.

Η κύρια διάγνωση, που καθορίζεται κατόπιν διερεύνησης, δεν είναι απαραίτητο να συμπίπτει με τη διάγνωση εισόδου ή την αιτία παραπομπής του ασθενή.

Παρατήρηση: Ο ανωτέρω ορισμός της κύριας διάγνωσης ενδέχεται να μην επιτρέπει πάντοτε τον ορθό υπολογισμό του κόστους νοσηλείας στο σύστημα αποζημίωσης DRG. Στο πλαίσιο της εξέλιξης και αναβάθμισης του συστήματος αποζημίωσης DRG, τέτοιες περιπτώσεις επισημαίνονται και διερευνάται η ενδεχόμενη διόρθωσή τους.

D002

Παράδειγμα 1

Ένας ασθενής παρουσιάζει από το πρωί έντονο θωρακικό άλγος και, μετά από ιατρική εκτίμηση, διακομίζεται με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο και εξετάζεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών. Στη συνέχεια εισάγεται στην καρδιολογική κλινική με υποψία εμφράγματος του μυοκαρδίου. Στην πορεία επιβεβαιώνεται το έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του και μέχρι την έξοδό του τίθενται οι παρακάτω διαγνώσεις:

- Σακχαρώδης διαβήτης
- Αθηροσκλήρωση στεφανιαίων αγγείων
- Έμφραγμα του μυοκαρδίου

Για την επιλογή της κύριας διάγνωσης καθοριστικό ρόλο παίζουν οι συνθήκες εισαγωγής του ασθενή. Κατά συνέπεια, το έμφραγμα του μυοκαρδίου αποτελεί την κύρια διάγνωση, καθώς σε αυτό οφείλεται η εισαγωγή του ασθενούς.

Κατά τον καθορισμό της κύριας διάγνωσης, υπερισχύουν οι ανωτέρω κατευθυντήριες οδηγίες έναντι όλων των άλλων οδηγιών. Πρέπει να λαμβάνονται επίσης υπόψη οι αποδείξεις κωδικοποίησης των καταλόγων ICD-10-GM (βλέπε επίσης ΕΚΟΚ D013 Κοινά αποδεκτοί όροι που χρησιμοποιούνται στον συστηματικό κατάλογο νοσημάτων (σελίδα 31) και ΕΚΟΚ D014 Κοινά αποδεκτοί όροι που χρησιμοποιούνται στο αλφαθητικό ευρετήριο (σελίδα 36)).

Καταχώριση της υποκείμενης νόσου ως κύρια διάγνωση

Όταν ένας ασθενής προσέρχεται με ένα σύμπτωμα, οφειλόμενο σε υποκείμενη νόσο (γνωστή ή διαγνωσθείσα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας), και αυτή η νόσος αντιμετωπιστεί, τότε ως κύρια διάγνωση πρέπει να κωδικοποιείται η υποκείμενη νόσος και όχι το σύμπτωμα. Για την κωδικοποίηση των συμπτωμάτων ως δευτερεύουσες διαγνώσεις βλέπε ΕΚΟΚ D003 Δευτερεύουσες διαγνώσεις (σελίδα 10).

Παράδειγμα 2

Ένας ασθενής εισάγεται για αντιμετώπιση επιδεινούμενης κεφαλαλγίας που προκαλείται από όγκο εγκεφάλου, ο οποίος έχει διαγνωστεί προ τριμήνου. Ο ασθενής χειρουργείται λόγω επέκτασης του όγκου.

Κύρια διάγνωση: Όγκος εγκεφάλου
Δευτερεύουσα διάγνωση: Καμία

D002

Παράδειγμα 3

Ένας ασθενής εισάγεται με οξύ άλγος δεξιού λαγονίου βόθρου, εμπύρετο και αδιαθεσία. Με την κλινική υποψία οξείας σκωληκοειδίτιδας διενεργείται σκωληκοειδεκτομή.

Κύρια διάγνωση: Οξεία σκωληκοειδίτιδα

Δευτερεύουσα διάγνωση: Καμία

Καταχώριση ενός συμπτώματος ή κλινικού ευρήματος ως κύρια διάγνωση

Όταν ένας ασθενής προσέρχεται με ένα σύμπτωμα ή κλινικό εύρημα, οφειλόμενο σε γνωστή -κατά τη στιγμή της εισαγωγής- υποκείμενη νόσο, αλλά αντιμετωπίζεται μόνο το σύμπτωμα/κλινικό εύρημα, τότε πρέπει να κωδικοποιείται ως κύρια διάγνωση το σύμπτωμα/κλινικό εύρημα και ως δευτερεύουσα διάγνωση η υποκείμενη νόσος.

Παράδειγμα 4

Ένας ασθενής με γνωστή κίρρωση ήπατος εισάγεται με ασκίτική συλλογή. Αντιμετωπίζεται μόνο ο ασκίτης, με εκκενωτική παρακέντηση.

Κύρια διάγνωση: Ασκίτης

Δευτερεύουσα διάγνωση: Κίρρωση ήπατος

Παρατήρηση: Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επιλογή της κύριας διάγνωσης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες γενικές κατευθυντήριες οδηγίες και οι ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες των επιμέρους κεφαλαίων. Συγκεκριμένα για τις νοσηλείες που σχετίζονται με κύηση, τοκετό, λοχεία (βλέπε επίσης ΕΚΟΚ 1506 *Αυτόματος κολπικός τοκετός μονόδυμης κύησης* (σελίδα 136)) και με αιμοκάθαρση (βλέπε επίσης ΕΚΟΚ 1401 *Αιμοκάθαρση* (σελίδα 131)), ισχύουν ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες για την επιλογή της κύριας διάγνωσης.

Κωδικοί για συμπτώματα, κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα και μη σαφώς καθορισμένες καταστάσεις

Κωδικοί από το κεφάλαιο XVIII, *Συμπτώματα, παθολογικά κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα, που δεν ταξινομούνται αλλού*, δεν πρέπει να καταχωρίζονται ως κύρια διάγνωση, εφόσον μπορεί να καθοριστεί συγκεκριμένη διάγνωση που δικαιολογεί τη συμπτωματολογία του ασθενή.

Οι σημειώσεις ωστόσο στην αρχή του κεφαλαίου XVIII στον συστηματικό κατάλογο νοσημάτων ICD-10-GrM βοηθούν στον καθορισμό των περιπτώσεων όπου καταχωρίζονται κωδικοί της ομάδας R00-R99.

D002

Δύο ή περισσότερες διαγνώσεις που αντιστοιχούν εξίσου στον ορισμό της κύριας διάγνωσης

Όταν δύο ή περισσότερες διαγνώσεις, σε σχέση με την αιτία εισαγωγής, τα ευρήματα της κλινικής εξέτασης και τη θεραπεία που εφαρμόστηκε, πληρούν εξίσου τα κριτήρια για την κύρια διάγνωση, ενώ τα περιεχόμενα του ICD-10-GrM και οι κατευθυντήριες οδηγίες δεν παρέχουν καμία περαιτέρω διευκρίνιση, τότε πρέπει να αποφασίσει ο θεράπων ιατρός ποια διάγνωση αντιστοιχεί καλύτερα στον ορισμό της κύριας διάγνωσης. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να επιλέξει ο θεράπων ιατρός εκείνη τη διάγνωση, για τη διερεύνηση και την αντιμετώπιση της οποίας απαιτήθηκαν οι περισσότεροι πόροι, άσχετα με το αν οι ασθένειες συνδέονται ή όχι μεταξύ τους.

Κωδικοί Z03.0 έως Z03.9

Ιατρική παρακολούθηση και εκτίμηση για πιθανά νοσήματα και καταστάσεις

Οι κωδικοί Z03.0 έως Z03.9 καταχωρίζονται ως κύρια διάγνωση, μόνο σε υποψία παθολογικών καταστάσεων (όπως νοσήματα, ατυχήματα ή άλλα συμβάντα), που εν τέλει δεν επιβεβαιώνονται και για τις οποίες δεν απαιτείται κάποιου είδους θεραπεία.

Παράδειγμα 5

Ένα νήπιο βρίσκεται από τη μητέρα του με ένα άδειο κουτί δισκίων. Είναι ασαφής η ακριβής ποσότητα των δισκίων που λείπουν. Το παιδί είναι ασυμπτωματικό, εισάγεται όμως για παρακολούθηση, με την υποψία κατάποσης φαρμακευτικής ουσίας.

Κατά την παρακολούθηση δεν προέκυψε καμία ένδειξη κατάποσης φαρμάκου.

Κύρια διάγνωση:	Z03.6	Παρακολούθηση για πιθανή τοξική επίδραση από την κατάποση ουσίας
Δευτερεύουσα διάγνωση:	Καμία	

Εάν υπάρχουν πιο ειδικοί κωδικοί που μπορούν να καταχωρισθούν ως κύρια διάγνωση, τότε αυτοί χρησιμοποιούνται κατά προτεραιότητα, σε σχέση με τους κωδικούς της ομάδας Z03 *Ιατρική παρακολούθηση και εκτίμηση για πιθανά νοσήματα και καταστάσεις*. Εάν υπάρχει κάποιο σύμπτωμα σχετικό με το πιθανό νόσημα, τότε πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση ο κωδικός του συμπτώματος, και όχι ένας κωδικός της ομάδας Z03 (βλέπε επίσης ΕΚΟΚ D008 *Πιθανές διαγνώσεις* (σελίδα 18)).

Όταν δύο ή περισσότερα συμπτώματα ή ευρήματα πληρούν τα κριτήρια της κύριας διάγνωσης, τότε πρέπει ο θεράπων ιατρός να επιλέξει εκείνο, για τη διερεύνηση του οποίου απαιτήθηκαν οι περισσότεροι πόροι.

Εσωτερική διακομιδή μεταξύ κλινικών/τμημάτων εντός και εκτός συστήματος DRG

Κατά τις εσωτερικές διακομιδές ασθενών μεταξύ κλινικών/τμημάτων του ίδιου νοσοκομείου που ακολουθούν διαφορετικό σύστημα αποζημίωσης, πρέπει να ακολουθούνται οι εξής κανόνες:

D002

- Όταν ένας ασθενής διακομίζεται εσωτερικά **για μία φορά** από μία κλινική/τμήμα που δεν υπάγεται στο σύστημα αποζημίωσης DRG (όπως μια ψυχιατρική κλινική/τμήμα) σε οποιαδήποτε άλλη κλινική/τμήμα που υπάγεται σε αυτό, ή το αντίστροφο, λαμβάνει εξιτήριο από την αρχική κλινική/τμήμα και εισάγεται εκ νέου στη δεύτερη κλινική/τμήμα.
- Η καταχώριση και η κωδικοποίηση των διαγνώσεων διενεργείται με βάση τους ισχύοντες σε κάθε τμήμα κανόνες κωδικοποίησης και χρεώσεων. Ως κύρια διάγνωση για τη νοσηλεία σε κάθε μία από τις δύο κλινικές/τμήματα, πρέπει να καταχωρίζεται το βασικό σύμπτωμα ή η διάγνωση που αιτιολογεί την εισαγωγή και παραμονή του σε αυτή την κλινική/τμήμα (βλέπε παράδειγμα 6).
- Όταν ένας ασθενής διακομίζεται εσωτερικά **περισσότερες από μία φορές** μεταξύ των ίδιων ή διαφορετικών κλινικών/τμημάτων εντός και εκτός συστήματος DRG, τότε, κατά την ολοκλήρωση της νοσηλείας του και τη λήψη εξιτηρίου από το νοσοκομείο, η κύρια διάγνωση για την υποβολή προς αποζημίωση της νοσηλείας του σε κλινικές/τμήματα εντός του συστήματος DRG, πρέπει να επιλέγεται με βάση τους κανόνες που ισχύουν για την επαναδιακομιδή από άλλα νοσοκομεία (βλέπε παρακάτω).

Παράδειγμα 6

Ένας ασθενής εισάγεται λόγω σχιζοφρένειας σε ψυχιατρική κλινική. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του, παρουσιάζει συμπτωματολογία οξείας κοιλίας. Μετά από διακομιδή στη χειρουργική κλινική, διαγιγνώσκεται οξεία χολοκυστίτιδα, ως αιτία της συμπτωματολογίας. Η θεραπεία της σχιζοφρένειας συνεχίζεται.

Ψυχιατρική κλινική (εκτός συστήματος DRG)

Διάγνωση: Σχιζοφρένεια

Χειρουργική κλινική (εντός συστήματος DRG)

Κύρια διάγνωση: Οξεία χολοκυστίτιδα

Δευτερεύουσα διάγνωση: Σχιζοφρένεια

Επανεισαγωγή στο ίδιο νοσοκομείο

Σε όλες τις περιπτώσεις επανεισαγωγής ενός ασθενή στο ίδιο νοσοκομείο, όπου τα δεδομένα των δύο νοσηλείων συνοψίζονται και επαναταξινομούνται σε ένα ενιαίο περιστατικό αποζημίωσης στο σύστημα DRG πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το εξής:

- Εφόσον και οι δύο νοσηλείες του ασθενή αποζημιώνονται με βάση τους Κανόνες Χρέωσης του Ελληνικού Καταλόγου DRG (για περισσότερες λεπτομέρειες ανατρέξτε εκεί) ως ένα ενιαίο περιστατικό αποζημίωσης στο σύστημα DRG, τα συμπτώματα/διαγνώσεις και οι ιατρικές πράξεις και των δύο νοσηλείων πρέπει να συνυπολογίζονται. Για τα εν λόγω συμπτώματα/διαγνώσεις πρέπει να εφαρμόζεται ο ορισμός της κύριας διάγνωσης.

D002

Επαναδιακομιδή από άλλο νοσοκομείο

Σε περίπτωση διακομιδής σε άλλο νοσοκομείο και στη συνέχεια επαναδιακομιδής στο αρχικό νοσοκομείο (π.χ. Νοσοκομείο Α → Νοσοκομείο Β → Νοσοκομείο Α), πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το εξής:

- Εφόσον και οι δύο νοσηλείες του νοσοκομείου Α αποζημιώνονται με βάση τους Κανόνες Χρέωσης του Ελληνικού Καταλόγου DRG (για περισσότερες πληροφορίες βλέπει εκεί) ως ένα ενιαίο περιστατικό αποζημίωσης στο σύστημα DRG, τα συμπτώματα/διαγνώσεις και οι ιατρικές πράξεις και των δύο νοσηλείων του νοσοκομείου Α πρέπει να συνυπολογίζονται. Για τα εν λόγω συμπτώματα/διαγνώσεις πρέπει να εφαρμόζεται ο ορισμός της κύριας διάγνωσης.

Παράδειγμα 7

Ασθενής με αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια εισάγεται στο νοσοκομείο Α με ασταθή στηθάγχη. Για περαιτέρω διερεύνηση και θεραπεία διακομίζεται στο νοσοκομείο Β. Εκεί διαγιγνώσκεται, βάσει του διενεργηθέντος ελέγχου, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου. Ο ασθενής υποβάλλεται ακολούθως σε αορτοστεφανιαία παράκαμψη (bypass). Μετά τη σταθεροποίηση της κατάστασής του, επαναδιακομίζεται στο νοσοκομείο Α.

Νοσοκομείο Α: 1η εισαγωγή

Κύρια διάγνωση: Ασταθής στηθάγχη
 Δευτερεύουσα διάγνωση: Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια

Νοσοκομείο Β:

Κύρια διάγνωση: Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
 Δευτερεύουσα διάγνωση: Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια

Νοσοκομείο Α: 2η εισαγωγή

Κύρια διάγνωση: Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
 Δευτερεύουσες διαγνώσεις: Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια
 Ύπαρξη αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass)

Μετά την επαναδιακομιδή του ασθενούς στο νοσοκομείο Α, αξιολογούνται οι διαγνώσεις τόσο της 1^{ης} όσο και της 2^{ης} εισαγωγής, για τον προσδιορισμό των κύριων και δευτερευουσών διαγνώσεων. Σύμφωνα με την ΕΚΟΚ 0901 «Ισχαιμική καρδιοπάθεια», δεν πρέπει να κωδικοποιείται η διάγνωση «ασταθής στηθάγχη», όταν συνυπάρχει η διάγνωση «οξύ έμφραγμα μυοκαρδίου».

Νοσοκομείο Α: Συνολική νοσηλεία

Κύρια διάγνωση: Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου
 Δευτερεύουσες διαγνώσεις: Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια
 Ύπαρξη αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass)

D003

D003 Δευτερεύουσες διαγνώσεις

Η δευτερεύουσα διάγνωση ορίζεται ως:

«Μια νόσος ή διαταραχή, η οποία είτε συνυπάρχει με την κύρια διάγνωση είτε ανακύπτει κατά τη διάρκεια της νοσηλείας».

Για τους σκοπούς της κωδικοποίησης, ως δευτερεύουσες διαγνώσεις ορίζονται όλα τα νοσήματα που επηρεάζουν κατά τέτοιο τρόπο τη διαχείριση του ασθενή, ώστε να απαιτείται οποιοδήποτε από τα ακόλουθα μέτρα:

- θεραπευτικά μέτρα
- διαγνωστικά μέσα
- περίθαλψη, παρακολούθηση και νοσηλεία υψηλότερου κόστους

Όλες οι διαγνώσεις που απαιτούν οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα μέτρα, πρέπει να κωδικοποιούνται (είτε ως συνδυασμός κύριας και δευτερευουσών διαγνώσεων, είτε ως πολλαπλές δευτερεύουσες διαγνώσεις), άσχετα με το αν τα μέτρα αυτά εφαρμόστηκαν επίσης και για την κύρια διάγνωση.

Παράδειγμα 1

Ασθενής λαμβάνει β-αναστολέα για τις δευτερεύουσες διαγνώσεις της ισχαιμικής καρδιοπάθειας (στεφανιαίας νόσου), της αρτηριακής υπέρτασης και της καρδιακής ανεπάρκειας.

Δευτερεύουσες διαγνώσεις: Ισχαιμική καρδιοπάθεια (στεφανιαία νόσος)
 Αρτηριακή υπέρταση
 Καρδιακή ανεπάρκεια

Νοσήματα, τα οποία καταγράφονται π.χ. από τον αναισθησιολόγο κατά την προεγχειρητική εκτίμηση, κωδικοποιούνται μόνο όταν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια. Ένα συνοδό νόσημα που επηρεάζει και μεταβάλλει τη συνήθη πρακτική μιας συγκεκριμένης ιατρικής πράξης, πρέπει να κωδικοποιείται ως δευτερεύουσα διάγνωση.

Νοσήματα από το ατομικό αναμνηστικό του ασθενή, που δεν επηρεάζουν την αντιμετώπισή του σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια, όπως π.χ. μια θεραπευθείσα (προ 6μήνου) πνευμονία ή ένα επολυωθέν έλκος, δεν πρέπει να κωδικοποιούνται.

Παράδειγμα 2

Μία ασθενής εισάγεται για την αντιμετώπιση χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας (ΧΜΛ). Από το ατομικό της αναμνηστικό αναφέρει επέμβαση στην άρθρωση του γόνατος προ 10ετίας, λόγω ρήξης έξω μηνίσκου. Έκτοτε δεν αναφέρει ενοχλήματα. Συνυπάρχει γνωστή στεφανιαία νόσος, η οποία αντιμετωπίζεται φαρμακευτικά. Στον υπερηχογραφικό έλεγχο των ενδοκοιλιακών λεμφαδένων, απεικονίζεται γνωστό ινομύωμα μήτρας, το οποίο δεν απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση ή θεραπεία. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, η ασθενής εκδηλώνει καταθλιπτική διαταραχή και αντιμετωπίζεται με αντικαταθλιπτική αγωγή. Η ασθενής υποβάλλεται επίσης σε φυσιοθεραπεία, λόγω εμμένουσας οσφυαλγίας.

Κύρια διάγνωση:	Χρόνια μυελογενής λευχαιμία (ΧΜΛ)
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	Καταθλιπτική διαταραχή
	Οσφυαλγία
	Στεφανιαία νόσος

Οι δευτερεύουσες διαγνώσεις πληρούν τον προαναφερθέντα ορισμό (κατανάλωση πόρων) και γι' αυτόν τον λόγο κωδικοποιούνται.

Οι υπόλοιπες διαγνώσεις (ινομυωματώδης μήτρα, προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση μηνίσκου) δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του παραπάνω ορισμού και γι' αυτόν τον λόγο δεν κωδικοποιούνται. Παρ' όλα αυτά, είναι σημαντικές ως ιατρικές πληροφορίες για την πληρότητα του ιατρικού φακέλου.

Παράδειγμα 3

Ασθενής, ο οποίος εισάγεται στο νοσοκομείο για πνευμονία, πάσχει επίσης από σακχαρώδη διαβήτη. Το νοσηλευτικό προσωπικό παρακολουθεί καθημερινά τη γλυκόζη αίματος και ο ασθενής λαμβάνει δίαιτα διαβητικού.

Κύρια διάγνωση:	Πνευμονία
Δευτερεύουσα διάγνωση:	Σακχαρώδης διαβήτης

Παράδειγμα 4

Ασθενής 60 ετών με φλεβική ανεπάρκεια εισάγεται στο νοσοκομείο για την αντιμετώπιση ελκών κνήμης. Λόγω προηγηθέντος ακρωτηριασμού κνήμης, ο ασθενής απαιτεί πρόσθετη υποστήριξη και περίθαλψη από το νοσηλευτικό προσωπικό.

Κύρια διάγνωση:	Έλκη κάτω άκρου επί εδάφους φλεβικής ανεπάρκειας
Δευτερεύουσα διάγνωση:	Ακρωτηριασμός κνήμης από το ατομικό αναμνηστικό

D003

Παράδειγμα 5

Μία παχύσαρκη, ηλικιωμένη ασθενής εισάγεται λόγω χολοκυστολιθίασης, για διενέργεια χολοκυστεκτομής. Μετεγχειρητικά, η ασθενής παθαίνει πνευμονική εμβολή.

Κύρια διάγνωση:	Χολοκυστολιθίαση
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	Πνευμονική εμβολή Παχυσαρκία

Καταχώριση των συμπτωμάτων ή κλινικών ευρημάτων ως δευτερεύουσες διαγνώσεις

Οι κανόνες κωδικοποίησης των δευτερευουσών διαγνώσεων εφαρμόζονται αντίστοιχα και για την κωδικοποίηση των συμπτωμάτων/κλινικών ευρημάτων.

Παράδειγμα 6

Ασθενής εισάγεται για αντιμετώπιση αλκοολικής κίρρωσης ήπατος, προχωρημένου σταδίου. Συνυπάρχει εκτεταμένη ασκίτικη συλλογή, η οποία επηρεάζει εκτός των άλλων την αναπνευστική και νεφρική λειτουργία του ασθενούς. Η ασκίτικη συλλογή αντιμετωπίζεται με εκκενωτικές παρακεντήσεις του ασκίτικού υγρού.

Κύρια διάγνωση:	Αλκοολική κίρρωση ήπατος
Δευτερεύουσα διάγνωση:	Ασκίτης

Σειρά καταχώρισης των δευτερευουσών διαγνώσεων

Δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες για τη σειρά καταχώρισης των δευτερευουσών διαγνώσεων. Παρ' όλα αυτά πρέπει να καταχωρίζονται πρώτα οι σημαντικότερες δευτερεύουσες διαγνώσεις, ειδικότερα οι επιπλοκές και τα συνοδά νοσήματα, καθώς ο αριθμός των διαθέσιμων πεδίων κωδικοποίησης είναι περιορισμένος. Εάν η κωδικοποίηση μιας διάγνωσης απαιτεί περισσότερους από έναν κωδικούς (π.χ. σύστημα «σταυρού-αστερίσκου»), τότε λαμβάνεται υπόψη η οδηγία ΕΚΟΚ D012 «Πολλαπλή κωδικοποίηση» (σελίδα 21).

Παθολογικά ευρήματα

Παθολογικά εργαστηριακά, ακτινολογικά, παθολογοανατομικά και άλλα διαγνωστικά ευρήματα δεν πρέπει να κωδικοποιούνται, εκτός αν έχουν κλινική σημασία για τη θεραπεία ή την περαιτέρω διερεύνηση (όχι μόνο καταγραφή παθολογικών τιμών).

D004

Παράδειγμα 7

Ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο λόγω πνευμονίας. Στις εργαστηριακές εξετάσεις διαπιστώνεται ελαφρώς αυξημένη γ-GT, η οποία δεν έχει περαιτέρω διαγνωστική ή θεραπευτική σημασία.

Κύρια διάγνωση: Πνευμονία

Παρατήρηση: Η ελαφρώς αυξημένη γ-GT δεν πληροί τις προϋποθέσεις του ορισμού της δευτερεύουσας διάγνωσης και γι' αυτόν τον λόγο δεν πρέπει να κωδικοποιείται. Παρ' όλα αυτά είναι σημαντική ως ιατρική πληροφορία για την πληρότητα του ιατρικού φακέλου.

D004 Σύνδρομα

Εάν σε ένα σύνδρομο αντιστοιχεί συγκεκριμένος κωδικός στους καταλόγους ICD-10-GrM, τότε πρέπει να καταχωρίζεται αυτός ο κωδικός. Ο ορισμός της κύριας διάγνωσης εφαρμόζεται και εδώ κανονικά. Επομένως, όταν η αιτία νοσηλείας είναι μια συγκεκριμένη κλινική εκδήλωση του συνδρόμου (π.χ. συγγενής καρδιοπάθεια), τότε πρέπει αυτή να κωδικοποιείται ως κύρια διάγνωση (βλέπε ΕΚΟΚ D002 *Κύρια διάγνωση*, σελίδα 4).

Παράδειγμα 1

Ένα δυσμορφικό παιδί εισάγεται για διερεύνηση του υποκείμενου συνδρόμου. Η διερεύνηση θέτει τη διάγνωση της τρισωμίας 21, με μη διαχωρισμό (non disjunction) κατά τη μειωτική διαίρεση (σύνδρομο Down).

Κύρια διάγνωση: Q90.0 *Τρισωμία 21, μη διαχωρισμός κατά τη μειωτική διαίρεση*

Παράδειγμα 2

Ένα παιδί με τρισωμία 21, με μη διαχωρισμό κατά τη μειωτική διαίρεση (σύνδρομο Down), εισάγεται λόγω συγγενούς ελλείμματος μεσοκοιλιακού διαφράγματος, για καρδιοχειρουργική επέμβαση.

Κύρια διάγνωση: Q21.0 *Έλλειμμα στο μεσοκοιλιακό διάφραγμα [μεσοκοιλιακό έλλειμμα]*

Δευτερεύουσα διάγνωση: Q90.0 *Τρισωμία 21, μη διαχωρισμός κατά τη μειωτική διαίρεση*

Εάν δεν υπάρχει συγκεκριμένος κωδικός στους καταλόγους ICD-10-GrM που να αντιστοιχεί στο εκάστοτε σύνδρομο, τότε πρέπει να κωδικοποιούνται οι μεμονωμένες κλινικές εκδηλώσεις του συνδρόμου.

D005

Σε περίπτωση που ο ορισμός της κύριας διάγνωσης ταιριάζει σε δύο διαφορετικές κλινικές εκδηλώσεις του συνδρόμου, τότε πρέπει να λαμβάνεται υπόψη για την κωδικοποίηση η ΕΚΟΚ D002 *Κύρια διάγνωση*, παράγραφος «*Δύο ή περισσότερες διαγνώσεις, που αντιστοιχούν εξίσου στον ορισμό της κύριας διάγνωσης*» (σελ. 4).

Σε ένα συγγενές σύνδρομο πρέπει να καταχωρίζεται ως δευτερεύουσα διάγνωση, μαζί με τις ήδη κωδικοποιημένες κλινικές εκδηλώσεις του συνδρόμου, και ένας πρόσθετος κωδικός από την ομάδα Q87 *Άλλα καθορισμένα σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών με συμμετοχή πολλών συστημάτων*. Ο πρόσθετος κωδικός αποτελεί ένδειξη, ότι δεν υπάρχει κάποιος κωδικός στους καταλόγους ICD-10-GrM για το συγκεκριμένο σύνδρομο.

Παράδειγμα 3

Ένα αγόρι με σύνδρομο Galloway-Mowat (μικροκεφαλία, διαφραγματοκήλη και νεφρωσικό σύνδρομο, κληρονομούμενο με τον αυτοσωμικό υπολειπόμενο χαρακτήρα) εισάγεται για βιοψία νεφρού. Ιστολογικά ανευρίσκονται εστιακές και τμηματικές σπειραματικές αλλοιώσεις.

Κύρια διάγνωση:	N04.1	<i>Νεφρωσικό σύνδρομο: Εστιακές και τμηματικές σπειραματικές βλάβες</i>
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	Q40.1	<i>Συγγενής κήλη οισοφαγικού τρήματος [οισοφαγοκήλη]</i>
	Q02	<i>Μικροκεφαλία</i>
	Q87.8	<i>Άλλα καθορισμένα σύνδρομα συγγενών ανωμαλιών, που δεν ταξινομούνται αλλού</i>
Ιατρική πράξη:	146.03.00	<i>Διαδερμική βιοψία (δια βελόνης) στο ουροποιητικό και το ανδρικό γεννητικό σύστημα, νεφρός</i>

D005 Δευτεροπαθείς καταστάσεις και προγραμματισμένες επεμβάσεις αντιμετώπισής τους

Δευτεροπαθείς καταστάσεις ή όψιμα αποτελέσματα μίας νόσου είναι **τρέχουσες** καταστάσεις που έχουν προκληθεί από μία προηγούμενη νόσο.

Δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί για τη χρήση των κωδικών που αφορούν τις δευτεροπαθείς καταστάσεις. Η δευτεροπαθής κατάσταση μπορεί να είναι ήδη εμφανής από το πρώιμο στάδιο μιας νόσου, όπως π.χ. νευρολογικές επιπλοκές ενός αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, ή να εκδηλώνεται μετά από πάροδο ετών, όπως π.χ. η χρόνια νεφρική ανεπάρκεια ως αποτέλεσμα μιας προηγούμενης φυματιώδους προσβολής των νεφρών. Η κωδικοποίηση των δευτεροπαθών καταστάσεων μιας νόσου απαιτεί δύο κωδικούς:

- έναν κωδικό για την τρέχουσα δευτεροπαθή κατάσταση και

- έναν κωδικό του τύπου «δευτεροπαθείς καταστάσεις...», ο οποίος υποδηλώνει ότι αυτή η κατάσταση έχει προκύψει ως αποτέλεσμα μιας προηγηθείσας νόσου.

Αρχικά κωδικοποιείται η δευτεροπαθής κατάσταση, και ακολουθεί ο κωδικός «δευτεροπαθείς καταστάσεις».

Παράδειγμα 1

Τύφλωση ενός οφθαλμού σε έδαφος προηγηθέντος τραχώματος.

H54.4 *Τύφλωση και ιδιαιτέρως μεγάλης βαρύτητας ελάττωση της όρασης, ετερόπλευρα*

B94.0 *Δευτεροπαθείς καταστάσεις του τραχώματος*

Παράδειγμα 2

Μονοπληγία ενός άνω άκρου σε έδαφος προηγηθείσας οξείας πολιομυελίτιδας.

G83.2 *Μονοπάρεση και μονοπληγία ενός άνω άκρου*

B91 *Δευτεροπαθείς καταστάσεις της πολιομυελίτιδας*

Παράδειγμα 3

Σπαστική ημιπληγία σε έδαφος προηγηθέντος εμβολικού εγκεφαλικού επεισοδίου.

G81.1 *Σπαστική ημιπάρεση και ημιπληγία*

I69.4 *Δευτεροπαθείς καταστάσεις ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, μη καθορισμένου ως αιμορραγικού ή εμφρακτικού*

Παράδειγμα 4

Ασθενής εισάγεται για αντιμετώπιση κατάγματος κερκίδας, πρωθέντος σε πλημμελή θέση.

M84.03 *Πώρωση κατάγματος σε πλημμελή θέση: Αντιβραχίου*

T92.1 *Δευτεροπαθείς καταστάσεις κατάγματος του βραχίονα*

Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που ένας ασθενής, εισάγεται για χειρουργική αντιμετώπιση ρήξης τένοντα στην περιοχή των δακτύλων, που έλαβε χώρα προ δύο εβδομάδων, αυτό δεν κωδικοποιείται ως όψιμο αποτέλεσμα, καθώς η ρήξη είναι ακόμη προς αντιμετώπιση.

D005

Ειδικοί κωδικοί για τις αιτίες των δευτεροπαθών καταστάσεων είναι:

- B90.– Δευτεροπαθείς καταστάσεις της φυματίωσης
B91 Δευτεροπαθείς καταστάσεις της πολιομυελίτιδας
B92 Δευτεροπαθείς καταστάσεις της λέπρας
B94.– Δευτεροπαθείς καταστάσεις άλλων και μη καθορισμένων λοιμωδών και παρασιτικών νοσημάτων
E64.– Δευτεροπαθείς καταστάσεις υποσιτισμού και άλλων τροφικών ανεπαρκειών
E68 Δευτεροπαθείς καταστάσεις του υπερσιτισμού
G09 Δευτεροπαθείς καταστάσεις των φλεγμονωδών νοσημάτων του κεντρικού νευρικού συστήματος
I69.– Δευτεροπαθείς καταστάσεις των νοσημάτων των εγκεφαλικών αγγείων
O94 Δευτεροπαθείς καταστάσεις επιπλοκών της κύησης, του τοκετού και της λοχείας
T90–T98 Δευτεροπαθείς καταστάσεις τραυματισμών, δηλητηριάσεων και άλλων συνεπειών από εξωτερικές αιτίες

Αντιμετώπιση ενός οξέος τραυματισμού/εγκαύματος και προγραμματισμένη επανεπέμβαση

Ο κωδικός ενός οξέος τραυματισμού/εγκαύματος πρέπει να καταχωρίζεται τόσο για την αρχική όσο και τη σε δεύτερο χρόνο αντιμετώπισή του.

Εάν στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης θεραπευτικής προσέγγισης προγραμματιστεί μία επανεπέμβαση ήδη από τη στιγμή της αρχικής επέμβασης, τότε, ως κύρια διάγνωση της νοσηλείας επανεπέμβασης, πρέπει να καταχωρίζεται η αρχική πάθηση, ακόμη κι όταν αυτή έχει πια παρέλθει (βλέπε παραδείγματα 5 και 6).

Παράδειγμα 5

Ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο για την κατάργηση μιας κολοστομίας, η οποία είχε διενεργηθεί σε προηγούμενη χειρουργική επέμβαση για εκκολπωματίτιδα του σιγμοειδούς. Η εκκολπωματίτιδα έχει εν τω μεταξύ αποκατασταθεί.

Κύρια διάγνωση: Εκκολπωματίτιδα σιγμοειδούς
Δευτερεύουσα διάγνωση: Χειρισμοί κολοστομίας

Η αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης και οποιαδήποτε άλλη αντιμετώπιση σε δεύτερο χρόνο (π.χ. αφαίρεση ενός ορθοπαιδικού ήλου), στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης θεραπευτικής προσέγγισης ενός τραυματισμού, πρέπει να διαφοροποιείται από την αντιμετώπιση μιας δευτεροπαθούς κατάστασης του τραυματισμού (βλέπε παράδειγμα 4). Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός για τον αρχικό

D006

τραυματισμό ως κύρια διάγνωση, ακολουθούμενος από έναν κωδικό του κεφαλαίου XXI *Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας* (π.χ. Z47.0 *Αφαίρεση πλάκας και άλλης συσκευής εσωτερικής οστεοσύνθεσης*) ως δευτερεύουσα διάγνωση, μαζί με τον αντίστοιχο κωδικό για την ιατρική πράξη.

Παράδειγμα 6

Ασθενής εισάγεται για αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης, ένα χρόνο μετά από κάταγμα στο κάτω τριτημόριο της κερκίδας (με εξάρθρημα της κεφαλής της ωλένης), το οποίο είχε αντιμετωπιστεί με τοποθέτηση πλάκας οστεοσύνθεσης.

Κύρια διάγνωση:	S52.31	<i>Κάταγμα του άπω τμήματος της κερκίδας με εξάρθρημα της κεφαλής της ωλένης</i>
Δευτερεύουσα διάγνωση:	Z47.0	<i>Αφαίρεση πλάκας και άλλης συσκευής εσωτερικής οστεοσύνθεσης</i>
Ιατρική πράξη:	378.07.03.05	<i>Αφαίρεση υλικού οστεοσύνθεσης, πλάκα, διάφυση κερκίδας</i>

D006 Οξεία και χρόνια νοσήματα

Σε περίπτωση που ένας ασθενής πάσχει από την οξεία μορφή, π.χ. παρόξυνση, ενός χρόνιου νοσήματος, πρέπει να κωδικοποιείται η οξεία εκδήλωση ως κύρια διάγνωση και η χρόνια μορφή του νοσήματος ως δευτερεύουσα διάγνωση, εφόσον διατίθενται διαφορετικοί κωδικοί για καθεμία από αυτές.

Παράδειγμα 1

Ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο με παρόξυνση μιας χρόνιας ιδιοπαθούς παγκρεατίτιδας χωρίς επιπλοκές από άλλα όργανα.

Κύρια διάγνωση:	K85.00	<i>Ιδιοπαθής οξεία παγκρεατίτιδα: χωρίς επιπλοκές από άλλα όργανα</i>
Δευτερεύουσα διάγνωση:	K86.1	<i>Άλλες μορφές χρόνιας παγκρεατίτιδας</i>

Εξαιρέσεις: Ο κανόνας αυτός δεν ισχύει όταν:

- στο ICD-10-GrM υπάρχει ένας κωδικός για το συνδυασμό των δύο καταστάσεων, π.χ.:
J44.1- *Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με οξεία παρόξυνση, μη καθορισμένη*
- υπάρχει αντίθετη οδηγία στο ICD-10-GrM, π.χ.
C92.0- *Οξεία μυελοβλαστική λευχαιμία [ΟΜΛ]*

D007

Εξαιρ.: έξαρση (οξεία κρίση) μιας χρόνιας μυελογενούς λευχαιμίας (C92.1-)

C92.1- Χρόνια μυελογενής λευχαιμία, BCR/ABL+ (θετική)

Εδώ πρέπει να καταχωριστεί μόνο ένας κωδικός της κατηγορίας C92.1-, και η κατάσταση ύφεσης ή μη θα αποδοθεί με τον 5^ο χαρακτήρα.

- γ. από το ICD-10-GrM προκύπτει ότι απαιτείται μόνο ένας κωδικός. Για παράδειγμα, όσον αφορά την κωδικοποίηση της «παρόξυνσης μιας χρόνιας μεσεντέριας λεμφαδενίτιδας», από το αλφαβητικό ευρετήριο είναι προφανές ότι η οξεία εκδήλωση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά, καθώς περιλαμβάνεται σε παρένθεση μετά τον κύριο όρο του νοσήματος (δηλαδή δεν τροποποιεί την ουσία του όρου):

188.0 Μη ειδική μεσεντέριος λεμφαδενίτιδα (οξεία) (χρόνια)

D007 Εισαγωγή για χειρουργική επέμβαση/ιατρική πράξη, που δεν διενεργήθηκε

Όταν ένας ασθενής εισάγεται για διεξαγωγή χειρουργικής επέμβασης/ιατρικής πράξης, η οποία για οποιοδήποτε λόγο τελικά δεν διενεργείται και ο ασθενής εξέρχεται, τότε η κωδικοποίηση πρέπει να γίνεται ως εξής:

- α) Όταν η χειρουργική επέμβαση/ιατρική πράξη δεν διενεργείται για τεχνικούς λόγους:

Παράδειγμα 1

Ασθενής εισάγεται προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης σωληνίσκων αερισμού για οροβλεννώδη ωτίτιδα. Η επέμβαση αναβάλλεται για τεχνικούς λόγους.

Κύρια διάγνωση: H65.3 Χρόνια θλενωδης μέση ωτίτιδα

Δευτερεύουσα διάγνωση: Z53 Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για ειδικές ιατρικές πράξεις, που δεν διενεργήθηκαν

- β) Όταν η χειρουργική επέμβαση/ιατρική πράξη δεν διενεργείται εξαιτίας μιας νόσου ή επιπλοκής που προκύπτει μετά την εισαγωγή του ασθενούς:

Παράδειγμα 2

Ασθενής με υποτροπιάζουσες αμυγδαλίτιδες εισάγεται για να υποβληθεί σε αμυγδαλεκτομή. Η επέμβαση αναβάλλεται λόγω οξείας μετωπιαίας κολπίτιδας.

Κύρια διάγνωση: J35.0 Χρόνια αμυγδαλίτιδα

Δευτερεύουσες διαγνώσεις: Z53 Άτομα που προσέρχονται στις υπηρεσίες υγείας για ειδικές ιατρικές πράξεις, που δεν διενεργήθηκαν

J01.1 Οξεία μετωπιαία κολπίτιδα

D008

D008 Πιθανές διαγνώσεις

Η συγκεκριμένη οδηγία έχει αφαιρεθεί από τις Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης.

D009 Οι κωδικοί «άλλο» και «μη καθορισμένο»

Η υποκατηγορία «άλλο...» χρησιμοποιείται στην κωδικοποίηση, όταν πρόκειται για μια σαφώς καθορισμένη νόσο, για την οποία δεν υπάρχει στον συστηματικό κατάλογο νοσημάτων ICD-10-GrM συγκεκριμένος κωδικός.

Η υποκατηγορία «μη καθορισμένο...» χρησιμοποιείται στην κωδικοποίηση, όταν πρόκειται για μία μη σαφώς καθορισμένη νόσο που ανήκει σε συγκεκριμένη ομάδα νοσημάτων όπως π.χ. η ομάδα νοσημάτων «καταρράκτης», αλλά δεν είναι δυνατή περαιτέρω διαφοροποίηση της σύμφωνα με τους κανόνες του ICD-10-GrM (βλέπε παράδειγμα 3).

Οι υποκατηγορίες «άλλο» και «μη καθορισμένο» έχουν συνήθως ειδική επισήμανση.

Στο επίπεδο του 4^{ου} χαρακτήρα, η ταξινόμηση έχει κατά κανόνα ως εξής:

«.0 – .7» ειδικά νοσήματα (στο κεφάλαιο XIX «Τραυματισμοί και δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες», το ψηφίο «.7» χρησιμοποιείται συχνά για τους «πολλαπλούς τραυματισμούς»)

«.8» ειδικά νοσήματα, τα οποία δεν μπορούν να ταξινομηθούν στην κατηγορία «.0 – .7» (ή «άλλα»)

«.9» «μη καθορισμένο»

Παράδειγμα 1**Υποκατηγορία 4ου χαρακτήρα****Υποδιαίρεσεις των κωδικών**

Κωδικός	Περιγραφή	Κατηγορία
L50.–	Κνίδωση	Κατηγορία
L50.0	Αλλεργική κνίδωση	Ειδική υποκατηγορία
L50.1	Ιδιοπαθής κνίδωση	Ειδική υποκατηγορία
L50.2	Κνίδωση εκ ψύχους ή θερμότητας	Ειδική υποκατηγορία
L50.3	Προκλητή κνίδωση	Ειδική υποκατηγορία
L50.4	Κνίδωση εκ δονήσεως [από μηχανικά ερεθίσματα]	Ειδική υποκατηγορία
L50.5	Χολινεργική κνίδωση	Ειδική υποκατηγορία
L50.6	Κνίδωση εξ επαφής	Ειδική υποκατηγορία
L50.8	Άλλη κνίδωση	Κνίδωση η οποία δεν μπορεί να ταξινομηθεί αλλού
	Κνίδωση:	
	• χρόνια	
	• υποτροπιάζουσα περιοδική	
L50.9	Κνίδωση μη καθορισμένη	Μη ειδική υποκατηγορία

D010

Σε ορισμένες περιπτώσεις οι δύο υποκατηγορίες «.8» και «.9» συνδυάζονται σε έναν κωδικό και περιλαμβάνουν τόσο τον όρο «άλλο» όσο και τον όρο «μη καθορισμένο».

Στο επίπεδο του 5ου χαρακτήρα, η ταξινόμηση δεν είναι ενιαία.

Αυτές οι υποκατηγορίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται, για να «συμπεριλάβουν» διαγνώσεις, οι οποίες φαινομενικά δεν μπορούν να ταξινομηθούν αλλού. Οι κωδικοί του ICD-10-GM πρέπει να χρησιμοποιούνται για να προσδιορίζεται ο σωστός κωδικός (βλέπε επίσης τις ΕΚΟΚ D013 Κοινά αποδεκτοί όροι που χρησιμοποιούνται στον Συστηματικό Κατάλογο (σελίδα 31) και ΕΚΟΚ D014 Κοινά αποδεκτοί όροι που χρησιμοποιούνται στον Αλφαβητικό Κατάλογο (σελίδα 36).

Σε περίπτωση που δεν ανευρίσκεται ένας όρος στους καταλόγους ICD-10-GM πρέπει να αναζητούνται εναλλακτικοί όροι. Αν δεν μπορεί να ανευρεθεί ούτε εναλλακτικός όρος, πρέπει να ακολουθείται για την κωδικοποίηση μία από τις ακόλουθες στρατηγικές:

Παράδειγμα 2

Διάγνωση: Λευκοπλακία του βλεφάρου
Κωδικός: H02.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές του βλεφάρου

Στο Αλφαβητικό Ευρετήριο δεν υπάρχει κάτω από το λήμμα «λευκοπλακία» κανένα δευτερεύον λήμμα «βλεφάρου». Γι' αυτόν τον λόγο, ο χρήστης πρέπει να ανατρέξει στο λήμμα «διαταραχή». Εκεί μπορεί να βρει:

Διαταραχή

- του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, μη καθορισμένη- H57.9
- του βλεφάρου, μη καθορισμένη- H02.9
- άλλη καθορισμένη διαταραχή του βλεφάρου H02.8

Επειδή η λευκοπλακία είναι «καθορισμένη διαταραχή» και στο Αλφαβητικό Ευρετήριο υπάρχει αντίστοιχη παραπομπή, ο σωστός κωδικός που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι ο H02.8.

Παράδειγμα 3

Διάγνωση: Καταρράκτης με υπεξάρθρημα φακού
Κωδικός: H26.9 Καταρράκτης, μη καθορισμένος

Στο αλφαβητικό ευρετήριο δεν υπάρχει κάτω από το λήμμα «καταρράκτης» κανένα δευτερεύον λήμμα «με υπεξάρθρημα φακού» ή «-καθορισμένος, που δεν ταξινομείται αλλού». Γι' αυτόν τον λόγο, ο σωστός κωδικός είναι ο H26.9.

D010 Συνδυαστικοί κωδικοί

Ένας μεμονωμένος κωδικός, ο οποίος χρησιμοποιείται για την ταξινόμηση δύο διαγνώσεων ή μίας διάγνωσης μαζί με μία κλινική της εκδήλωση ή μαζί με μία επιπλοκή της, ορίζεται ως συνδυαστικός κωδικός. Οι συνδυαστικοί κωδικοί καταχωρίζονται μετά από έλεγχο των πρωτεύοντων και δευτερευόντων λημμάτων του αλφαβητικού

D011

ευρετηρίου καθώς και των «σημειώσεων», των «περιλαμβάνονται» και των «εξαιρούνται» του καταλόγου ICD-10-GrM (βλέπε ΕΚΟΚ D013 *Κοινά αποδεκτοί όροι που χρησιμοποιούνται στον Συστηματικό Κατάλογο* (σελίδα 31) και D014 *Κοινά αποδεκτοί όροι που χρησιμοποιούνται στο Αλφαθητικό Ευρετήριο* (σελίδα 36)).

Ένας συνδυαστικός κωδικός πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο, εφόσον αυτός αποδίδει ολοκληρωμένη την αντίστοιχη διαγνωστική πληροφορία και εφόσον το αλφαθητικό ευρετήριο παραπέμπει σε αυτόν.

Όταν στην ταξινόμηση υπάρχει ένας συνδυαστικός κωδικός, που σαφώς συμπεριλαμβάνει όλα τα επιμέρους στοιχεία της διάγνωσης, είναι λάθος να επιλέγεται η πολλαπλή κωδικοποίηση (βλέπε ΕΚΟΚ D012 *Πολλαπλή κωδικοποίηση* (σελίδα 21)).

Παράδειγμα 1

Διάγνωση: Αθηροσκλήρωση των άκρων με γάγγραινα

Σωστός κωδικός:	I70.24	Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με γάγγραινα
Λανθασμένοι κωδικοί:	I70.20	Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Άλλη και μη καθορισμένη
	R02	Γάγγραινα, που δεν ταξινομείται αλλού

D011 Κωδικοποίηση διπλής ή αμφοτερόπλευρη εντόπισης

Σε περίπτωση που ένα νόσημα εκδηλώνεται σε δύο ή περισσότερες εντοπίσεις, τότε ισχύουν για την κωδικοποίηση των διαγνώσεων οι ακόλουθοι κανόνες:

1. Ο κωδικός της διάγνωσης πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο μία φορά.
2. Εάν στο ICD υπάρχει ειδικός κωδικός για ένα αμφοτερόπλευρο νόσημα, πρέπει να χρησιμοποιείται αυτός ο κωδικός (βλέπε παράδειγμα 1).
3. Εάν στο ICD δεν υπάρχουν στοιχεία για την εντόπιση, τότε, μετά τον κωδικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η πρόσθετη ένδειξη «B» για «bilateral», δηλαδή αμφοτερόπλευρα (βλέπε παράδειγμα 2).

Παράδειγμα 1

Ασθενής με αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη, χωρίς περίσφιξη ή γάγγραινα, εισάγεται στο νοσοκομείο. Υποβάλλεται σε λαπαροσκοπική διαπεριτοναϊκή σύγκλιση και των δύο κηλών σε μία συνεδρία.

Κύρια διάγνωση:	K40.20	Αμφοτερόπλευρη βουβωνοκήλη, χωρίς απόφραξη ή γάγγραινα: Μη υποτροπιάζουσα.
Ιατρική πράξη:	353.00.03.01 B	Σύγκλιση βουβωνοκήλης: Με αλλογενές πλαστικό (συνθετικό υλικό): Λαπαροσκοπικά διαπεριτοναϊκά, άμφω

D012

Παράδειγμα 2

Ασθενής με αμφοτερόπλευρο κάταγμα κερκίδας (Colles) εισάγεται στο νοσοκομείο. Υποβάλλεται σε κλειστή ανάταξη των καταγμάτων και σταθεροποίηση με βελόνες.

Κύρια διάγνωση: S52.51 B *Κάταγμα του άπω άκρου της κερκίδας: Εκτακτικού τύπου, άμφω*

Ιατρική πράξη: 379.00.01.06 B *Κλειστή ανάταξη κατάγματος ή επιφυσιόλυσης με οστεοσύνθεση: Με σύρμα ή ταινία ελκυσμού: Άπω άκρο της κερκίδας, άμφω*

Για αμφοτερόπλευρη ή πολλαπλή κωδικοποίηση βλέπε επίσης την ΕΚΟΚ D012 *Πολλαπλή κωδικοποίηση* (σελίδα 2221).

D012 Πολλαπλή κωδικοποίηση

Σημείωση: Επεξηγήσεις ταυτόσημες με αντίστοιχα αποσπάσματα από το εγχειρίδιο οδηγιών του ICD-10, ελληνική έκδοση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) (Τόμος II), θα επισημαίνονται στο τέλος με την ένδειξη «(ΠΟΥ)».

Η πολλαπλή κωδικοποίηση είναι απαραίτητη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

1. Κωδικοποίηση της αιτιολογίας και της κλινικής εκδήλωσης: σύστημα «σταυρού-αστερίσκου»

Οι κωδικοί για την αιτιολογία (το υποκείμενο αίτιο) επισημαίνονται με το σύμβολο του σταυρού (+) και οι κωδικοί για την κλινική εκδήλωση επισημαίνονται με το σύμβολο του αστερίσκου (*). Για την κωδικοποίηση καταχωρίζονται οι κωδικοί με τη σειρά που εμφανίζονται στο Αλφαβητικό Ευρετήριο ή στον Συστηματικό Κατάλογο Νοσημάτων του ICD-10-GrM, δηλ. προηγείται ο κωδικός της αιτιολογίας και ακολουθεί ο κωδικός της κλινικής εκδήλωσης.

Αυτή η σειρά καταχώρισης της αιτιολογίας και της κλινικής εκδήλωσης ισχύει μόνο για το σύστημα «σταυρού-αστερίσκου» και αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση της ΕΚΟΚ D002 *Κύρια διάγνωση*.

Παράδειγμα 1

Διάγνωση: Θυλακίτιδα από γονόκοκκο

ICD-10-GrM

Αλφαβητικό Ευρετήριο: **Θυλακίτιδα από γονόκοκκο A54.4+ M73.09***

ICD-10-GrM

Συστηματικός Κατάλογος: **A54.4+ *Γονοκοκκική λοίμωξη του μυοσκελετικού συστήματος***
Θυλακίτιδα: Γονοκοκκική (M73.0-)*

M73.0-* *Γονοκοκκική θυλακίτιδα (A54.4+)*

Οι ενότητες που περιλαμβάνουν κωδικούς με σταυρό εμφανίζονται με τους ακόλουθους διαφορετικούς τρόπους στον συστηματικό κατάλογο νοσημάτων ICD-10-GrM (ΠΟΥ):

- α) Στην επικεφαλίδα της ενότητας εμφανίζονται και το σύμβολο του σταυρού (+) και ο αντίστοιχος κωδικός με αστερίσκο (*). Όλα τα νοσήματα που κωδικοποιούνται σε αυτήν την ενότητα υπόκεινται σε αυτήν τη διπλή ταξινόμηση και έχουν όλα τον ίδιο κωδικό με αστερίσκο, π.χ.:

Παράδειγμα 2

A17.0+ **Φυματιώδης μηνιγγίτιδα (G01*)**
Φυματιώδης λεπτομηνιγγίτιδα
Φυματίωση των μηνίγγων (εγκεφαλικών) (νωτιαίων)

- β) Στην επικεφαλίδα της ενότητας εμφανίζεται το σύμβολο του σταυρού (+), αλλά όχι ο αντίστοιχος κωδικός με αστερίσκο (*). Όλα τα νοσήματα που κωδικοποιούνται σε αυτήν την ενότητα υπόκεινται σε αυτήν τη διπλή ταξινόμηση, έχουν όμως διαφορετικό κωδικό με αστερίσκο (που παρατίθεται σε κάθε νόσημα), π.χ.:

Παράδειγμα 3

A18.0+ **Φυματίωση των οστών και των αρθρώσεων**
Φυματιώδης:
• αρθρίτιδα (M01.1-*)
• νέκρωση του οστού (M90.0-*)
• μαστοειδίτιδα (H75.0*)
• οστεομυελίτιδα (M90.0-*)
• οστεΐτιδα (M90.0-*)
• υμενίτιδα (M68.0-*)
• τενοντούμενίτιδα (M68.0-*)
Φυματίωση:
• ισχίου (M01.15*)
• γόνατος (M01.16*)
• σπονδυλικής στήλης (M49.0-*)

D012

- γ) Στην επικεφαλίδα της ενότητας δεν εμφανίζονται ούτε το σύμβολο του σταυρού (+), ούτε ο αντίστοιχος κωδικός με αστερίσκο (*). Δεν υπόκειται όλη η ομάδα κωδικών σε αυτήν τη διπλή ταξινόμηση, παρ' όλα αυτά μεμονωμένοι κωδικοί της ομάδας μπορεί να υπόκεινται. Αυτοί οι κωδικοί επισημαίνονται με το σύμβολο του σταυρού (+) και με τον αντίστοιχο κωδικό με αστερίσκο (*), π.χ.:

Παράδειγμα 4**A54.8 Άλλες γονοκοκκικές λοιμώξεις***Γονοκοκκική:*

- *Περιτονίτιδα+ (K67.1*)*
- *Πνευμονία+ (J17.0*)*
- *Σηψαιμία*
- *Δερματική αλλοίωση*

- δ) Όταν κατά την κωδικοποίηση της διάγνωσης, οι κατάλογοι του ICD-10-GrM παραπέμπουν σε έναν κωδικό με αστερίσκο (κλινικής εκδήλωσης), τότε πρέπει επιπλέον να διευκρινίζεται και η αιτιολογία. Γ' αυτόν τον λόγο συμπεριλαμβάνονται στον συστηματικό κατάλογο και στο αλφαβητικό ευρετήριο σημειώσεις για πολλούς κωδικούς (βλέπε παράδειγμα 5). Για την κωδικοποίηση της αιτιολογίας, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν και κωδικοί του συστηματικού καταλόγου ICD-10-GrM χωρίς σταυρό. Σε αυτήν την περίπτωση επισημαίνονται και αυτοί οι κωδικοί με το σύμβολο του σταυρού (+).

Παράδειγμα 5**G63.3* Πολυνευροπάθεια σε άλλα ενδοκρινολογικά και μεταβολικά νοσήματα (E00-E07+, E15-E16+, E20-E34+, E70-E89+)**

Εδώ υπάρχει μία σημείωση στον συστηματικό κατάλογο για πιθανούς κωδικούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταχώριση της αιτιολογίας, οπότε και επισημαίνονται με σταυρό (+), παρότι δεν ορίζονται εξ' αρχής ως κωδικοί με σταυρό π.χ. ο E05.0 *Υπερθυρεοειδισμός με διάχυτη βρογχοκήλη.*

- ε) Σε άλλα σημεία λείπουν σημειώσεις για πιθανούς κωδικούς που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καταχώριση της αιτιολογίας (βλέπε παράδειγμα 6). Εδώ πρέπει να προσδιορίζεται η υποκείμενη αιτία της νόσου από τον θεράποντα ιατρό.

Παράδειγμα 6**J91* Πλευριτική συλλογή σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού**

Εδώ δεν υπάρχει καμία σημείωση για αντίστοιχο κωδικό με σταυρό. Κάθε κωδικός που αποδίδει την αιτιολογία της πλευριτικής συλλογής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να επισημανθεί με σταυρό (+) όπως π.χ. ο I50.1- *Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια.*

2. Σημειώσεις για τη διπλή ταξινόμηση

Σε ορισμένες περιπτώσεις, προκειμένου να περιγραφεί πλήρως η κατάσταση υγείας του ασθενούς, χρησιμοποιούνται διαφορετικοί τρόποι διπλής ταξινόμησης από το σύστημα σταυρού-αστερίσκου. Πολλές από αυτές τις περιπτώσεις επισημαίνονται στη σημείωση «Για την κωδικοποίηση του...», πρέπει να χρησιμοποιείται πρόσθετος κωδικός» του συστηματικού καταλόγου ICD-10 (ΠΟΥ).

Εδώ περιλαμβάνονται:

- **Τοπικές λοιμώξεις σε καταστάσεις, που ταξινομούνται στα κεφάλαια των «οργανικών νοσημάτων».** Για τον προσδιορισμό του λοιμογόνου παράγοντα, εφόσον αυτός δεν αναφέρεται στον αρχικό κωδικό, καταχωρίζονται επιπλέον κωδικοί από το κεφάλαιο I *Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα*. Για αυτόν τον σκοπό διατίθεται η υποομάδα B95!-B98! *Βακτήρια, ιοί και άλλοι λοιμογόνοι παράγοντες* στο τέλος του κεφαλαίου I (βλέπε πίνακα 2 (σελίδα 28)).
- **Νεοπλάσματα με λειτουργική (ενδοκρινική) δραστηριότητα.** Ένας κατάλληλος κωδικός από το κεφάλαιο IV *Ενδοκρινικά, διατροφικά και μεταβολικά νοσήματα* μπορεί να καταχωρίζεται μαζί με τον εκάστοτε κωδικό του κεφαλαίου II *Νεοπλάσματα*, για τον προσδιορισμό ενός νεοπλασματος με λειτουργική δραστηριότητα.
- **Μορφολογία των νεοπλασμάτων.** Παρόλο που οι κωδικοί για τη μορφολογία (βλέπε τόμο 1, παράρτημα «μορφολογία των νεοπλασμάτων») δεν αποτελούν τμήμα της κύριας ταξινόμησης του ICD-10, μπορούν να καταχωριστούν μαζί με έναν κωδικό του κεφαλαίου II, για τον προσδιορισμό της μορφολογίας (ιστολογίας) των νεοπλασμάτων.
- **Συμπληρωματικοί κωδικοί για καταστάσεις του κεφαλαίου V *Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς*, F00–F09 (Οργανικές ψυχικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων των συμπτωματικών).** Η υποκείμενη βασική νόσος, τραυματισμός ή άλλη εγκεφαλική βλάβη, μπορεί να καταχωριστεί με έναν πρόσθετο κωδικό από άλλο κεφάλαιο.
- **Χρήση δύο κωδικών για την καταχώριση ενός τραυματισμού, μιας δηλητηρίασης ή άλλης ανεπιθύμητης ενέργειας.** Συμπληρωματικά σε έναν κωδικό από το κεφάλαιο XIX *Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες* για τον τύπο του τραυματισμού, μπορεί να καταχωριστεί ένας κωδικός από το κεφάλαιο XX *Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας* για την κωδικοποίηση της αιτίας.

Σημείωση: Τόσο οι κωδικοί για τη μορφολογία των νεοπλασμάτων όσο και οι κωδικοί από το κεφάλαιο XX *Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνητότητας* δεν αφορούν την ομαδοποίηση DRG.

Σειρά καταχώρισης των κωδικών σε πολλαπλή κωδικοποίηση

Οι κωδικοί του ICD-10-GrM χωρίς επισήμανση ή με την επισήμανση του σταυρού (αιτιολογία, «+») χαρακτηρίζονται στο εξής ως **αυτόνομοι κωδικοί**, γιατί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανεξάρτητοι κωδικοί.

D012

Οι κωδικοί του ICD-10-GrM με την επισήμανση του **αστερίσκου** (κλινική εκδήλωση, «*») ή του **θαυμαστικού** («!») χαρακτηρίζονται στο εξής ως **εξαρτημένοι κωδικοί**, γιατί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνοι τους, αλλά μόνο σε συνδυασμό με έναν αυτόνομο κωδικό.

Για τη σειρά καταχώρισης των κωδικών του ICD-10-GrM, σε περιπτώσεις πολλαπλής κωδικοποίησης με αυτόνομους και εξαρτημένους κωδικούς, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες:

- Ο αυτόνομος κωδικός τοποθετείται πριν από τον εξαρτημένο κωδικό.
- Ένας αυτόνομος κωδικός ισχύει για όλους τους εξαρτημένους κωδικούς μέχρι την εμφάνιση του επόμενου αυτόνομου κωδικού.
- Ένας εξαρτημένος κωδικός δεν μπορεί ποτέ να υπαχθεί σε άλλον εξαρτημένο κωδικό (δηλ. ένας κωδικός με θαυμαστικό δεν μπορεί να υπαχθεί σε έναν κωδικό με αστερίσκο και το αντίστροφο).

Σύστημα σταυρού-αστερίσκου

Στις Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης, ειδικά στα παραδείγματα, οι κωδικοί ταξινομούνται με βάση τους ανώτερους κανόνες.

Παράδειγμα 7 (από την ΕΚΟΚ 0401 Σακχαρώδης διαβήτης)

Ασθενής με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι με περιφερικές αγγειακές επιπλοκές του τύπου της αθηροσκλήρωσης των αρτηριών των άκρων, με άλγος ηρεμίας εισάγεται για επέμβαση αγγειακής παράκαμψης (bypass). Επιπλέον ο ασθενής πάσχει από αμφιβληστροειδοπάθεια με σοβαρή μείωση της οπτικής οξύτητας.

Κύρια διάγνωση:	E10.50+	<i>Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1]: με επιπλοκές από τα περιφερικά αγγεία: μη καθορισμένος ως απορρυθμισμένος</i>
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	I79.2*	<i>Περιφερική αγγειοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού</i>
	I70.22	<i>Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με άλγος ηρεμίας</i>
	E10.30+	<i>Ινσουλινοεξαρτώμενος διαβήτης [τύπου 1]: με οφθαλμικές επιπλοκές: μη καθορισμένος ως απορρυθμισμένος</i>
	H36.0*	<i>Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια</i>

Σημείωση: Ο κωδικός I70.22 *Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με άλγος ηρεμίας* χρησιμεύει σε αυτό το παράδειγμα για τον περαιτέρω προσδιορισμό της περιγραφόμενης από το σύστημα σταυρού-αστερίσκου διάγνωσης. Δεν πρέπει να κωδικοποιείται ως κύρια διάγνωση.

D012

Το παράδειγμα 7 θα πρέπει να αναλυθεί με βάση τις *Συντακτικές Υποδείξεις*:

Διαγνώσεις	Αυτόνομος κωδικός (Αυτόνομη διάγνωση)	Εξαρτημένος κωδικός (Εξαρτημένη διάγνωση)
Κύρια διάγνωση	E10.50+	I79.2*
Δευτερεύουσα διάγνωση	I70.22	
Δευτερεύουσα διάγνωση	E10.30+	H36.0*

Παράδειγμα 8 (από ΕΚΟΚ 0401 Σακχαρώδης διαβήτης)

Ασθενής με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Ι, με πολλαπλές επιπλοκές του τύπου της αθηροσκλήρωσης των αρτηριών των άκρων, με αμφιβληστροειδοπάθεια και νεφροπάθεια, εισάγεται λόγω βαριάς απορρύθμισης του σακχαρώδη διαβήτη.

Κύρια διάγνωση:	E10.73	<i>Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1]: με πολλαπλές επιπλοκές: με άλλες πολλαπλές επιπλοκές, καθορισμένος ως απορρυθμισμένος</i>
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	I79.2*	<i>Περιφερική αγγειοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού</i>
	H36.0*	<i>Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια</i>
	N08.3*	<i>Σπειραματικές διαταραχές στον σακχαρώδη διαβήτη</i>

Σημείωση: Ο κωδικός E10.73 επισημαίνεται με σταυρό «+», καθώς αποδίδει την αιτιολογία του κωδικού με αστερίσκο (κλινικής εκδήλωσης) που έπεται. Σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες κωδικοποίησης ο «κωδικός για την αιτιολογία» πρέπει να καταχωρίζεται πριν από τον «κωδικό για την κλινική εκδήλωση». Εάν περισσότερες από μία κλινικές εκδηλώσεις οφείλονται σε μία κοινή αιτία, όπως σε αυτό το παράδειγμα, τότε από τον αντίστοιχο κωδικό αιτιολογίας εξαρτώνται όλοι οι κωδικοί με αστερίσκο (κλινικών εκδηλώσεων) που έπονται, μέχρι να εμφανιστεί ο επόμενος κωδικός αιτιολογίας (με σταυρό ή χωρίς επισήμανση). Έτσι ο κωδικός E10.73+ αποδίδει την αιτιολογία των κλινικών εκδηλώσεων I79.2*, H36.0* και N08.3*.

Το παράδειγμα 8 θα πρέπει να αναλυθεί με βάση τις *Συντακτικές Υποδείξεις*:

Διαγνώσεις	Αυτόνομος κωδικός (Αυτόνομη διάγνωση)	Εξαρτημένος κωδικός (Εξαρτημένη διάγνωση)
Κύρια διάγνωση	E10.73+	I79.2*
Δευτερεύουσα διάγνωση	E10.73+	H36.0*
Δευτερεύουσα διάγνωση	E10.73+	N08.3*

D012

Κωδικοί με θαυμαστικό

Οι κωδικοί με θαυμαστικό (π.χ. S31.83! *Ανοικτό τραύμα(οποιοδήποτε τμήματος της κοιλιάς της οσφυοϊερής περιοχής της πυέλου) σε συνδυασμό με ενδοκοιλιακή κάκωση*) χαρακτηρίζονται στο ICD-10-GrM ως «προαιρετικοί» κωδικοί. Οι εξαρτημένοι κωδικοί που επισημαίνονται με θαυμαστικό κωδικοποιούνται σε κάποιες περιπτώσεις προαιρετικά, και σε άλλες υποχρεωτικά.

Οι πίνακες 1 και 2 παρέχουν μία σύνοψη για τους κωδικούς/κατηγορίες ICD-10-GrM που επισημαίνονται με θαυμαστικό.

Οι κωδικοί με θαυμαστικό του πίνακα 1 μπορούν να χρησιμοποιούνται προαιρετικά, εάν έχουν νόημα από ιατρικής άποψης.

Πίνακας 1: Κωδικοί/κατηγορίες με θαυμαστικό, που χρησιμοποιούνται προαιρετικά:

U99.-!	<i>Ανενεργός κωδικός U99</i>
V, W, X, Y	<i>Όλοι οι κωδικοί από το κεφάλαιο XX (Εξωτερικές αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας)</i>
Z33!	<i>Διαπίστωση κύησης ως τυχαίο εύρημα</i>
Z50.-!	<i>Μέτρα ιατρικής αποκατάστασης</i>
Z54.-!	<i>Ανάρρωση</i>

Παράδειγμα 9

Ασθενής εισάγεται με κάταγμα του μετακαρπίου της άκρας χείρας. Διαπιστώνεται ως τυχαίο εύρημα, ότι η ασθενής βρίσκεται στην 6^η εβδομάδα κύησης και τίθεται υπό παρακολούθηση.

Κύρια διάγνωση:	S62.32	<i>Κάταγμα άλλου μετακαρπίου οστού: Διάφυση</i>
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	Z33!	<i>Διαπίστωση κύησης ως τυχαίο εύρημα</i>
	O09.1!	<i>Διάρκεια [ηλικία] κύησης: 5 έως και 13 ολοκληρωμένες εβδομάδες</i>
	Z34	<i>Παρακολούθηση φυσιολογικής κύησης</i>

Όλοι οι κωδικοί με θαυμαστικό του πίνακα 2 πρέπει να χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά.

Πίνακας 2: Κωδικοί/κατηγορίες με θαυμαστικό που χρησιμοποιούνται υποχρεωτικά:

B95.-!	<i>Στρεπτόκοκκος [Streptococcus] και σταφυλόκοκκος [Staphylococcus] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια</i>
--------	---

B96.-!	Άλλοι καθορισμένοι βακτηριακοί παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B97.-!	Ιογενείς παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
B98.-!	Άλλοι καθορισμένοι λοιμογόνοι παράγοντες ως αιτιολογικοί παράγοντες σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
C95.8!	Λευχαιμία, ανθεκτική στη θεραπεία εφόδου [induction therapy]
C97!	Κακοήθη νεοπλασμάτα με ανεξάρτητες πρωτοπαθείς πολλαπλές εντοπίσεις
G82.6-!	Λειτουργικό επίπεδο της βλάβης του νωτιαίου μυελού
I67.80!	Αγγειόσπασμος σε υπαραχνοειδή αιμορραγία
K72.7-!	Ηπατική εγκεφαλοπάθεια και ηπατικό κώμα
N39.47!	Υποτροπιάζουσα [μετεπεμβατική] ακράτεια ούρων
O09.-!	Διάρκεια [ηλικία] κύησης
R65.-!	Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS]
S06.7-!	Απώλεια συνείδησης μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση
S14.7!	Ύψος λειτουργικής βλάβης σε τραυματισμό της
S24.7!	αυχενικής/θωρακικής/οσφυοϊερής μοίρας νωτιαίου μυελού
S34.7!	
S01.83!	Ανοικτό τραύμα (οποιοδήποτε μέρους της κεφαλής/του θώρακα/της
S21.83!	κοιλιάς/της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου) σε συνδυασμό με
S31.83!	ενδοκρανιακή/ενδοθωρακική/ενδοκοιλιακή κάκωση
Sx1.84!	Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα (οποιασδήποτε εντόπισης)
Sx1.85!	Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα (οποιασδήποτε εντόπισης)
Sx1.86!	Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε κλειστό κάταγμα ή εξάρθρωμα (οποιασδήποτε εντόπισης)
Sx1.87!	Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα (οποιασδήποτε εντόπισης)
Sx1.88!	Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα (οποιασδήποτε εντόπισης)
Sx1.89!	Κάκωση μαλακών μορίων 3ου (III) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα (οποιασδήποτε εντόπισης)
T31.-!	Θερμικά εγκαύματα που ταξινομούνται σύμφωνα με την έκταση της επιφάνειας του σώματος που καταλαμβάνουν
T32.-!	Χημικά εγκαύματα που ταξινομούνται σύμφωνα με την έκταση της επιφάνειας του σώματος που καταλαμβάνουν

D012

U60.-!	<i>Κλινικές κατηγορίες της νόσου HIV</i>
U61.-!	<i>Αριθμός T-βοηθητικών κυττάρων (CD4+) στη νόσο HIV</i>
U69.00!	<i>Αλλού ταξινομημένη, ενδονοσοκομειακή πνευμονία σε ασθενή ηλικίας άνω των 18 ετών</i>
U69.10!	<i>Αλλού ταξινομημένη νόσος, για την οποία υπάρχει η υποψία ότι είναι αποτέλεσμα μιας ιατρικώς μη ενδεδειγμένης αισθητικής επέμβασης, διενέργειας δερματοστιξίας [τατουάζ], ή τρυπήματος σημείων του σώματος [piercing]</i>
U80.-!	<i>Λοιμογόνοι παράγοντες ορισμένης ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά, που απαιτούν ειδική θεραπευτική αγωγή ή ειδικά υγειονομικά μέτρα πρόληψης</i>
U81!	<i>Βακτήρια πολυανθεκτικά στα αντιβιοτικά</i>
U82.-!	<i>Μυκοβακτηρίδια ανθεκτικά στα αντιφυματικά φάρμακα (αντιφυματικά πρώτης γραμμής)</i>
U83!	<i>Κάντιντα [Candida] ανθεκτική στη φλουκοναζόλη ή βορικοναζόλη</i>
U84!	<i>Ιός του απλού έρπητα [HSV] ανθεκτικός στα αντιικά φάρμακα</i>
U85!	<i>Ιός της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] ανθεκτικός στα αντιικά και στους αναστολείς πρωτεάσης</i>
Z37.-!	<i>Έκβαση τοκετού</i>

Υπάρχει περίπτωση ένας κωδικός με θαυμαστικό να μπορεί να υπαχθεί, από ιατρικής άποψης, σε περισσότερους από έναν αυτόνομους κωδικούς (βλέπε παράδειγμα 10). Τότε ο εξαρτημένος κωδικός καταχωρίζεται υποχρεωτικά μία φορά στο τέλος της λίστας των αντίστοιχων αυτόνομων κωδικών. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να κωδικοποιείται ο εξαρτημένος κωδικός μόνο μία φορά και να καταχωρίζεται στο τέλος της λίστας των αντίστοιχων αυτόνομων κωδικών.

Παράδειγμα 10

(από ΕΚΟΚ 1905 Ανοικτά τραύματα και κακώσεις)

Ασθενής εισάγεται με πλήρη ρήξη νεφρικού παρεγχύματος, ρήξη σπληνός με συμμετοχή του παρεγχύματος και μικρές ρήξεις σε πολλαπλά τμήματα του λεπτού εντέρου, καθώς και εκσπλάχνωση.

Κύρια διάγνωση:	S37.03	<i>Πλήρης ρήξη νεφρικού παρεγχύματος</i>
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	S36.03	<i>Τραυματική ρήξη σπληνός με συμμετοχή του παρεγχύματος</i>
	S36.49	<i>Τραυματισμός: Άλλα και πολλαπλά τμήματα του λεπτού εντέρου</i>
	S31.83!	<i>Ανοικτό τραύμα (οποιοδήποτε τμήματος της κοιλιάς, της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου) σε συνδυασμό με ενδοκοιλιακή κάκωση</i>

Το παράδειγμα 10 θα πρέπει να αναλυθεί με βάση τις *Συντακτικές Υποδείξεις*:

Διαγνώσεις	Αυτόνομος κωδικός (Αυτόνομη διάγνωση)	Εξαρτημένος κωδικός (Εξαρτημένη διάγνωση)
Κύρια διάγνωση	S37.03	S31.83!
Δευτερεύουσα διάγνωση	S36.03	S31.83!
Δευτερεύουσα διάγνωση	S36.49	S31.83!

D013 Κοινά αποδεκτοί όροι που χρησιμοποιούνται στον συστηματικό κατάλογο νοσημάτων

Ορισμένοι κοινά αποδεκτοί όροι του ICD-10-GM είναι σημαντικοί για την καταχώριση και ερμηνεία των κωδικοποιημένων δεδομένων. Οι κοινά αποδεκτοί όροι που παρουσιάζονται εδώ βασίζονται σε αντίστοιχα αποσπάσματα του εγχειριδίου οδηγιών του ICD-10 του ΠΟΥ (Τόμος II). Αποσπάσματα που είναι ταυτόσημα με το εγχειρίδιο του ΠΟΥ, επισημαίνονται με την ένδειξη «(ΠΟΥ)».

Περιλαμβάνονται (ΠΟΥ)

Στα «περιλαμβάνονται» [«περιλ.»] των κωδικών τριών και τεσσάρων χαρακτήρων περιέχονται συχνά μια σειρά από άλλες περιγραφές ή διαγνώσεις. Αυτές είναι παραδείγματα διαγνώσεων που μπορούν να καταχωριστούν συμπληρωματικά στον συγκεκριμένο κωδικό. Μπορεί να είναι συνώνυμα ή να αποτελούν διαφορετικές καταστάσεις που μπορούν να συμπεριληφθούν στον συγκεκριμένο κωδικό. Δεν αποτελούν υποδιαίρεση του κωδικού (βλέπε παράδειγμα 1, K31.0 *Οξεία διάταση στομάχου*).

Τα «περιλαμβάνονται» περιέχουν κυρίως υποδείξεις για το περιεχόμενο του κωδικού. Πολλά από αυτά αφορούν σημαντική ή συνήθη ορολογία σχετική με τον κωδικό. Άλλα περιγράφουν οριακές περιπτώσεις νοσημάτων ή εντοπίσεων και οριοθετούν το περιεχόμενο των μεμονωμένων υποκατηγοριών. Τα «περιλαμβάνονται» δεν περιγράφουν όλους τους εναλλακτικούς όρους μιας διάγνωσης. Οι εναλλακτικοί διαγνωστικοί όροι περιέχονται στο Αλφαβητικό Ευρετήριο. Κατά την κωδικοποίηση μιας διάγνωσης, πρέπει ο χρήστης να ανατρέχει πρώτα σε αυτό.

Παράδειγμα 1

- K31.– Άλλα νοσήματα του στομάχου και του δωδεκαδακτύλου**
Περιλαμβ.: λειτουργικές διαταραχές του στομάχου
Εξαιρ.: εκκόλπωμα του δωδεκαδακτύλου (K57.0-K57.1)
γαστρεντερική αιμορραγία (K92.0-K92.2)
- K31.0 Οξεία διάταση στομάχου**
Οξεία διαστολή στομάχου
- K31.1 Υπερτροφική πυλωρική στένωση των ενηλίκων**
Πυλωρική στένωση ΜΚΑ
Εξαιρ.: συγγενής ή βρεφική πυλωρική στένωση (Q40.0)

D013

Γενικές περιγραφές διαγνώσεων, που αφορούν αρκετούς κωδικούς ή όλες τις υποκατηγορίες ενός κωδικού τριών χαρακτήρων, παρατίθενται σε ένα κεφάλαιο, ομάδα ή τίτλο κατηγορίας, με την επισήμανση «περιλαμβ» (βλέπε παράδειγμα 1).

Εξαιρούνται (ΠΟΥ)

Σε ορισμένους κωδικούς παρατίθενται νοσολογικές οντότητες με την επισήμανση «εξαιρ.». Πρόκειται για όρους, οι οποίοι θα μπορούσαν θεωρητικά να ταξινομηθούν στον συγκεκριμένο κωδικό, στην πραγματικότητα όμως ταξινομούνται σε άλλο σημείο του συστηματικού καταλόγου ICD-10-GrM. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι ο κωδικός A46 *Ερυσίπελας [κυτταρίτιδα]*, από τον οποίο εξαιρούνται το ερυσίπελας μετά τον τοκετό και το επιλόχειο ερυσίπελας. Στις εξαιρέσεις παρατίθεται σε παρένθεση ο κωδικός της εκάστοτε κατηγορίας ή υποκατηγορίας, στην οποία ταξινομείται ο εξαιρούμενος όρος. Γενικές εξαιρέσεις, που αφορούν αρκετές κατηγορίες ή όλες τις υποκατηγορίες ενός κωδικού τριών χαρακτήρων παρατίθενται σε ένα κεφάλαιο, ομάδα ή τίτλο με την επισήμανση «εξαιρ.» (βλέπε παράδειγμα 1).

Παρενθέσεις «()»

1. Οι παρενθέσεις περιλαμβάνουν πρόσθετους όρους, οι οποίοι προσθέτουν στοιχεία σε μία διάγνωση, χωρίς όμως να επηρεάζουν την κωδικοποίηση. Για παράδειγμα, ο κωδικός I62.0 *Υποσκληρίδια αιμορραγία (μη τραυματική)*, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς την πληροφορία της παρένθεσης.

Παράδειγμα 2

Στα «περιλαμβάνονται» του κωδικού I12.– *Υπερτασική νεφροπάθεια* υπάρχει ο όρος «αρτηριοσκληρυντική νεφρίτιδα (χρόνια) (διάμεση)». Επομένως η «αρτηριοσκληρυντική νεφρίτιδα» καταχωρίζεται με τον κωδικό I12 είτε είναι «χρόνια» είτε είναι «διάμεση» (είτε και τα δύο).

2. Οι παρενθέσεις περιέχουν τους κωδικούς των νοσημάτων που εξαιρούνται.

Παράδειγμα 3

188.– *Μη ειδική λεμφαδενίτιδα*

Εξαιρ.: λεμφαδενική διόγκωση ΜΚΑ (R59.–)

3. Οι παρενθέσεις κατά την περιγραφή των ομάδων, περιλαμβάνουν τους κωδικούς τριών χαρακτήρων, που αντιστοιχούν σε αυτήν την ομάδα.
4. Τέλος, οι παρενθέσεις χρησιμοποιούνται στο σύστημα σταυρού-αστερίσκου. Περιέχουν τον κωδικό με σταυρό στις κατηγορίες κωδικών με αστερίσκο ή αντίστροφα τον κωδικό με αστερίσκο στις κατηγορίες κωδικών με σταυρό.

Παράδειγμα 4

- A32.1+** *Μηνιγγίτιδα και μηνιγγοεγκεφαλίτιδα από λιστέρια*
Λιστεριακή:
- *Μηνιγγίτιδα (G01*)*
 - *Μηνιγγοεγκεφαλίτιδα (G05.0*)*
- G01*** *Μηνιγγίτιδα σε μικροβιακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού*
Μηνιγγίτιδα από:
- *άνθρακα (A22.8+)*
 - *γονόκοκκο (A54.8+)*
 - *λεπτόσπειρα (A27.—+)*
 - *λιστέρια (A32.1+)*

Αγκύλες «[]»

Οι αγκύλες χρησιμοποιούνται για την περιγραφή συνώνυμων, εναλλακτικών διατυπώσεων ή διευκρινιστικών εκφράσεων, π.χ.:

Παράδειγμα 5

- A30.—** *Λέπρα [νόσος του Hansen]*
A50.4 *Όψιμη συγγενής νευροσύφιλη [νεανική νευροσύφιλη]*

Άνω-κάτω τελεία «:»

Στα «περιλαμβάνονται» και στις «εξαιρέσεις» χρησιμοποιείται η άνω-κάτω τελεία όταν ο όρος που προηγείται δεν επαρκεί για την καταχώρισή του στον αντίστοιχο κωδικό. Η χρήση ενός ή περισσότερων από τους όρους που παρατίθενται μετά την άνω-κάτω τελεία είναι απαραίτητη, για την καταχώρισή του σε αυτόν τον κωδικό.

Παράδειγμα 6

Η διάγνωση «σκωληκοειδίτιδα» ανήκει στον κωδικό K36 Άλλες μορφές σκωληκοειδίτιδας μόνο εφόσον χαρακτηρίζεται περαιτέρω ως «χρόνια» ή «υποτροπιάζουσα».

- K36** *Άλλες μορφές σκωληκοειδίτιδας*
σκωληκοειδίτιδα :
- *χρόνια*
 - *υποτροπιάζουσα*

Κάθετη γραμμή «|»

Στα «περιλαμβάνονται» και στις «εξαιρέσεις» χρησιμοποιείται η κάθετη γραμμή, όταν ούτε ο όρος που προηγείται ούτε ο όρος που έπεται επαρκεί για την καταχώρισή του στον αντίστοιχο κωδικό. Κάθε όρος πριν την κάθετη γραμμή πρέπει να συνδυαστεί με έναν ή περισσότερους όρους μετά την κάθετη γραμμή.

D013

Παράδειγμα 7**071.6 Μαιευτική βλάβη στις αρθρώσεις και τους συνδέσμους της πυέλου**

Ρήξη του χόνδρου της ηβικής σύμφυσης

Βλάβη στον κόκκυγα

Τραυματική διάσταση της ηβικής σύμφυσης

κατά τον τοκετό

Μη καθορισμένο αλλιώς «ΜΚΑ»

«ΜΚΑ» είναι μια συντομογραφία του όρου «μη καθορισμένο αλλιώς». Αυτός ο όρος είναι στην πραγματικότητα ισοδύναμος με τον όρο «χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό».

Ορισμένες φορές ταξινομείται ένας γενικός όρος μαζί με ειδικότερους όρους, μέσα στον ίδιο κωδικό. Αυτό οφείλεται στο ότι στην ιατρική ορολογία συχνά ο γενικός όρος χρησιμοποιείται για να περιγράψει την πιο συνηθισμένη μορφή ενός νοσήματος, και οι ειδικότερες μορφές απαντώνται λιγότερο συχνά. Για παράδειγμα, χρησιμοποιείται συχνά ο όρος «στένωση μιτροειδούς βαλβίδας» για την περιγραφή της «στένωσης μιτροειδούς βαλβίδας ρευματικής αιτιολογίας». Αντίθετα, η στένωση πνευμονικής βαλβίδας κωδικοποιείται ως ρευματικής αιτιολογίας, μόνο όταν περιγράφεται ως τέτοια, καθώς είναι συνήθως άλλης αιτιολογίας.

Παράδειγμα 8**105.- Ρευματικά νοσήματα της μιτροειδούς βαλβίδας**

Περιλαμβ.: καταστάσεις που μπορούν να ταξινομηθούν στις κατηγορίες 105.0 και 105.2-105.9, είτε καθορισμένες ως ρευματικής αιτιολογίας είτε μη καθορισμένες

Εξαιρ.: καθορισμένα ως μη ρευματικής αιτιολογίας (I34.-)

105.0 Στένωση μιτροειδούς βαλβίδας

Απόφραξη μιτροειδούς βαλβίδας (ρευματική)

105.1 Ρευματική ανεπάρκεια μιτροειδούς

Τέτοιες παραδοχές πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για την αποφυγή λανθασμένης κωδικοποίησης. Ένας επιμελής έλεγχος των «περιλαμβ.» θα αναδείξει με σαφήνεια τις περιπτώσεις νοσημάτων που υποκρύπτουν την αιτιολογία. Ένας όρος δεν πρέπει να κωδικοποιείται με τον όρο «χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό», εάν δεν διαπιστωθεί με ακρίβεια, ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμα περαιτέρω στοιχεία, που να επιτρέπουν πιο εξειδικευμένη καταχώριση σε άλλη θέση.

Για την ερμηνεία και ανάλυση των στατιστικών δεδομένων του ICD-10-GrM, θα πρέπει να δίδεται προσοχή στο γεγονός ότι υπάρχουν συχνά νοσήματα με τον χαρακτηρισμό «χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό», τα οποία προφανώς κωδικοποιήθηκαν έτσι, αλλά στα ιατρικά έγγραφα στα οποία βασίστηκε η κωδικοποίηση δεν υπήρχε σαφής περιγραφή. Για την ανάλυση των στατιστικών δεδομένων είναι, γι' αυτόν τον λόγο, σημαντικό να λαμβάνουμε υπόψη, ότι τέτοιες παραδοχές μπορούν να αλλάζουν κατά την αναθεώρηση του ICD από τη μία έκδοση στην άλλη.

Μη ταξινομημένος αλλού «ΜΤΑ»

Όταν χρησιμοποιούνται, σε μια κατηγορία τριών χαρακτήρων, οι λέξεις «μη ταξινομημένος αλλού» ή «που δεν ταξινομείται αλλού» ή η συντομογραφία «ΜΤΑ» χρησιμεύουν ως προειδοποίηση: Ορισμένες σαφώς προσδιορισμένες παραλλαγές των νοσημάτων θα πρέπει πιθανώς να καταχωριστούν σε άλλα σημεία του συστηματικού καταλόγου. Για παράδειγμα:

Παράδειγμα 9

J16.- Πνευμονία από άλλους λοιμογόνους μικροοργανισμούς, που δεν ταξινομείται αλλού

Εξαιρ.: ορνίθωση (A70)

πλασματοκυτταρική διάμεση πνευμονία (B59)

πνευμονία:

- *συγγενής (P23.-)*
- *ΜΚΑ (J18.9)*

J16.0 Πνευμονία από χλαμύδια

J16.8 Πνευμονία από άλλους καθορισμένους λοιμογόνους μικροοργανισμούς

Επίσης άλλοι κωδικοί, όπως στο κεφάλαιο I *Ορισμένα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα* (π.χ. B05.2 *Ιλαρά, επιπλεγμένη με πνευμονία*), κεφάλαιο X *Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος* (π.χ. J10–J15) ή σε άλλα κεφάλαια (π.χ. P23.- *Συγγενής πνευμονία*) χρησιμεύουν στην κωδικοποίηση πνευμονιών που προκαλούνται από άλλους σαφώς προσδιορισμένους παθογόνους μικροοργανισμούς. Ο κωδικός J18.- *Πνευμονία από μη καθορισμένους μικροοργανισμούς*, περιλαμβάνει τις πνευμονίες, για τις οποίες δεν προσδιορίζεται ο παθογόνος μικροοργανισμός.

Ο σύνδεσμος «και» στους κωδικούς

Ο σύνδεσμος «και» αντιστοιχεί στους συνδέσμους «ή/και». Για παράδειγμα, στον κωδικό A18.0+ *Φυματίωση των οστών και των αρθρώσεων*, καταχωρίζονται οι περιπτώσεις «φυματίωση των οστών», «φυματίωση των αρθρώσεων» και «φυματίωση των οστών και των αρθρώσεων».

Τελεία και παύλα «.-» ή παύλα «-» στο τέλος των κωδικών

Όλοι οι κωδικοί τριών χαρακτήρων, οι οποίοι υποδιαιρούνται σε κωδικούς τεσσάρων ή πέντε χαρακτήρων, επισημαίνονται στον 4^ο και 5^ο χαρακτήρα με μία τελεία και παύλα «.-». Όλοι οι κωδικοί τεσσάρων χαρακτήρων, οι οποίοι υποδιαιρούνται σε κωδικούς πέντε χαρακτήρων, επισημαίνονται στον 5^ο χαρακτήρα με μία παύλα «-» (βλέπε παράδειγμα 10).

Παράδειγμα 10

G90.- Διαταραχές του αυτόνομου νευρικού συστήματος

G90.0- Ιδιοπαθής περιφερική αυτόνομη νευροπάθεια

G90.00 Σύνδρομο καρτιδικού κόλπου (συγκοπή)

D014

G90.08	<i>Άλλη ιδιοπαθής περιφερική αυτόνομη νευροπάθεια</i>
G90.1	<i>Οικογενής δυσавтоνομία [Σύνδρομο Riley-Day]</i>

Με αυτόν τον τρόπο υποδεικνύεται ότι για αυτούς του κωδικούς 3 και 4 χαρακτήρων υπάρχει περαιτέρω υποδιαίρεση σε κωδικούς 4 και 5 χαρακτήρων, οι οποίοι πρέπει να χρησιμοποιηθούν κατά την κωδικοποίηση. Αυτό ισχύει για όλους τους καταλόγους του ICD-10-GrM.

D014 Κοινά αποδεκτοί όροι που χρησιμοποιούνται στο αλφαβητικό ευρετήριο

Το αλφαβητικό ευρετήριο του ICD-10-GrM υποβοηθά την κωδικοποίηση βάσει του συστηματικού καταλόγου, συμπεριλαμβανομένου του συστήματος σταυρού-αστερίσκου και των πρόσθετων κωδικών. Οι κοινά αποδεκτοί όροι που χρησιμοποιούνται στον αλφαβητικό κατάλογο περιγράφονται σε αυτόν. Για την κωδικοποίηση χρησιμοποιείται κυρίως ο συστηματικός κατάλογος. Εφόσον το αλφαβητικό ευρετήριο οδηγεί σε έναν μη ειδικό κωδικό, θα πρέπει να ελέγχεται στον συστηματικό κατάλογο εάν είναι δυνατή μία πιο ειδική κωδικοποίηση.

D015 Ιατρογενή νοσήματα και διαταραχές

Ιατρογενή νοσήματα και διαταραχές ως κύρια διάγνωση

Κωδικοί για την ειδική κωδικοποίηση ιατρογενών νοσημάτων ή/και διαταραχών ανευρίσκονται, για παράδειγμα, στις ακόλουθες κατηγορίες:

Πίνακας 1:

E89.–	<i>Ιατρογενείς ενδοκρινικές και μεταβολικές διαταραχές, που δεν ταξινομούνται αλλού</i>
G97.–	<i>Ιατρογενείς διαταραχές του νευρικού συστήματος που δεν ταξινομούνται αλλού</i>
H59.–	<i>Ιατρογενείς βλάβες του οφθαλμού και των εξαρτημάτων του, που δεν ταξινομούνται αλλού</i>
H95.–	<i>Μετεγχειρητικές παθήσεις του ωτός και της μαστοειδούς απόφυσης, που δεν ταξινομούνται αλλού</i>
I97.–	<i>Ιατρογενείς επιπλοκές από το κυκλοφορικό σύστημα που δεν ταξινομούνται αλλού</i>
J95.–	<i>Ιατρογενή νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος που δεν ταξινομούνται αλλού</i>
K91.–	<i>Ιατρογενείς διαταραχές του πεπτικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού</i>
M96.–	<i>Ιατρογενείς παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος που δεν ταξινομούνται αλλού</i>
N99.–	<i>Μετεπεμβατικές διαταραχές του ουρογεννητικού συστήματος, που δεν ταξινομούνται αλλού</i>

Αυτοί οι κωδικοί καταχωρίζονται ως κύρια διάγνωση, μόνο όταν δεν υπάρχει κανένας πιο ειδικός κωδικός αναφορικά με το νόσημα ή/και τη διαταραχή, ή όταν η κωδικοποίηση αυτού του ειδικού κωδικού αποκλείεται από μία «εξαίρεση» του ICD-10-GM. Το ίδιο ισχύει για τις κατηγορίες T80–T88 *Επιπλοκές από χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις, που δεν ταξινομούνται αλλού*. Οι κωδικοί του πίνακα 1 θα προτιμηθούν από τους κωδικούς T80–T88, καθώς οι τελευταίοι δεν μπορούν να περιγράψουν επακριβώς το νόσημα ή τη διαταραχή.

Παράδειγμα 1

Ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο λόγω υποθυρεοειδισμού μετά από θυρεοειδεκτομή.

Κύρια διάγνωση: E89.0 *Ιατρογενής υποθυρεοειδισμός*

Παράδειγμα 2

Ασθενής που φέρει βηματοδότη εισάγεται στο νοσοκομείο λόγω μετατόπισης των ηλεκτροδίων.

Κύρια διάγνωση: T82.1 *Μηχανική επιπλοκή καρδιακής ηλεκτρονικής συσκευής*

Σημείωση: Ο κωδικός I97.8 *Άλλες ιατρογενείς επιπλοκές από το κυκλοφορικό σύστημα που δεν ταξινομούνται αλλού* δεν καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση, καθώς ο κωδικός T82.1 *Μηχανική επιπλοκή καρδιακής ηλεκτρονικής συσκευής* (μαζί με τα «περιλαμβ») περιγράφει πιο ειδικά το είδος της διαταραχής.

Παράδειγμα 3

Ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο λόγω εν τω βάθει φλεβοθρόμβωσης μετά από προηγούμενη αντιμετώπιση ενός κατάγματος της πτέρνας.

Κύρια διάγνωση: I80.28 *Θρόμβωση, φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εν τω βάθει φλεβών κάτω άκρων*

Σημείωση: Ο κωδικός I97.8 *Άλλες ιατρογενείς επιπλοκές από το κυκλοφορικό σύστημα που δεν ταξινομούνται αλλού* δεν κωδικοποιείται ως κύρια διάγνωση, καθώς ο κωδικός I80.28 *Θρόμβωση, φλεβίτιδα και θρομβοφλεβίτιδα άλλων εν τω βάθει φλεβών κάτω άκρων* περιγράφει πιο ειδικά το είδος της αγγειακής επιπλοκής.

Ιατρογενή νοσήματα και διαταραχές ως δευτερεύουσα διάγνωση

Αυτοί οι κανόνες ισχύουν αναλογικά και για την κωδικοποίηση της δευτερεύουσας διάγνωσης. Θα πρέπει επίσης να λαμβάνονται υπόψη τα κριτήρια ορισμού της δευτερεύουσας διάγνωσης (βλέπε ΕΚΟΚ D003 *Δευτερεύουσες διαγνώσεις* (σελίδα 10)).

D015

ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες αναφέρονται στην **Ελληνική Ταξινόμηση Ιατρικών Πράξεων ΕΤΙΠ**.

P001 Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης ιατρικών πράξεων

Όλες οι σημαντικές ιατρικές πράξεις, που διενεργούνται από τη στιγμή της εισαγωγής του ασθενούς στο νοσοκομείο μέχρι το εξιτηριό του και οι οποίες περιέχονται στην ΕΤΙΠ, πρέπει να κωδικοποιούνται. Σε αυτές περιλαμβάνονται διαγνωστικές, θεραπευτικές και νοσηλευτικές πράξεις.

Ως σημαντική ιατρική πράξη ορίζεται εκείνη που:

- είτε είναι χειρουργικής φύσεως
- είτε ενέχει επεμβατικό κίνδυνο
- είτε ενέχει αναισθησιολογικό κίνδυνο
- είτε απαιτεί εξειδικευμένα κέντρα, μηχανήματα ή κατάρτιση προσωπικού

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, να καταχωρίζονται όλες οι σημαντικές ιατρικές πράξεις που δύνανται να κωδικοποιηθούν, ακόμη και αν ορισμένες από αυτές θεωρούνται λανθασμένα ως «μη επεμβατικές».

Δεν υπάρχουν κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης για τη σειρά καταχώρισης των ιατρικών πράξεων. Πρέπει, ωστόσο, να κωδικοποιούνται αρχικά οι πιο δαπανηρές ιατρικές πράξεις, καθώς υπάρχει περιορισμένος αριθμός διαθέσιμων πεδίων κωδικοποίησης.

Η σειρά καταχώρισης των ιατρικών πράξεων δεν επηρεάζει το αποτέλεσμα στο σύστημα αποζημίωσης DRG.

Επιμέρους στάδια των ιατρικών πράξεων

Κανονικά, μια ιατρική πράξη περιλαμβάνεται ολόκληρη, με όλους τους χρόνους και τα επιμέρους στάδια της σε έναν κωδικό, όπως π.χ. προετοιμασία, τοποθέτηση του ασθενούς, αναισθησία, χειρουργική προσπέλαση, συρραφή κ.ο.κ. (βλέπε παραδείγματα 1 και 2). Αποκλίσεις από αυτόν τον κανόνα περιγράφονται στις σημειώσεις των κωδικών. Στις νευροχειρουργικές επεμβάσεις, για παράδειγμα, συνήθως κωδικοποιείται η χειρουργική προσπέλαση χωριστά.

Γ' αυτόν τον λόγο, τα επιμέρους στάδια μιας ήδη κωδικοποιημένης ιατρικής πράξης δεν πρέπει να καταχωρίζονται διπλά.

Κατ' αντιστοιχία οι διαγνωστικές πράξεις που σχετίζονται με την εκάστοτε επέμβαση, γίνονται στον ίδιο χρόνο και αποτελούν σύνθετες τμήμα της επεμβατικής-θεραπευτικής

P001

διαδικασίας, δεν πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά, εφόσον δεν περιγράφεται κάτι διαφορετικό στην ΕΤΙΠ (π.χ. η διαγνωστική αρθροσκόπηση πριν από την αρθροσκοπική επέμβαση μηνίσκου δεν κωδικοποιείται χωριστά).

Επίσης, άλλες διαδικασίες, όπως π.χ. θεραπεία πόνου (εξαιρουμένου του κωδικού ΕΤΙΠ 591.09 *Σύνθετη περίθαλψη οξέος πόνου*), πρέπει να κωδικοποιούνται μόνο όταν πραγματοποιούνται ως ανεξάρτητες ιατρικές πράξεις (βλέπε παράδειγμα 3).

Παράδειγμα 1

Η λαπαροτομία ως χειρουργική προσπέλαση περιλαμβάνεται στον κωδικό:

351.01.00.02 *Χολοκυστεκτομή: Απλή, ανοικτά χειρουργικά: Με χειρουργική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων*

Η επισιοτομή ως μέρος μιας ιατρικής πράξης περιλαμβάνεται στον κωδικό:

372.00.01 *Τοκετός με εμβρυουλκία: Εμβρυουλκία μεσότητας πυέλου*

Παράδειγμα 2

Η χορήγηση αναλγησίας στο πλαίσιο επεμβατικών και διαγνωστικών πράξεων περιλαμβάνεται στους κωδικούς των πράξεων (με εξαίρεση τον κωδικό ΕΤΙΠ 591.09 *Σύνθετη περίθαλψη οξέος πόνου*), ενώ η θεραπεία πόνου ως ανεξάρτητη ιατρική πράξη κωδικοποιείται με έναν κωδικό ΕΤΙΠ της κατηγορίας 591.

Η προ- και μετεγχειρητική αναλγησία σε μία ανοικτή χειρουργική ριζική υστερεκτομή, με λεμφαδενεκτομή των πυελικών και παραορτικών λεμφαδένων, περιλαμβάνεται στον κωδικό της επέμβασης.

368.05.03 *Ριζική υστερεκτομή: Με παραορτική και πυελική λεμφαδενεκτομή*

Παράδειγμα 3

Η επισκληρίδιος αναλγησία, ως ανεξάρτητη θεραπευτική πράξη (χωρίς άμεση συσχέτιση με άλλη επεμβατική πράξη, για παράδειγμα κατά τη διάρκεια νοσηλείας ασθενούς για χημειοθεραπεία σε μεταστατικό καρκίνωμα, πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

554.03 *Μετρίως σύνθετος και εντατικός κύκλος χημειοθεραπείας*

591.00 *Επισκληρίδια παρακέντηση και έγχυση για αντιμετώπιση πόνου*

Ανεξάρτητες ιατρικές πράξεις, που δεν συσχετίζονται άμεσα με άλλες επεμβατικές πράξεις, πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.

Παράδειγμα 4

Η διενέργεια προεγχειρητικής αξονικής τομογραφίας (CT) κοιλίας με σκιαγραφικό και η διενέργεια αριστερής ημικολεκτομής, πρέπει να κωδικοποιούνται ανεξάρτητα.

222.05	<i>Αξονική τομογραφία κοιλίας με έγχυση σκιαγραφικού</i>
345.05.06.04	<i>Μερική εκτομή του παχέος εντέρου [μερική κολεκτομή]: Εκτομή του κατιόντος κόλου μετά της αριστερής κολικής καμπής (αριστερή ημικολεκτομή): Ανοικτά χειρουργικά με αναστομώσεις-παρά φύσιν έδρα</i>

P003 Σημειώσεις και κοινά αποδεκτοί όροι για τη χρήση της ETIP

Αυτό το τμήμα των κατευθυντήριων οδηγιών είναι σε μεγάλο βαθμό ίδιο με τις σημειώσεις για τη χρήση της ETIP και εμπλουτίζεται με παραδείγματα.

Δομή της ETIP

Η Ελληνική Ταξινόμηση Ιατρικών Πράξεων είναι ένας ιεραρχικά δομημένος κατάλογος. Εμφανίζει βαθμό διαφοροποίησης 5 υποδιαίρεσεων και βασίζεται στη Διεθνή Ταξινόμηση Ιατρικών Πράξεων του ΠΟΥ (International Classification of Procedures in Medicine, ICPM). Ορισμένοι κωδικοί παρ' όλα αυτά διαφοροποιούνται μόνο μέχρι την 4^η υποδιαίρεση.

Υπάρχουν τα ακόλουθα επίπεδα ιεράρχησης:

- Κεφάλαιο
- Υποκεφάλαιο
- 3^η υποδιαίρεση
- 4^η υποδιαίρεση
- 5^η υποδιαίρεση
- 6^η υποδιαίρεση

Τα τρία πρώτα επίπεδα ιεράρχησης (κεφάλαιο, υποκεφάλαιο, 3^η υποδιαίρεση) αποτελούνται από μονοψήφιους αριθμούς και παρατίθενται στην αρχή κάθε κωδικού ETIP, χωρίς μεταξύ τους διαχωρισμό με σημείο στίξης. Ακολουθεί κατά σειρά η 4^η, η 5^η και η 6^η υποδιαίρεση (οι δύο τελευταίες προαιρετικά), οι οποίες αποτελούνται η κάθε μία από διψήφιο αριθμό και διαχωρίζονται μεταξύ τους με μία τελεία.

Ο αριθμός «98», όταν εμφανίζεται στην 4^η, 5^η ή 6^η υποδιαίρεση, αντιστοιχεί στις «άλλες» ιατρικές πράξεις και ο αριθμός «99» στις ιατρικές πράξεις «χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό». Οι κωδικοί τεσσάρων υποδιαίρεσεων με το «98» («άλλες...») στην 4^η υποδιαίρεση αποτελούν επιπλέον κωδικούς που έχουν προβλεφθεί για πιθανές μελλοντικές επεκτάσεις του καταλόγου και ιατρικές πράξεις που δεν κωδικοποιούνται μέχρι σήμερα.

Το κείμενο της 5^{ης} και 6^{ης} υποδιαίρεσης είναι συχνά συντετμημένο στις έντυπες εκδόσεις, για λόγους συντομίας. Περιλαμβάνει μόνο τις ουσιαστικές διαφορές σε σχέση με το κείμενο της αμέσως προηγούμενης υποδιαίρεσης. Στην ηλεκτρονική

P003

έκδοση ανευρίσκονται όλες οι υποδιαίρεσεις, πλήρως διατυπωμένες, σε όλα τα επίπεδα ιεράρχησης.

Έντυπη έκδοση:

- 344** **Εκτεταμένη γαστρεκτομή και άλλες επεμβάσεις στο στομάχι**
Περιλαμβ.: Εσωτερική ναρθηκοποίηση
- ...
- 344.08** **Άλλη αποκατάσταση του στομάχου**
Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:
- 00 Ανοικτά χειρουργικά διακοιλιακά
 - 01 Ανοικτά χειρουργικά διαθωρακικά
 - 02 Λαπαροσκοπικά
 - 03 Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
 - 98 Άλλο
- ** 344.08.00 Συρραφή (μετά από τραυματισμό)
- ** 344.08.01 Σύγκλιση γαστροστομίας (σίτισης)
- ** 344.08.02 Γαστροπηξία
- ** 344.08.03 Σφιγκτηροπλαστική (π.χ. κατά Belsey)
- ** 344.08.04 Θολοπλαστική
- ** 344.08.05 Ημιθολοπλαστική
- ** 344.08.06 Ημιθολοπλαστική με συρραφή οισοφαγικού τρήματος
- ** 344.08.10 Κάθετη γαστροπλαστική κατά Mason
- ** 344.08.11 Εμφύτευση ή αντικατάσταση μη ρυθμιζόμενου γαστρικού δακτυλίου
- ** 344.08.12 Εμφύτευση ή αντικατάσταση ρυθμιζόμενου γαστρικού δακτυλίου
- ** 344.08.13 Επαναστερέωση γαστρικού δακτυλίου που έχει μετακινηθεί
- ** 344.08.14 Αφαίρεση γαστρικού δακτυλίου
- ** 344.08.98 Άλλη
- 344.08.99 Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Ηλεκτρονική έκδοση:

Κείμενα που προστίθενται, διακρίνονται με έντονη γραφή.

- 344** **Εκτεταμένη γαστρεκτομή και άλλες επεμβάσεις στο στομάχι**
- ...
- 344.08 **Εκτεταμένη γαστρεκτομή και άλλες επεμβάσεις στο στομάχι: Άλλη αποκατάσταση του στομάχου**
- 344.08.00 **Εκτεταμένη γαστρεκτομή και άλλες επεμβάσεις στο στομάχι: Άλλη αποκατάσταση του στομάχου: Συρραφή (μετά από τραυματισμό)**
- 344.08.00.00 **Εκτεταμένη γαστρεκτομή και άλλες επεμβάσεις στο στομάχι: Άλλη αποκατάσταση του στομάχου: Συρραφή (μετά από τραυματισμό): Ανοικτά χειρουργικά διακοιλιακά**

P003

344.08.00.01	Εκτεταμένη γαστρεκτομή και άλλες επεμβάσεις στο στομάχι: Άλλη αποκατάσταση του στομάχου: Συρραφή (μετά από τραυματισμό): Ανοικτά χειρουργικά διαθωρακικά
344.08.00.02	Εκτεταμένη γαστρεκτομή και άλλες επεμβάσεις στο στομάχι: Άλλη αποκατάσταση του στομάχου: Συρραφή (μετά από τραυματισμό): Λαπαροσκοπικά
344.08.00.03	Εκτεταμένη γαστρεκτομή και άλλες επεμβάσεις στο στομάχι: Άλλη αποκατάσταση του στομάχου: Συρραφή (μετά από τραυματισμό): Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά
344.08.00.98	Εκτεταμένη γαστρεκτομή και άλλες επεμβάσεις στο στομάχι: Άλλη αποκατάσταση του στομάχου: Συρραφή (μετά από τραυματισμό): Άλλη
344.08.01	Εκτεταμένη γαστρεκτομή και άλλες επεμβάσεις στο στομάχι: Άλλη αποκατάσταση του στομάχου: Σύγκλιση γαστροστομίας (σίτισης)
344.08.01.00	Εκτεταμένη γαστρεκτομή και άλλες επεμβάσεις στο στομάχι: Άλλη αποκατάσταση του στομάχου: Σύγκλιση γαστροστομίας (σίτισης): Ανοικτά χειρουργικά διακοιλιακά
...	
344.08.98	Εκτεταμένη γαστρεκτομή και άλλες επεμβάσεις στο στομάχι: Άλλη αποκατάσταση του στομάχου: Άλλη
344.08.98.00	Εκτεταμένη γαστρεκτομή και άλλες επεμβάσεις στο στομάχι: Άλλη αποκατάσταση του στομάχου: Άλλη: Ανοικτά χειρουργικά διακοιλιακά
...	
344.08.99	Εκτεταμένη γαστρεκτομή και άλλες επεμβάσεις στο στομάχι: Άλλη αποκατάσταση του στομάχου: Χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Σειρά καταχώρισης των κωδικών και μη κατελιημμένοι κωδικοί

Στον υπάρχοντα κατάλογο κωδικοποίησης ιατρικών πράξεων, δεν καταλαμβάνονται όλες οι θέσεις των κωδικών τεσσάρων υποδιαίρέσεων. Μια σύμπτυξη των κωδικών αποφεύχθηκε, για λόγους αντιστοιχίας με την ταξινόμηση ICPM του ΠΟΥ. Οι μη κατελιημμένοι κωδικοί διατίθενται για πιθανές προσθήκες που θα χρειασθούν στο μέλλον.

Κατανομή με βάση την ανατομική περιοχή

Ο κατάλογος ταξινόμησης ιατρικών πράξεων παρουσιάζει μια διαρθρωτική δομή με βάση την ανατομική περιοχή. Αποφεύχθηκε η διαμόρφωση της ταξινόμησης με βάση τις ιατρικές ειδικότητες. Αυτό σημαίνει ότι ιατρικές πράξεις που διενεργούνται στην ίδια ανατομική περιοχή, από διαφορετικές ιατρικές ειδικότητες, καταχωρίζονται στο ίδιο κεφάλαιο. Έτσι, για παράδειγμα, οι παιδοχειρουργικές επεμβάσεις καταχωρίζονται στο κεφάλαιο της ανατομικής περιοχής, στην οποία διενεργήθηκε η επέμβαση. Δεν υπάρχει καμία διαβάθμιση με βάση την ηλικία, με εξαίρεση ορισμένους κωδικούς του κεφαλαίου 5 (νεογνά).

Σε αντίθεση με το κεφάλαιο 3 «Χειρουργικές πράξεις», η εσωτερική δομή των κεφαλαίων 1, 2, 5 και 6 του καταλόγου ταξινόμησης ιατρικών πράξεων βασίζεται στην εκάστοτε ιατρική πράξη.

P003

Συγκέντρωση όλων των πληροφοριών σε έναν κωδικό

Βασική αρχή της ΕΤΙΠ είναι η κωδικοποίηση μιας διενεργούμενης ιατρικής πράξης κατά το δυνατόν με έναν κωδικό (μονήρης κωδικοποίηση). Αυτό σημαίνει ότι κάθε ένας κωδικός κανονικά περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες μιας ιατρικής πράξης, με όλα τα επιμέρους στάδια αυτής, όπως π.χ. προετοιμασία, τοποθέτηση του ασθενή, αναισθησία, προσπέλαση, χειρουργική επέμβαση, συρραφή κ.ο.κ (βλέπε την παράγραφο «Επιμέρους στάδια των ιατρικών πράξεων» στην ΕΚΟΚ Ρ001 *Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης ιατρικών πράξεων* (σελίδα 39)).

Παράδειγμα 1

335.01.01.02 *Αντικατάσταση καρδιακής βαλβίδας με προσθετική: Μιτροειδής βαλβίδα, ανοικτά χειρουργικά: Με ξενομόσχευμα (βιοπρόθεση)*

Αυτός ο κωδικός περιλαμβάνει την προεγχειρητική προετοιμασία, αναισθησία, τοποθέτηση του ασθενούς, προσπέλαση, χειρουργική επέμβαση, τοποθέτηση προσθετικής βαλβίδας,..., συρραφή δέρματος, καθώς και τη συνήθη μετεγχειρητική φροντίδα του ασθενή, πιθανώς με συνέχιση μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής, διάρκειας μέχρι και 24 ωρών. Επιπλέον υπάρχει μια σημείωση στον κωδικό 335.01, ότι η χρήση καρδιοπνευμονικής παράκαμψης περιλαμβάνεται στον κωδικό. Αυτό δεν ισχύει για τη χρήση καρδιοπνευμονικής παράκαμψης με βαθιά ή πολύ βαθιά συστηματική υποθερμία και δεν ισχύει για τη χρήση παράκαμψης με ενδοαορτικό μπαλόνι (βλέπε ΕΚΟΚ 0908 *Πρόσθετες ιατρικές πράξεις που σχετίζονται με καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις* (σελίδα 115)).

Συνδυαστικοί κωδικοί

Υπάρχουν επίσης κωδικοί για συνδυαστικές επεμβάσεις, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους σταδίων τους, όταν διενεργούνται πολλές επιμέρους επεμβάσεις σε έναν χρόνο. Αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν περιγράφουν πλήρως τη συνδυαστική επέμβαση και δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό στις κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης ή στις σημειώσεις.

Παράδειγμα 2

306.03.02 *Θυρεοειδεκτομή: Με παραθυρεοειδεκτομή*

Πολλαπλή κωδικοποίηση

Σε ορισμένους τομείς προβλέπεται η κωδικοποίηση επεμβάσεων με πολλαπλούς κωδικούς. Αυτό είναι κυρίως απαραίτητο για την κωδικοποίηση σύνθετων επεμβάσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, διατυπώνονται σημειώσεις στην ΕΤΙΠ, που παραπέμπουν στην ξεχωριστή κωδικοποίηση των επιμέρους επεμβάσεων που διενεργήθηκαν.

Παράδειγμα 3

382.00 *Εμφύτευση ενδοπρόθεσης στην άρθρωση του ισχίου*

Σημ: Η διενέργεια πλαστικής της οροφής της κοτύλης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.01).

Η διενέργεια πλαστικής του εδάφους της κοτύλης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.17).

Η διενέργεια πλαστικής σπογγώδους οστού πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.04).

Η πρόσθετη χρήση υλικών οστεοσύνθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (378.06) .

Η χρήση κοτύλης με μηχανικά σημεία στήριξης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.00.07) .

Η σύνθετη αρχική εμφύτευση μιας ενδοπρόθεσης, για παράδειγμα, αντικατάστασης μηριαίου οστού ή αντικατάσταση των γειτονικών αρθρώσεων πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.10).

Η χρήση μιας ενδοπρόθεσης όγκου πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.12).

Η χρήση υποαλλεργικής πρόθεσης πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.14).

Δαπανηροί γύψινοι επίδεσμοι πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά (531.00).

Η εμφύτευση ενδοπρόθεσης μετά από προηγούμενη αφαίρεση πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (382.09.21).

Ο προσδιορισμός της χρήσης τσιμέντου πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

00 Χωρίς τσιμέντο

01 Με τσιμέντο

02 Υβρίδιο (εν μέρει με τσιμέντο)

** 382.00.00 *Ολική ενδοπρόθεση*

** 382.00.02 *Ολική ενδοπρόθεση, εξατομικευμένη πρόθεση*

Περλ.: Μακρύ άξονα, πρόθεσης όγκου, CAD CAM πρόθεση

P003

Παράδειγμα 4

Αν ληφθούν υπόψη οι σημειώσεις της κατηγορίας κωδικών 382.00, προκύπτουν, π.χ. για την καταχώριση της διενέργειας ολικής αρθροπλαστικής ισχίου με χρήση αυτόλογου μοσχεύματος σπογγώδους οστού, οι ακόλουθοι κωδικοί:

382.00.00.00 *Ολική ενδοπρόθεση: Χωρίς τσιμέντο*

378.04.00.13 *Μεταμόσχευση σπογγώδους οστού, αυτογενής: Πύελος*

378.03.00 *Λήψη οστικού υλικού για μεταμόσχευση: Σπογγώδης ουσία, ένα σημείο λήψης*

Περιορισμένη ισχύς κωδικών

Ορισμένοι κωδικοί των κεφαλαίων 1 και 5 του καταλόγου ταξινόμησης ιατρικών πράξεων παρουσιάζουν για συγκεκριμένη ομάδα ασθενών (π.χ. ηλικιακή ομάδα), ένα ειδικό κριτήριο διαφοροποίησης για ταξινόμηση σε διαφορετικές ομάδες DRG. Η περιορισμένη ισχύς των κωδικών επισημαίνεται σε ειδική σημείωση. Η ευρεία χρήση αυτών των κωδικών για όλους τους ασθενείς θα είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική υπέρ-καταγραφή των δεδομένων, η οποία δεν θα ήταν σκόπιμη.

Αντιμέτωπιση διεγχειρητικών επιπλοκών

Η αντιμετώπιση διεγχειρητικών επιπλοκών πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

Πρόσθετες πληροφορίες για χειρουργικές επεμβάσεις

Ο κατάλογος ταξινόμησης ιατρικών πράξεων προβλέπει την πρόσθετη κωδικοποίηση συγκεκριμένων συμπληρωματικών στοιχείων μιας επέμβασης. Για αυτά τα συμπληρωματικά στοιχεία είναι διαθέσιμο ειδικό τμήμα στο τέλος του κεφαλαίου 3 (βλέπε 393...399 *Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις χειρουργικές επεμβάσεις*).

Οι πρόσθετοι αυτοί κωδικοί χρησιμοποιούνται συμπληρωματικά, εφόσον οι πληροφορίες δεν περιλαμβάνονται ήδη στον ίδιο τον κωδικό. Οι πρόσθετοι κωδικοί δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνοι τους, αλλά μόνο σε συνδυασμό με τη διενεργηθείσα βασική επέμβαση.

«Περιλαμβάνονται», «εξαιρούνται» και «σημειώσεις»

Για τη σωστή χρήση του καταλόγου ταξινόμησης ιατρικών πράξεων, έχουν διατυπωθεί «περιλαμβάνονται», «εξαιρούνται» και «σημειώσεις». Αυτά ανευρίσκονται στα ανώτερα δυνατά επίπεδα ιεραρχίας των κωδικών.

Γι' αυτόν τον σκοπό χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι όροι και συντμήσεις:

Περιλαμβάνονται («περιλαμβ.»)

Τα «περιλαμβάνονται» χρησιμεύουν στον ακριβέστερο προσδιορισμό του περιεχομένου του κωδικού ή δίνουν παραδείγματα για την καταχώριση του συγκεκριμένου κωδικού.

Εξαιρούνται («εξαιρ.»)

Τα «εξαιρούνται» παραπέμπουν σε ιατρικές πράξεις, οι οποίες πρέπει να κωδικοποιούνται με άλλον κωδικό. Γι' αυτές τις πράξεις, πρέπει να καταχωρίζεται ο κατάλληλος κωδικός. Σε περίπτωση που η «εξαιρεία» δεν υποδεικνύει τον αριθμό άλλου κωδικού, τότε η ιατρική πράξη που περιγράφει, δεν περιλαμβάνεται καθόλου στην ΕΤΙΠ.

Παράδειγμα 5

358.00	<i>Ανοικτή χειρουργική ουρηθροτομή και ουρηθροστομία</i> <i>Περιλ.: Αφαίρεση λίθου</i> <i>Αφαίρεση ξένου σώματος</i> <i>Εξαιρ.: Διουρηθρική αφαίρεση λίθου ή ξένου σώματος (510.00.11)</i>
358.00.00	<i>Ουρηθροτομή</i>
358.00.01	<i>Ουρηθροστομία</i>

Σημειώσεις («σημ.»)

Οι «σημειώσεις» έχουν την ακόλουθη λειτουργία:

- επισήμανση για χωριστή κωδικοποίηση των επιμέρους στοιχείων μιας σύνθετης επέμβασης (βλέπε επίσης την παράγραφο «Πολλαπλή κωδικοποίηση», παράδειγμα 3 (σελίδα 23))
- επισήμανση για πρόσθετη κωδικοποίηση των συμπληρωματικών στοιχείων μιας επέμβασης
- επισήμανση για ειδική κωδικοποίηση της χειρουργικής προσπέλασης
- επισημάνσεις για το πότε ο συγκεκριμένος κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Πίνακες (υποδιαίρεση)

Στον κατάλογο ταξινόμησης ιατρικών πράξεων έχουν προστεθεί πίνακες, οι οποίοι συνοψίζουν, για λόγους συντομίας, τις 6^{ες} υποδιαίρεσεις, που είναι κοινές για κάποιους κωδικούς. Αυτοί οι πίνακες χρησιμοποιούνται π.χ. για την περιγραφή των ακόλουθων τομέων:

- της ανατομικής θέσης των αιμοφόρων αγγείων
- των οστών και αρθρώσεων
- της προσπέλασης, ιατρικής πράξης ή της πλευράς στην οποία διενεργείται η ιατρική πράξη (δεξιά ή αριστερά).

Η ισχύς και η δυνατότητα χρήσης ενός πίνακα για ένα συγκεκριμένο κωδικό επισημαίνεται κάθε φορά με μία σημείωση. Οι πίνακες ισχύουν κατά κανόνα μόνο για τους συγκεκριμένους κωδικούς που επισημαίνονται στον κατάλογο ταξινόμησης, αλλά όχι για την κατηγορία 99 «χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό».

P003

Συντομογραφίες

Στην ΕΤΙΠ χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες συντομογραφίες:

Εξαιρ.	Εξαιρούνται
Περιλ.	Περιλαμβάνονται
Σημ.	Σημειώσεις
ΜΚΑ	Μη καθορισμένο αλλιώς ή χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό

Οι συντομογραφίες που αφορούν το περιεχόμενο των κωδικών, όπως π.χ. η συντομογραφία ΗΚΓ= ηλεκτροκαρδιογράφημα, περιλαμβάνονται στον πίνακα συντομογραφιών της ΕΤΙΠ.

Όροι και σύμβολα

Χρήση του συνδέσμου «και»

Ο σύνδεσμος «και» σε έναν κωδικό τριών και τεσσάρων υποδιαϊρέσεων, χρησιμοποιείται τόσο με την έννοια του συζευκτικού «και» όσο και με την έννοια του διαζευκτικού «ή» (π.χ. κατά την απαρίθμηση διαδικασιών όπως «τομή, εκτομή και καταστροφή...» ή κατά την απαρίθμηση εντοπίσεων όπως «...συρραφή ενός νεύρου και νευρικού πλέγματος».) Σε έναν κωδικό πέντε υποδιαϊρέσεων χρησιμοποιείται το «και» με την έννοια «τόσο/όσο», και το «ή» με την έννοια «είτε/είτε».

Σύμβολα που χρησιμοποιούνται

- ** Οι κωδικοί με διπλό αστερίσκο (**) στο άκρο τους είναι κωδικοί 5 υποδιαϊρέσεων, οι οποίοι πρέπει να συνδυάζονται με μια από τις 6^{ες} υποδιαϊρέσεις ενός πίνακα.
- () Οι παρενθέσεις περιλαμβάνουν συμπληρωματικές περιγραφές ή διευκρινίσεις μιας ιατρικής πράξης. Αυτές οι πληροφορίες δεν αλλάζουν το νόημα της κωδικοποίησης
- [] Οι αγκύλες περιλαμβάνουν συνώνυμα και εναλλακτικές περιγραφές μιας ιατρικής πράξης.

Ορολογία που χρησιμοποιείται

Η επιστημονική ονοματολογία της ΕΤΙΠ βασίζεται στο ICD-10-GrM. Κατ' αναλογία, τα στοιχεία μιας ιατρικής πράξης, καθώς και οι ανατομικοί όροι, αποδίδονται στην ελληνική γλώσσα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για την απόδοση σύνθετων ιατρικών όρων χρησιμοποιούνται και αγγλικοί ή λατινικοί όροι. Έγινε προσπάθεια οι απλοί ιατρικοί όροι να αποδοθούν με την ελληνική ορολογία και να αποφευχθούν, κατά το δυνατόν, μικτοί ελληνικοί και αγγλικοί ή λατινικοί όροι. Σε γενικές γραμμές αποδίδονται οι ιατρικές έννοιες με τον τρόπο που είναι καταγεγραμμένες στα ελληνικά ιατρικά συγγράμματα.

P004 Μη ολοκληρωμένη ή ημιτελής ιατρική πράξη

Όταν διακόπτεται ή δεν ολοκληρώνεται μια ιατρική πράξη, για οποιονδήποτε λόγο, γίνεται η ακόλουθη καταχώριση:

1. Όταν μια επέμβαση αλλάζει από «λαπαροσκοπικά/ενδοσκοπικά» σε «ανοικτά χειρουργικά», τότε πρέπει να εξετάζεται, εάν υπάρχει ειδικός κωδικός για την αλλαγή αυτή στην ΕΤΙΠ
 - α. Εάν υπάρχει ειδικός κωδικός για την «αλλαγή σε ανοικτά χειρουργικά», τότε πρέπει να χρησιμοποιείται αυτός ο κωδικός (βλέπε παράδειγμα 1).
 - β. Εάν δεν υπάρχει ειδικός κωδικός για την αλλαγή αυτή, τότε πρέπει να καταχωρίζεται μόνο ο κωδικός για την ανοικτή χειρουργική επέμβαση (βλέπε παράδειγμα 2).
2. Εάν υπάρχει ειδικός κωδικός για μια μη επιτυχή ιατρική πράξη (βλέπε παράδειγμα 3), τότε πρέπει να χρησιμοποιείται αυτός ο κωδικός. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν επιτρέπεται να καταχωρίζεται ο πρόσθετος κωδικός 399.05 *Πρώωρη διακοπή χειρουργικής επέμβασης (διαδικασία που δεν έχει ολοκληρωθεί)*.
3. Σε περίπτωση που το μέρος της ιατρικής πράξης που διενεργήθηκε πριν τη διακοπή της, έχει αντίστοιχο κωδικό στην ΕΤΙΠ, τότε πρέπει να κωδικοποιείται μόνο αυτό (βλέπε παραδείγματα 4 και 5).
4. Όταν μια ιατρική πράξη πραγματοποιείται σχεδόν ολόκληρη, τότε πρέπει να καταχωρίζεται χωρίς τον πρόσθετο κωδικό 399.05.
5. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις, πρέπει να κωδικοποιείται η προγραμματισμένη, αλλά μη ολοκληρωμένη ιατρική πράξη. Ειδικά σε χειρουργικές επεμβάσεις πρέπει να καταχωρίζεται και ο πρόσθετος κωδικός ΕΤΙΠ 399.05.

Παράδειγμα 1

Μια υστερεκτομή που ξεκινάει λαπαροσκοπικά, συνεχίζεται ως ανοικτή υστερεκτομή, (ανοικτά χειρουργικά) διακοιλιακά. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να κωδικοποιηθεί η επέμβαση ως εξής:

368.03.00.04 *Υστερεκτομή: Χωρίς σαλπινγγοωθηκτομή: Μετατροπή από ενδοσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά*

Παράδειγμα 2

Απόπειρα ενδοσκοπικής διάνοιξης καρπιαίου σωλήνα μετατρέπεται σε ανοικτή χειρουργική επέμβαση. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να κωδικοποιηθεί η επέμβαση ως εξής:

305.06.04.00 *Νευρόλυση και αποσυμπίεση νεύρων: Νεύρα της άκρας χείρας: Ανοικτά χειρουργικά*

P005

Παράδειγμα 3

Για ορισμένες ιατρικές πράξεις που αποτυγχάνουν, υπάρχουν ειδικοί κωδικοί.

373.03	<i>Αποτυχημένος κοιλιακός επεμβατικός τοκετός και οι αντίστοιχες 5^{ες} υποδιαιρέσεις του</i>
551.00.01	<i>Χειρισμοί στο έμβρυο προ του τοκετού: Αποτυχημένος εξωτερικός μετασχηματισμός</i>

Παράδειγμα 4

Αν διενεργηθεί λαπαροτομία για να πραγματοποιηθεί σκληροειδεκτομή, η οποία τελικά δεν πραγματοποιείται λόγω καρδιακής ανακοπής του ασθενούς, τότε πρέπει να κωδικοποιείται μόνο η λαπαροτομία.

354.01.00 *Διερευνητική λαπαροτομία*

Παράδειγμα 5

Όταν μια επέμβαση για καρκίνωμα οισοφάγου διακόπτεται πριν από την παρασκευή του οισοφάγου επειδή διαπιστώνεται ότι το καρκίνωμα είναι ανεγχείρητο, τότε πρέπει να κωδικοποιείται μόνο η θωρακοτομή.

334.00.01 *Διερευνητική θωρακοτομή*

P005 Πολλαπλές ιατρικές πράξεις, ιατρικές πράξεις που διαφέρουν ως προς το μέγεθος, τη διάρκεια ή τον αριθμό και αμφοτερόπλευρες ιατρικές πράξεις

Πολλαπλές ιατρικές πράξεις και ιατρικές πράξεις που διαφέρουν ως προς το μέγεθος, τη διάρκεια ή τον αριθμό

Η κωδικοποίηση των ιατρικών πράξεων πρέπει, κατά το δυνατόν, να αντανακλά όλη τη νοσηλευτική και ιατρική δαπάνη και γι' αυτόν τον λόγο οι πολλαπλώς διενεργηθείσες ιατρικές πράξεις πρέπει να κωδικοποιούνται τόσες φορές, όσες διενεργούνται στο πλαίσιο του θεραπευτικού πλάνου.

P005

Παράδειγμα 1

Σε ασθενή με χρόνια ισχαιμική καρδιοπάθεια (στεφανιαία νόσο), τοποθετούνται σε διαφορετικές συνεδρίες, ενδοπρόθεσεις (stents) που δεν απελευθερώνουν φάρμακο, σε διαφορετικές στεφανιαίες αρτηρίες.

Ιατρικές πράξεις:	583.07.19.00	<i>Διαδερμική-διαυλική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει φάρμακο: Μία ενδοπρόθεση (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία</i>
	583.07.19.00	<i>Διαδερμική-διαυλική επέμβαση στην καρδιά και τα στεφανιαία αγγεία [PTCA]: Τοποθέτηση ενδοπρόθεσης (stent) που δεν απελευθερώνει φάρμακο: Μία ενδοπρόθεση (stent) σε μία στεφανιαία αρτηρία</i>

Παρατήρηση: Πολλαπλές συνεδρίες κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας, πρέπει να κωδικοποιούνται με πολλαπλούς κωδικούς.

Εξαιρέσεις:

1. Παραδείγματος χάριν η αφαίρεση πολλαπλών δερματολογικών βλαβών, η λήψη πολλαπλών βιοψιών ή παρόμοιες σε κόστος ιατρικές πράξεις πρέπει να κωδικοποιούνται **μόνο μία** φορά κατά τη διάρκεια **μίας** συνεδρίας, εφόσον αυτές πραγματοποιούνται στην ίδια ανατομική εντόπιση (βλέπε παράδειγμα 2).

P005

Παράδειγμα 2

Ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο για αφαίρεση δέκα δερματολογικών βλαβών: ένα υποτροπιάζον βασικοκυτταρικό καρκίνωμα ρινός, τρία βασικοκυτταρικά καρκινώματα στο αντιβράχιο, τρεις ακτινικές υπερκερατώσεις στη ράχη, μία ακτινική υπερκεράτωση στην κνήμη και δύο βασικοκυτταρικά καρκινώματα στο έξω ους (αυτί).

Κύρια διάγνωση:	C44.3	<i>Άλλα κακοήγη νεοπλάσματα: Δέρματος άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του προσώπου</i>
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	C44.2	<i>Άλλα κακοήγη νεοπλάσματα: Δέρματος του ωτός και του έξω ακουστικού πόρου</i>
	C44.6	<i>Άλλα κακοήγη Νεοπλάσματα: Δέρματος του άνω άκρου, συμπεριλαμβανομένου του ώμου</i>
	C97!	<i>Πρωτοπαθή κακοήγη νεοπλάσματα πολλαπλών εντοπίσεων</i>
	L57.0	<i>Ακτινική υπερκεράτωση</i>
Ιατρικές πράξεις:	321.02.00	<i>Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού ρινός: Εκτομή της εξωτερικής μοίρας της ρινός</i>
	318.01.00	<i>Εκτομή και καταστροφή παθολογικού ιστού του έξω ωτός: Εκτομή στο πτερύγιο του ωτός</i>
	389.04.00.08	<i>Τοπική εκτομή προσβεβλημένων ιστών στο δέρμα και το υποδόριο: Εκτομή, τοπική, χωρίς σύγκλιση τραύματος σε πρώτο χρόνο: Αντιβράχιο</i>
	391.09.00	<i>Χειρουργική θεραπεία πολλαπλών όγκων σε μία εντόπιση του δέρματος σε μία συνεδρία: 3 έως 5 όγκοι</i>
	389.04.00.10	<i>Τοπική εκτομή προσβεβλημένων ιστών στο δέρμα και το υποδόριο: Εκτομή, τοπική, χωρίς σύγκλιση τραύματος σε πρώτο χρόνο: Θωρακικό τοίχωμα και ράχη</i>
	389.04.00.15	<i>Τοπική εκτομή προσβεβλημένων ιστών στο δέρμα και το υποδόριο: Εκτομή, τοπική, χωρίς σύγκλιση τραύματος σε πρώτο χρόνο: Κνήμη</i>

2. Για τις ιατρικές πράξεις που πρέπει να κωδικοποιούνται **μόνο μία φορά** κατά τη διάρκεια **μίας νοσηλείας**, πρέπει να καταχωρίζεται ως ημερομηνία, **η ημερομηνία της πρώτης διενεργηθείσας πράξης**.

2.1 Όταν οι σημειώσεις ή οι κατευθυντήριες οδηγίες ορίζουν ότι ένας κωδικός πρέπει να καταχωρίζεται **μόνο μία φορά** ή όταν οι ιατρικές πράξεις είναι επαναλαμβανόμενες κατά τη διάρκεια μίας νοσηλείας (βλέπε επίσης τον ακόλουθο ενδεικτικό πίνακα 1).

Πίνακας 1: Ιατρικές πράξεις, οι οποίες πρέπει να κωδικοποιούνται μόνο μία φορά ανά νοσηλεία

- Επίδεση σοβαρών και εκτεταμένων δερματολογικών παθήσεων (519.01)
- Χορήγηση φαρμάκων και διαιτητικής αγωγής (501)
- Διαγνωστική διαδερμική παρακέντηση της υπεζωκοτικής κοιλότητας (184.04)
- Θεραπευτική διαδερμική παρακέντηση οργάνων του θώρακα: Υπεζωκοτική κοιλότητα (515.02.01)
- Διαγνωστική (διαδερμική) παρακέντηση κοιλίας: Παρακέντηση ασκίτικης συλλογής (185.03.02)
- Θεραπευτική διαδερμική περιτοναϊκή παρακέντηση (515.03)
- Έκπλυση (Lavage) (517)
- Αφαίρεση προσβεβλημένων ιστών δέρματος και υποδορίου ιστού χωρίς αναισθησία, στο πλαίσιο αλλαγής (επιθέματος) τραύματος (519.02)
- Χειρισμοί τοποθέτησης επί κλίνης (539.00)
- Επιμέρους φυσικοθεραπευτικές παρεμβάσεις (556)
- Ηλεκτροδιέγερση, ηλεκτροθεραπεία και διάρκεια θεραπείας με εστιασμένους υπερήχους (563 έως 566, εκτός από 563.00.03)
- Διασφάλιση ανοιχτών αεραγωγών (570.00)
- Παροχή οξυγόνου σε νεογνά (572.00)
- Θεραπεία πόνου (591)
- Παρακολούθηση ζωτικών σημείων του ασθενούς (592 έως 593) ❶

Παρατήρηση:

- ❶ Η εντατική παρακολούθηση (monitoring) του ασθενούς πρέπει να κωδικοποιείται μόνο όταν πρόκειται για εντατική ιατρική παρακολούθηση ή εντατική θεραπεία που δεν αποτελεί μέρος μιας άλλης ιατρικής πράξης (π.χ. μηχανικός αερισμός, ολική νάρκωση).

2.2 Όταν ο κωδικός ιατρικών πράξεων περιλαμβάνει στοιχεία ποσότητας (π.χ. μεταγγίσεις αίματος) ή χρόνου (βλέπε επίσης τον ενδεικτικό πίνακα 2).

Ορισμένες ιατρικές πράξεις της ΕΤΙΠ, ειδικά των κεφαλαίων 4 και 5, διαφοροποιούνται με βάση το μέγεθος, τη διάρκεια και τον αριθμό.

Εδώ προστίθενται τα στοιχεία της ποσότητας και του χρόνου και το άθροισμα πρέπει να κωδικοποιείται μόνο μία φορά ανά νοσηλεία.

Εφόσον στην ΕΤΙΠ προβλέπεται η κωδικοποίηση της δόσης ή της ποσότητας, για τη χορήγηση φαρμάκων ή προϊόντων αίματος, πρέπει να κωδικοποιείται ακριβώς η δόση ή η ποσότητα που χορηγήθηκε στον ασθενή (βλέπε παράδειγμα 3).

P005

Πίνακας 2: Ιατρικές πράξεις, οι οποίες πρέπει να κωδικοποιούνται μόνο μία φορά ανά νοσηλεία, ως άθροισμα

- Μηχανικός αερισμός και υποστήριξη της αναπνοής μέσω μάσκας ή σωλήνα (571)
- Μετάγγιση ολικού αίματος, συμπυκνωμένων ερυθρών αιμοσφαιρίων και συμπυκνωμένων αιμοπεταλίων (580.00)
- Μετάγγιση λευκών αιμοσφαιρίων (580.02)
- Μετάγγιση πλάσματος, συστατικών του πλάσματος και χορήγηση υποκατάστατων όγκου (581)

Παράδειγμα 3

581.00.08	<i>Ανασυνδυσασμένος παράγοντας VIII</i>
581.00.08.00	<i>Έως 2.000 μονάδες</i>
581.00.08.01	<i>2001 μονάδες έως 5000 μονάδες</i>
581.00.08.02	<i>Περισσότερες από 5.000 μονάδες</i>

Αμφοτερόπλευρες ιατρικές πράξεις

Η ΕΤΙΠ προβλέπει, για τις αμφοτερόπλευρες ιατρικές πράξεις σε όργανα και ανατομικές περιοχές, την υποχρεωτική επισήμανση του κωδικού με έναν χαρακτήρα που προσδιορίζει την πλευρά στην οποία διενεργήθηκε η ιατρική πράξη (R= δεξιά (right), L= αριστερά (left), B= αμφοτερόπλευρα (bilateral)). Μια αμφοτερόπλευρη ιατρική πράξη που εκτελείται σε μία συνεδρία επισημαίνεται με το σύμβολο «B». Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, επισημαίνεται η πλευρά στην οποία διενεργήθηκε η πράξη (R, L).

Παράδειγμα 4

Ακρωτηριασμός και των δύο κνημών

386.04.08 B *Ακρωτηριασμός κνήμης, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό, άμφω*

P006

P006 Λαπαροσκοπικές/αρθροσκοπικές/ενδοσκοπικές ιατρικές πράξεις

Στην ΕΤΙΠ, η μέθοδος της επέμβασης (λαπαροσκοπική, αρθροσκοπική ή ενδοσκοπική) περιλαμβάνεται συνήθως στον κωδικό της και προσδιορίζεται από την 5^η ή 6^η υποδιαίρεση.

Παράδειγμα 1

Λαπαροσκοπική αφαίρεση της χοληδόχου κύστης χωρίς λαπαροσκοπική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων

351.01.01.01 *Χολοκυστεκτομή: Απλή, λαπαροσκοπικά: Χωρίς λαπαροσκοπική διερεύνηση των χοληφόρων αγγείων*

Παράδειγμα 2

344.08 *Άλλη αποκατάσταση του στομάχου*

Σημ.: Η προσπέλαση πρέπει να κωδικοποιείται στην 6η υποδιαίρεση, σύμφωνα με την ακόλουθη λίστα:

- 00 *Ανοικτά χειρουργικά διακοιλιακά*
- 01 *Ανοικτά χειρουργικά διαθωρακικά*
- 02 **Λαπαροσκοπικά**
- 03 *Αλλαγή από λαπαροσκοπικά σε ανοικτά χειρουργικά*
- 98 *Άλλο*

- ** 344.08.00 *Συρραφή (μετά από τραυματισμό)*
- ** 344.08.01 *Σύγκλειση γαστροστομίας (σίτισης)*
- ** 344.08.02 *Γαστροπηξία*
- ** 344.08.03 *Σφιγκτηροπλαστική (π.χ. κατά Belsey)*

Σε περίπτωση που η μέθοδος δεν περιλαμβάνεται στον κωδικό της επέμβασης, πιθανόν λόγω της διαρκούς εξέλιξης των επεμβατικών τεχνικών, τότε πρέπει να κωδικοποιείται η επέμβαση και να καταχωρίζεται πρόσθετος κωδικός για τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε.

Παράδειγμα 3

Ενδοσκοπική τοποθέτηση συστήματος παροχέτευσης ENY (shunt)

302.03.00.00 *Τοποθέτηση συστήματος παροχέτευσης του ENY (shunt): Παροχέτευση στον κόλπο της καρδιάς: Μεταξύ κοιλίας και δεξιού κόλπου*

305.09.11 *Άλλες επεμβάσεις νεύρων και γαγγλίων: Χρήση ενδοσκοπικού συστήματος*

P007

P007 Ενδοσκόπηση πολλαπλών ανατομικών περιοχών

Κατά την ενδοσκόπηση πολλαπλών ανατομικών περιοχών, πρέπει να καταχωρίζεται η ενδοσκόπηση του τελικού τμήματος/ανατομικής περιοχής που ελέγχθηκε.

Παράδειγμα 1

Η απλή οισοφαγο-, γαστρο-, δωδεκαδακτυλο-, νηστιδο-, ειλεοσκόπηση πρέπει να κωδικοποιείται ως εξής:

163.06.00 *Διαγνωστική ενδοσκόπηση του λεπτού εντέρου (νήστιδας και ειλεού):
Απλή (εντεροσκόπηση με ώθηση push endoscopy)*

Παράδειγμα 2

Η ενδοσκόπηση του ανώτερου αναπνευστικού με φαρυγγοσκόπηση, τραχειοσκόπηση και βρογχοσκόπηση, πρέπει να κωδικοποιείται ως εξής:

162.00.00.00 *Διαγνωστική τραχειοβρογχοσκόπηση: Με εύκαμπτο βρογχοσκόπιο:
Χωρίς περαιτέρω διαγνωστικές εξετάσεις*

P008 Κλινική εξέταση υπό γενική αναισθησία

Μια κλινική εξέταση υπό γενική αναισθησία πρέπει να καταχωρίζεται χωριστά, όταν διενεργείται ως ανεξάρτητη ιατρική πράξη. Όταν δεν υπάρχει ειδικός κωδικός για αυτήν την εξέταση στην ΕΤΙΠ, τότε πρέπει να καταχωρίζεται ο γενικότερος κωδικός 110.00 *Κλινική εξέταση υπό ολική νάρκωση* (βλέπε παράδειγμα 2).

Σε περίπτωση που η κλινική εξέταση διενεργείται στο πλαίσιο μιας επεμβατικής ή χειρουργικής πράξης, τότε η κλινική εξέταση δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά (βλέπε παράδειγμα 1).

Παράδειγμα 1

Εκτομή μιας κύστης κοιλιακού τοιχώματος και γυναικολογική κλινική εξέταση υπό γενική αναισθησία.

370.02.01 *Εκτομή προσβεβλημένων ιστών του κόλπου*

Παράδειγμα 2

Δακτυλική εξέταση υπό ενδοφλέβια γενική αναισθησία.

110.00 *Κλινική εξέταση υπό ολική νάρκωση*

P009

P009 Αναισθησία

Η κωδικοποίηση της αναισθησίας με έναν κωδικό της κατηγορίας 590 πρέπει να γίνεται σε εξαιρετικές περιπτώσεις. Αυτό ισχύει, για παράδειγμα, όταν ασθενείς σε καταπληξία, νήπια ή ασθενείς που δεν συνεργάζονται λαμβάνουν γενική αναισθησία, για τη διενέργεια μιας διαγνωστικής ή θεραπευτικής ιατρικής πράξης, η οποία φυσιολογικά θα διενεργείτο χωρίς αναισθησία.

Σε περίπτωση που υπάρχει κωδικός για τη διενεργηθείσα ιατρική πράξη, αυτός πρέπει να καταχωρίζεται μαζί με έναν κωδικό της κατηγορίας 590 για την αναισθησία που διενεργήθηκε (βλέπε παράδειγμα 1). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ένας κωδικός για τη διενεργηθείσα ιατρική πράξη, τότε πρέπει να καταχωρίζεται μόνο ο κωδικός από τους 590.

Παράδειγμα 1

Νήπιο εισάγεται για διερεύνηση πιθανού όγκου εγκεφάλου. Διενεργείται MRI εγκεφάλου υπό γενική αναισθησία.

282.00	<i>Μαγνητική τομογραφία κρανίου με παραμαγνητική σκιαγραφική ουσία</i>
590.00	<i>Ενδοφλέβια αναισθησία</i>

P013 Επαναδιάνοιξη μιας χειρουργημένης περιοχής/επανεπέμβαση

Σε περίπτωση επαναδιάνοιξης μιας χειρουργημένης περιοχής για:

- αντιμετώπιση μιας επιπλοκής
- αντιμετώπιση μιας υποτροπής
- διενέργεια άλλης επέμβασης στην ίδια ανατομική περιοχή

πρέπει πρώτα να ελέγχεται, αν η διενεργηθείσα επανεπέμβαση μπορεί να κωδικοποιηθεί με ειδικό κωδικό στο αντίστοιχο κεφάλαιο του οργάνου, όπως π.χ.:

328.09.01	<i>Χειρουργική αιμόσταση μετά από αμυγδαλεκτομή</i>
382.01.01.02	<i>Αλλαγή πρόθεσης κεφαλής μηριαίου: Σε ολική ενδοπρόθεση, χωρίς τσιμέντο</i>

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος κωδικός, τότε πρέπει να κωδικοποιείται η διενεργηθείσα επέμβαση, μαζί με έναν κωδικό για την επανεπέμβαση, όπως π.χ.:

334.09.06	<i>Επανεπέμβαση σε πνεύμονα, θρόγχο, θωρακικό τοίχωμα, υπεζωκότα, μεσοθωράκιο ή διάφραγμα</i>
337.09.05	<i>Άλλες επεμβάσεις σε καρδιά και περικάρδιο: Επανεπέμβαση</i>
355.09.03	<i>Άλλες επεμβάσεις στους νεφρούς: Επέμβαση αναθεώρησης</i>
374.09.00	<i>Καισαρική τομή</i>
398.03	<i>Επανεπέμβαση</i>

(βλέπε παραδείγματα 1 και 2).

P014

Σε ορισμένα κεφάλαια της ΕΤΙΠ υπάρχουν συγκεκριμένοι αυτόνομοι κωδικοί για την επανεπέμβαση, οι οποίοι χρησιμοποιούνται συχνά ως πρόσθετοι κωδικοί (βλέπε ΕΚΟΚ 0909 *Αναθεώρηση καρδιοχειρουργικής επέμβασης ή επανεπέμβαση καρδιάς και περικαρδίου* (σελίδα 116)).

Παράδειγμα 1

306.02.08	<i>Άλλη μερική θυρεοειδεκτομή: Υφολική εκτομή</i>
398.03	<i>Επανεπέμβαση</i>

Παράδειγμα 2

334.00.13	<i>Θωρακοσκόπηση για παροχέτευση αιματώματος</i>
334.09.06	<i>Επανεπέμβαση σε πνεύμονα, βρόγχο, θωρακικό τοίχωμα, υπεζωκότα, μεσοθωράκιο ή διάφραγμα</i>

P014 Ιατρικές πράξεις, οι οποίες δεν χρήζουν κωδικοποίησης

Ιατρικές πράξεις, οι οποίες διενεργούνται ως πράξεις ρουτίνας στην πλειοψηφία των ασθενών ή πολλαπλώς κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας, δεν χρήζουν κωδικοποίησης, καθώς το κόστος αυτών των πράξεων αντικατοπτρίζεται στη διάγνωση ή στις άλλες διενεργηθείσες ιατρικές πράξεις (βλέπε παράδειγμα 1). Γι' αυτόν τον λόγο δεν περιλαμβάνονται στην ΕΤΙΠ. Αυτές δεν πρέπει επίσης να κωδικοποιούνται με την κατηγορία «άλλο...» (βλέπε επίσης ΕΚΟΚ Ρ003 *Σημειώσεις και κοινά αποδεκτοί όροι για τη χρήση της ΕΤΙΠ* (σελίδα 41)).

Πίνακας 1: Παραδείγματα ιατρικών πράξεων που δεν χρήζουν κωδικοποίησης

- Γύψινοι νάρθηκες εκτός της σύνθετης αποκατάστασης με γύψινο νάρθηκα (531.00)
- Επίδεση , εκτός σοβαρών και εκτεταμένων δερματολογικών παθήσεων (519.01)
- Καρδιοπληγία
- Καρδιοτοκογραφία (ΚΤΓ)
- Φαρμακευτική αγωγή, με τις ακόλουθες εξαιρέσεις:
 - σε νεογνά
 - χημειοθεραπεία, που δεν είναι αντιβιοτική θεραπεία
 - συστηματική θρομβόλυση
 - χορήγηση ανοσοσφαιρίνης
 - χορήγηση παραγόντων πήξεως
 - άλλη ανοσοθεραπεία (554.07)
 - αντιρετροϊκή θεραπεία
 - φάρμακα από το κεφάλαιο 4 (προβλέπεται να εισαχθεί σε επόμενη έκδοση)
- Υπερηχοκαρδιογράφημα
- Καρδιογράφημα ηρεμίας
- Holter καρδιάς (24ωρη καταγραφή ΗΚΓ)
- Καρδιογράφημα σε κόπωση
- 24ώρη καταγραφή της πίεσης
- Τοποθέτηση ενός ρινογαστρικού σωλήνα (levin)
- Τοποθέτηση ενός ουροκαθετήρα
- Υποδόρια χορήγηση φαρμακευτικών ουσιών, π.χ. ηπαρίνη
- Αιμοληψία
- Κλινική εξέταση κατά την εισαγωγή του ασθενούς και κατά τη διάρκεια της νοσηλείας
- Ιατρική επίσκεψη
- Εξέταση από σύμβουλο άλλης ειδικότητας
- Συμβατικές ακτινολογικές εξετάσεις
- Αναπνευστικές λειτουργικές δοκιμασίες με εξαίρεση τους κωδικούς της κατηγορίας 171
- Ανάλυση αερίων αίματος σε ηρεμία
- Ανάλυση αναπνευστικών αερίων
- Υπερηχογράφημα, με εξαίρεση την ενδοσκοπική υπερηχοτομογραφία και η σύνθετη διαφοροδιαγνωστική ψηφιακή υπερηχοτομογραφία και βιντεοσκόπηση

P015

Παράδειγμα 1

- Η διενέργεια ακτινογραφίας και η εφαρμογή γύψινου επιδέσμου είναι συνηθισμένη προσέγγιση σε κάταγμα κερκίδας (Colles).
- Η ενδοφλέβια χορήγηση αντιβιοτικών είναι αναμενόμενη σε περιπτώσεις σήψης.
- Η καρδιοπληγία αποτελεί μέρος μιας καρδιοχειρουργικής επέμβασης.

Οι πράξεις αυτές αποτελούν δηλαδή καθιερωμένη διαδικασία σε συγκεκριμένες διαγνωστικές και ιατρικές πράξεις, και γι' αυτόν τον λόγο, δεν απαιτούν ειδική κωδικοποίηση.

Ιατρικές πράξεις, οι οποίες κατά την εξέλιξη των DRG, αποδεικνύεται ότι επηρεάζουν την ομαδοποίηση των διαγνώσεων, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τις βελτιώσεις της ΕΤΙΠ και των κατευθυντήριων οδηγιών κωδικοποίησης.

P015 Λήψη και μεταμόσχευση οργάνων

Κατά τη λήψη και μεταμόσχευση οργάνων, πρέπει να γίνεται διάκριση μεταξύ του δότη και του λήπτη. Κατά τη δωρεά οργάνων, πρέπει να διαχωρίζεται η δωρεά εν ζωή από τη δωρεά μετά θάνατον. Στην αυτόλογη μεταμόσχευση, ο δότης και ο λήπτης του οργάνου συμπίπτουν.

1. Εξέταση πιθανού δότη οργάνου και ιστού

Σε περίπτωση που εισάγεται στο νοσοκομείο πιθανός δότης για εν ζωή δωρεά οργάνου, με σκοπό τη διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων, πρέπει να κωδικοποιείται ως κύρια διάγνωση η:

Z00.5 *Εξέταση πιθανού δότη οργάνου και ιστού,*

εφόσον η λήψη ιστού ή οργάνου δεν πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας. Κωδικοί της κατηγορίας Z52.– *Δότες οργάνων και ιστών δεν επιτρέπεται να καταχωρίζονται.*

2. Δωρεά από ζώντα δότη

Για ζώντες δότες που εισάγονται για δωρεά ιστών ή οργάνων πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση ο κωδικός:

Z52.– *Δότες οργάνων και ιστών,*

όταν η λήψη ιστών ή οργάνων διενεργείται κατά την ίδια νοσηλεία. Επίσης, πρέπει να κωδικοποιούνται οι αντίστοιχες ιατρικές πράξεις που διενεργούνται για τη λήψη του μοσχεύματος (βλέπε τον ακόλουθο πίνακα).

Παράδειγμα 1

Ένας αλλογενής ζων δότης εισάγεται για εν ζωή δωρεά ενός νεφρού. Διενεργείται νεφρεκτομή, προς μεταμόσχευση. Δεν υπάρχουν άλλες σχετικές δευτερεύουσες διαγνώσεις.

Κύρια διάγνωση: Z52.4 Δότης νεφρού

Ιατρική πράξη: 355.04.08 Νεφρεκτομή για μεταμόσχευση, από ζώντα δότη

Παράδειγμα 2

Ένας αλλογενής ζων δότης εισάγεται για εν ζωή λήψη βλαστοκυττάρων προς μεταμόσχευση. Δεν υπάρχουν άλλες σχετικές δευτερεύουσες διαγνώσεις.

Κύρια διάγνωση: Z52.01 Δότης βλαστοκυττάρων

Ιατρική πράξη: 341.00.01.01 Λήψη αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από τον μυελό των οστών και το περιφερικό αίμα προς μεταμόσχευση: Αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα από περιφερικό αίμα: Για αλλογενή δωρεά (συγγενής ή μη συγγενής λήπτης)

Σε αυτόλογη δωρεά και μεταμόσχευση κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας, δεν επιτρέπεται να καταχωρίζονται οι κωδικοί της κατηγορίας Z52.– Δότες οργάνων και ιστών. Πρέπει να καταχωρίζονται οι κύριες και δευτερεύουσες διαγνώσεις, καθώς και οι κωδικοί ιατρικών πράξεων της ΕΤΙΠ για τη λήψη του μοσχεύματος και τη μεταμόσχευση.

3. Δωρεά μετά από εγκεφαλικό θάνατο στο νοσοκομείο

(Τα κριτήρια για μια πιθανή μετά θάνατον δωρεά είναι ο εγκεφαλικός θάνατος με βάση τη νομοθεσία της χώρας, η συγκατάθεση και η κλινική καταλληλότητα)

Η κωδικοποίηση σε περίπτωση ασθενή που αντιμετωπίζεται ως πιθανός μετά θάνατον δότης οργάνων, δεν πρέπει να διαφέρει από τη συνήθη τακτική που ακολουθείται για την κωδικοποίηση διαγνώσεων και ιατρικών πράξεων. Ως κύρια διάγνωση πρέπει να καταχωρίζεται το νόσημα εκείνο ή ο τραυματισμός που είχε ως αποτέλεσμα την εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο, ακολουθούν οι δευτερεύουσες διαγνώσεις και οι διενεργηθείσες ιατρικές πράξεις.

Ο αντίστοιχος κωδικός για τη λήψη οργάνων ή ο κωδικός 597.08 Διατήρηση της ομοιόστασης για μεταθανάτια δωρεά οργάνων δεν πρέπει να καταχωρίζονται (βλέπε επίσης την αντίστοιχη σημείωση στην ΕΤΙΠ). Επίσης δεν πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός Z00.5 Εξέταση πιθανού δότη οργάνου και ιστού.

4. Μεταμόσχευση

Για τους λήπτες του μεταμοσχευθέντος οργάνου πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση ο λόγος εισαγωγής του ασθενούς στο νοσοκομείο και ο

P015

αντίστοιχος κωδικός της ιατρικής πράξης για τη μεταμόσχευση. Δεν απαιτείται η κωδικοποίηση της αφαίρεσης του πάσχοντος οργάνου. Για τους ασθενείς που υπόκεινται σε μεταμοσχεύσεις τύπου «domino» (όταν ένας ασθενής, κατά τη διάρκεια της θεραπείας, και δωρίζει και λαμβάνει ένα όργανο, γίνεται δηλαδή ταυτόχρονα και δότης και λήπτης (π.χ. καρδιάς/πνευμόνων)) πρέπει να καταχωρίζεται και μια δευτερεύουσα διάγνωση για τη δωρεά του οργάνου από τους κωδικούς της κατηγορίας Z52.– *Δότες οργάνων και ιστών.* Επίσης, καταχωρίζονται οι κωδικοί της ιατρικής πράξης για τη μεταμόσχευση και τη λήψη του οργάνου, με τη μεταμόσχευση να καταχωρίζεται ως κύρια ιατρική πράξη.

5. Αποτυχία μεταμόσχευσης και απόρριψη μοσχεύματος

Σε περίπτωση που ένας ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο λόγω αποτυχίας μεταμόσχευσης ή απόρριψης του μεταμοσχευθέντος οργάνου ή ιστού ή λόγω εκδήλωσης νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή (Graft-versus-host-disease (GVHD)), πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση ένας κωδικός από της κατηγορίας T86.– *Απόρριψη και ανεπάρκεια μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών.*

Στην περίπτωση της μεταμόσχευσης αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων και εκδήλωσης νόσου μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GVHD), πρέπει να κωδικοποιούνται οι οργανικές εκδηλώσεις της νόσου σύμφωνα με το σύστημα σταυρού/αστερίσκου. Ακολούθως, πρέπει να καταχωρίζεται η βασική (π.χ. κακοήθης) νόσος ως δευτερεύουσα διάγνωση (αυτός ο κανόνας υπερισχύει της ΕΚΟΚ 0201 *Επιλογή και σειρά καταχώρισης των κωδικών* (σελίδα 75)).

Σε περίπτωση που ο λόγος εισαγωγής του ασθενούς είναι άλλος από την αποτυχία ή απόρριψη του μοσχεύματος, τότε δεν πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση ένας κωδικός της κατηγορίας T86.– *Απόρριψη και ανεπάρκεια μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών.*

Πίνακας λήψης και μεταμόσχευσης οργάνων και ιστών – 1^ο Μέρος (Αυτός ο πίνακας είναι ενδεικτικός και δεν αποτελεί πλήρη καταγραφή)					
ΟΡΓΑΝΑ/ ΙΣΤΟΙ	ΔΩΡΕΑ Κωδικός διαγνώσεων για ζώντα δότη	ΛΗΨΗ Κωδικός ιατρικών πράξεων (από την) ΕΤΠΠ		ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ Κωδικός ιατρικών πράξεων (από την) ΕΤΠΠ: Λήψης	
Βλαστικά κύτταρα	Z52.01	341.00.01.00 341.00.01.01	Λήψη αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από τον μυελό των οστών και το περιφερικό αίμα προς μεταμόσχευση: Αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα από περιφερικό αίμα: Για αυτομετάγγιση Λήψη αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από τον μυελό των οστών και το περιφερικό αίμα προς μεταμόσχευση: Αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα από περιφερικό αίμα: Για αλλογενή δωρεά (συγγενής ή μη συγγενής λήψης)	580.05 Μεταμόσχευση περιφερικών αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων	
Μυελός των οστών	Z52.3	341.00.00.00 341.00.00.01	Λήψη αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από τον μυελό των οστών και το περιφερικό αίμα προς μεταμόσχευση: Αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα από τον μυελό των οστών: Για αυτομετάγγιση Λήψη αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων από τον μυελό των οστών και το περιφερικό αίμα προς μεταμόσχευση: Αιμοποιητικά βλαστικά κύτταρα από τον μυελό των οστών: Για αλλογενή δωρεά (συγγενής ή μη συγγενής λήψης)	341.01 Μεταμόσχευση αιμοποιητικών βλαστικών κυττάρων από τον μυελό των οστών	
Δέρμα	Z52.1	390.01 390.04 392.04	Μεταμόσχευση δέρματος, σημείο λήψης του μοσχεύματος Πλαστική επέμβαση δέρματος και υποδορίου με κρημνούς, σημείο λήψης Ελεύθερη μεταμόσχευση δέρματος και πλαστική με κρημνούς στο δέρμα και το υποδόριο σε θερμικά και χημικά εγκαύματα, σημείο λήψης του μοσχεύματος	Κατάλληλος κωδικός από 389...392 Χειρουργικές επεμβάσεις στο δέρμα και το υποδόριο	
Οστά	Z52.2	378.03	Λήψη οστικού υλικού για μεταμόσχευση	378.04 Μεταμόσχευση και μετάθεση οστικών τμημάτων	

Νεφροί	Z52.4	355.04.08	Νεφρεκτομή για μεταμόσχευση, από ζώιντα δότη	355.05	Μεταμόσχευση νεφρού
Βλαστοκύτταρα σκληροκερατοειδούς ορίου/επιτεφικάτα	Z52.8	311.02	Εκτομή και καταστροφή (παθολογικού) ιστού του επιτεφικάτα	311.03.00	Μεταμόσχευση επιτεφικάτα ή βλαστοκυττάρων σκληροκερατοειδούς ορίου
Ήπαρ	Z52.6	350.03.03	Εκτομή δύο τμημάτων [αριστερή λοβεκτομή] [εκτομή των τμημάτων 2 και 3], για δωρεά οργάνων από ζώιντα δότη	350.04 586.02	Μεταμόσχευση ήπατος Μεταμόσχευση ηπατοκυττάρων
		350.03.04	Αριστερή ημηπατεκτομή [εκτομή τμημάτων (1), 2, 3, 4α και 4β] για δωρεά οργάνων από ζώιντα δότη		
		350.03.05	Δεξιά ηπατεκτομή [εκτομή τμημάτων 5 ως 8] για δωρεά οργάνων από ζώιντα δότη		
		350.03.06	Εκτομή άλλων συνδυασμών τμημάτων για δωρεά οργάνων από ζώιντα δότη		

Πίνακας λήψης και μεταμόσχευσης οργάνων και ιστών – 2^ο Μέρος (Αυτός ο πίνακας είναι ενδεικτικός και δεν αποτελεί πλήρη καταγραφή)	
ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΤΙΠ ΠΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΟΥ ΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΜΕΤΑ ΘΑΝΑΤΟΝ	
ΟΡΓΑΝΟ/ΙΣΤΟΣ	ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ Κωδικός ιατρικής πράξης (από την) ΕΤΙΠ: Λήπτης
Καρδιά	337.05.00 Μεταμόσχευση καρδιάς, ορθοτοπική
	337.05.01 Μεταμόσχευση καρδιάς ετεροτοπική (υποδοθητική καρδιά)
	337.05.03 Επαναμεταμόσχευση καρδιάς κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας
Πνεύμονας	333.05.02 Μεταμόσχευση πνεύμονα
	333.05.03 Επαναμεταμόσχευση κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας
Καρδιά και πνεύμονας	337.05.02 Μεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων εν-βλοκ
	337.05.04 Επαναμεταμόσχευση καρδιάς-πνευμόνων εν βλοκ κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας
Πάγκρεας	352.08 Μεταμόσχευση παγκρέατος (παγκρεατικού ιστού)
Ήπαρ	350.04 Μεταμόσχευση ήπατος
	586.02.00 Μεταμόσχευση ηπατοκυττάρων: Αλλογενής
Κερατοειδής	312.05 Μεταμόσχευση και προσαθητική κερατοειδούς
Νεφρός	355.05 Μεταμόσχευση νεφρού
Λεπτό έντερο	346.07.06.01 Μεταμόσχευση λεπτού εντέρου: Νησιτίδα
	346.07.06.02 Μεταμόσχευση λεπτού εντέρου: Ειλεός
	346.07.09.01 Επανεμφύτευση λεπτού εντέρου κατά την ίδια νοσηλεία: Νησιτίδα
	346.07.09.02 Επανεμφύτευση λεπτού εντέρου κατά την ίδια νοσηλεία: Ειλεός

P016**P016 Διακομιδή σε άλλο νοσοκομείο για διενέργεια ιατρικής πράξης και επιστροφής εντός 24 ωρών**

Ιατρικές πράξεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο διακομιδής σε άλλο νοσοκομείο για διενέργεια ιατρικής πράξης και επιστροφής εντός 24 ωρών, πρέπει να κωδικοποιούνται από το νοσοκομείο που διακομίζει τον ασθενή.

**ΕΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ**

1 ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΛΟΙΜΩΔΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

0101 HIV/AIDS

Παρατήρηση: Όταν στη συγκεκριμένη κατευθυντήρια οδηγία αναφέρεται η ομάδα κωδικών «B20–B24», τότε εννοούνται όλοι οι κωδικοί αυτής της ομάδας, με εξαίρεση τον κωδικό **B23.0 Οξύ σύνδρομο της HIV λοίμωξης**.

Οι ακόλουθοι είναι κωδικοί που αφορούν τον HIV:

R75	<i>Εργαστηριακή ένδειξη του ιού της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (δηλαδή αμφίβολο αποτέλεσμα ορολογικής δοκιμασίας)</i>
B23.0	<i>Οξύ σύνδρομο της HIV λοίμωξης</i>
Z21	<i>Ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] (δηλαδή HIV οροθετική λοίμωξη ΜΚΑ)</i>
B20–B24	<i>Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]</i>
O98.7	<i>HIV-Λοίμωξη [από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου] που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία</i>

Οι κωδικοί **R75**, **Z21**, **B23.0** και η ομάδα **B20–B24** είναι αμοιβαία αποκλειόμενοι και δεν επιτρέπεται να καταχωρίζονται μαζί κατά την ίδια νοσηλεία.

Εργαστηριακή ένδειξη του ιού HIV - R75

Αυτός ο κωδικός χρησιμοποιείται μόνο για τους ασθενείς, για τους οποίους η θετικότητα για αντισώματα έναντι του HIV δεν είναι επιβεβαιωμένη. Αυτό αφορά συνήθως περιπτώσεις όπου η αρχική δοκιμασία ανίχνευσης (screening test) για HIV είναι θετική, οι επιβεβαιωτικές δοκιμασίες όμως είναι είτε αρνητικές είτε αμφίβολες. Ο κωδικός **R75 Εργαστηριακή ένδειξη του ιού της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]** δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως κύρια διάγνωση.

Οξύ σύνδρομο της HIV λοίμωξης - B23.0

Στην περίπτωση ενός «οξέος συνδρόμου HIV λοίμωξης» (είτε επιβεβαιωμένου είτε πιθανού) πρέπει να καταχωρίζεται πρόσθετα ο κωδικός **B23.0 Οξύ σύνδρομο της HIV λοίμωξης**, ως δευτερεύουσα διάγνωση στους κωδικούς των εκδηλωθέντων συμπτωμάτων (π.χ. λεμφαδενοπάθεια, εμπύρετο) ή επιπλοκών (π.χ. μηνιγγίτιδα).

Σημείωση: Γενικά τα συμπτώματα και κλινικά ευρήματα πρέπει να κωδικοποιούνται μόνο όταν είναι άγνωστης αιτιολογίας. Η συγκεκριμένη οδηγία κωδικοποίησης αποτελεί, συνεπώς, μια εξαίρεση της ενότητας «Κωδικοί για συμπτώματα, κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα και μη σαφώς καθορισμένες καταστάσεις» στην ΕΚΟΚ D002 *Κύρια διάγνωση* (σελίδα 4).

0101

Παράδειγμα 1

Ένας HIV-οροθετικός ασθενής εισάγεται λόγω γενικευμένης λεμφαδενοπάθειας. Διαγιγνώσκεται οξύ σύνδρομο HIV λοίμωξης.

Κύρια διάγνωση: R59.1 *Λεμφαδενική διόγκωση, γενικευμένη*

Δευτερεύουσα διάγνωση: B23.0 *Οξύ σύνδρομο της HIV λοίμωξης*

Μετά από πλήρη ύφεση του οξέος συνδρόμου της HIV λοίμωξης, σχεδόν όλοι οι ασθενείς είναι και παραμένουν για αρκετά χρόνια ασυμπτωματικοί. Σε περιπτώσεις μελλοντικών εισαγωγών σε νοσοκομείο, η κωδικοποίηση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατευθυντήριες οδηγίες. Ο κωδικός «Οξύ σύνδρομο της HIV λοίμωξης» (B23.0) δεν χρησιμοποιείται πλέον, εφόσον απουσιάζει η αντίστοιχη συμπτωματολογία.

Ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου HIV - Z21

Ο κωδικός Z21 *Ασυμπτωματική λοίμωξη από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]* δεν πρέπει να χρησιμοποιείται ως κωδικός ρουτίνας, αλλά να καταχωρίζεται ως δευτερεύουσα διάγνωση μόνο όταν ένας HIV οροθετικός ασθενής δεν παρουσιάζει συμπτώματα λοίμωξης αλλά το κόστος νοσηλείας του αυξάνεται λόγω της λοίμωξης αυτής (βλέπε ΕΚΟΚ D003 *Δευτερεύουσες διαγνώσεις* (σελίδα 10)).

Εφόσον ο κωδικός Z21 αφορά ασθενείς που είναι ασυμπτωματικοί (ως προς τη νόσο HIV) και έχουν εισαχθεί για αντιμετώπιση νοσήματος που δεν σχετίζεται με HIV λοίμωξη, δεν πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός Z21 ως κύρια διάγνωση.

Νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου HIV (AIDS) – B20, B21, B22, B23.8, B24

Για την κωδικοποίηση ασθενών με νόσο που σχετίζεται με τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου HIV (αυτό μπορεί να είναι AIDS ή και όχι) διατίθενται οι ακόλουθοι κωδικοί:

B20	<i>Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα ως αποτέλεσμα νόσου HIV [ιός της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου]</i>
B21	<i>Κακοήγη νεοπλασμάτα ως αποτέλεσμα νόσου HIV [ιός της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου]</i>
B22	<i>Άλλα καθορισμένα νοσήματα ως αποτέλεσμα νόσου HIV [ιός της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου]</i>
B23.8	<i>Άλλες καθορισμένες νοσολογικές οντότητες ως αποτέλεσμα νόσου HIV [ιός της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου]</i>
B24	<i>Μη καθορισμένη νόσος από τον ιό της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV]</i>

Οι κωδικοί R75 και Z21 δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε αυτήν την περίπτωση.

Επιλογή και σειρά καταχώρισης των κωδικών

Εφόσον η νόσος HIV είναι η κύρια πάθηση εξαιτίας της οποίας νοσηλεύεται ο ασθενής, πρέπει να καταχωρίζεται ο αντίστοιχος κωδικός της κατηγορίας B20-B24 (εκτός του B23.0) ή ο κωδικός O98.7, ως κύρια διάγνωση (βλέπε επίσης ΕΚΟΚ 1510 *Επιπλοκές στην κύηση* (σελίδα 138)). Ένας HIV οροθετικός ασθενής εισάγεται, για παράδειγμα, για αντιρετροϊκή αγωγή.

Εφόσον η κύρια πάθηση εξαιτίας της οποίας νοσηλεύεται ο ασθενής είναι μία κλινική εκδήλωση της ήδη γνωστής νόσου HIV, τότε πρέπει να κωδικοποιείται η κλινική εκδήλωση ως κύρια διάγνωση. Ένας κωδικός της κατηγορίας B20-B24 (εκτός του B23.0) πρέπει να καταχωρίζεται ως δευτερεύουσα διάγνωση.

Παράδειγμα 2

Ένας ασθενής εισάγεται με λευκωπό επίχρισμα στοματικού βλεννογόνου, σε έδαφος γνωστής νόσου HIV.

Κύρια διάγνωση: B37.0 *Καντινιασική στοματίτιδα*

Δευτερεύουσα διάγνωση: B20 *Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα ως αποτέλεσμα νόσου HIV [ιός της ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου]*

Κατά βάση, όλες οι κλινικές εκδηλώσεις της νόσου HIV (AIDS) δεν μπορούν να κωδικοποιηθούν ως δευτερεύουσες διαγνώσεις, καθότι είναι ασύμβατες με τον ορισμό της δευτερεύουσας διάγνωσης (ΕΚΟΚ D003 *Δευτερεύουσες διαγνώσεις* (σελίδα 10)).

0103 Βακτηριαμία, σηψαιμία, SIRS και ουδετεροπενία**Βακτηριαμία**

Η βακτηριαμία πρέπει να κωδικοποιείται με έναν κωδικό της κατηγορίας:

A49.- *Βακτηριακή λοίμωξη μη καθορισμένης εντόπισης*

ή με έναν άλλον κωδικό που περιγράφει τον συγκεκριμένο παθογόνο μικροοργανισμό π.χ. A54.9 *Γονοκοκκική λοίμωξη, μη καθορισμένη*.

Δεν πρέπει να κωδικοποιείται με έναν κωδικό σηψαιμίας (βλέπε πίνακα 1).

Εξάιρεση αποτελεί η βακτηριαμία από μηνιγγιτιδόκοκκο, που κωδικοποιείται με τον κωδικό:

A39.4 *Μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία, μη καθορισμένη*

Σηψαιμία (σήψη)

Αντίθετα, η σηψαιμία πρέπει να κωδικοποιείται με τον αντίστοιχο κωδικό της σηψαιμίας π.χ. από τον πίνακα 1. Αυτό ισχύει και για την κλινική εκδήλωση της ουροσήψης.

0103

Πίνακας 1:

A02.1	Σηψαιμία από σαλμονέλλα
A32.7	Σηψαιμία από λιστέρια
A39.2	Οξεία μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία
A39.3	Χρόνια μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία
A39.4	Μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία, μη καθορισμένη
A40.–	Στρεπτοκοκκική σηψαιμία
A41.–	Άλλες μορφές σηψαιμίας
B37.7	Καντινιασική σηψαιμία
P36.–	Βακτηριακή σηψαιμία του νεογνού

Η σηψαιμία που σχετίζεται με αποβολή, έκτοπη κύηση, μύλη κύηση, τοκετό ή λοχεία πρέπει να κωδικοποιείται με τους αντίστοιχους κωδικούς από τον πίνακα 2. Πρόσθετα πρέπει να χρησιμοποιείται και ένας κωδικός από τον πίνακα 1, που παραπέμπει στην ύπαρξη σηψαιμίας, καθώς και στον παθογόνο μικροοργανισμό.

Πίνακας 2

O03–O07	Κύηση που καταλήγει σε αποβολή (αυτόματη ή προκλητή)
O08.0	Λοίμωξη των γυναικείων γεννητικών οργάνων και της πυέλου μετά από διακοπή της κύησης, εξωμήτριο και μύλη κύηση
O75.3	Άλλη λοίμωξη κατά τη διάρκεια του τοκετού
O85	Επιλόχειος πυρετός

Ουδετεροπενία (ακοκκιοκυτταραιμία)

Η σηψαιμία σε ουδετεροπενικούς ασθενείς πρέπει να κωδικοποιείται με την ακόλουθη σειρά καταχώρισης:

1. Ένας κωδικός για τη «σηψαιμία»
2. Ένας κωδικός της κατηγορίας D70.– Ακοκκιοκυτταραιμία και ουδετεροπενία

Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS]

Για την κωδικοποίηση του SIRS διατίθενται οι ακόλουθοι κωδικοί του ICD-10-GrM:

R65.0! Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS], λοιμώδους προέλευσης, χωρίς επιπλοκές οργάνων
 Σήψη χωρίς επιπλοκές οργάνων.
 Σήψη MKA.
 SIRS λοιμώδους αιτιολογίας MKA.

R65.1! *Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS], λοιμώδους προέλευσης, με επιπλοκές οργάνων*

*Βαριά σήψη
Σήψη με επιπλοκές οργάνων*

R65.2! *Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS], μη λοιμώδους προέλευσης, χωρίς επιπλοκές οργάνων
SIRS μη λοιμώδους αιτιολογίας ΜΚΑ*

R65.3! *Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS], μη λοιμώδους προέλευσης, με επιπλοκές οργάνων*

R65.9! *Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS], μη καθορισμένο*

Πρώτα πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός για τη σηψαιμία ή το υποκείμενο νόσημα που προκαλεί SIRS μη λοιμώδους αιτιολογίας και μετά να ακολουθεί ένας κωδικός της κατηγορίας R65.—! *Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS].* Για την κωδικοποίηση συστηματικών επιπλοκών, παθογόνων μικροοργανισμών και πιθανής αντοχής αυτών, πρέπει να χρησιμοποιούνται πρόσθετοι κωδικοί.

0103

2 ΝΕΟΠΛΑΣΜΑΤΑ

0201 Επιλογή και σειρά καταχώρισης των κωδικών

Διαγνώσεις

Η σειρά με την οποία καταχωρίζονται οι κωδικοί εξαρτάται από τη θεραπευτική αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης νοσηλείας.

Αν ο ασθενής εισάγεται για διαγνωστική διερεύνηση ή θεραπευτική αντιμετώπιση του πρωτοπαθούς κακοήθους νεοπλασματος, πρέπει να καταχωρίζεται το πρωτοπαθές κακόηθες νεόπλασμα ως κύρια διάγνωση.

Παράδειγμα 1

Ασθενής εισάγεται για θεραπευτική αντιμετώπιση κακοήθους όγκου του μετωπιαίου λοβού του εγκεφάλου.

Κύρια διάγνωση: C71.1 Κακόηθες νεόπλασμα: Μετωπιαίου λοβού

Ο κωδικός του κακοήθους νεοπλασματος πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση σε κάθε νοσηλεία για τη θεραπευτική αντιμετώπισή του, για τις απαιτούμενες συμπληρωματικές θεραπείες, (π.χ. επεμβάσεις, χημειο-/ακτινοθεραπεία, άλλη θεραπευτική αγωγή) (βλέπε παράδειγμα 2) και για τη διαγνωστική διερεύνηση (π.χ. σταδιοποίηση, staging) (βλέπε παράδειγμα 3) μέχρι να ολοκληρωθεί οριστικά η θεραπευτική αντιμετώπιση. Αυτό αφορά και νοσηλείες π.χ. που ακολουθούν τη χειρουργική εξαίρεση του κακοήθους νεοπλασματος, καθώς η αιτία νοσηλείας του ασθενούς παραμένει το κακόηθες νεόπλασμα, ακόμα και αν αυτό έχει χειρουργικά εξαιρεθεί. Αν η αιτία εισαγωγής δεν είναι ούτε η κακοήθης εξεργασία ούτε ή χημειο-/ακτινοθεραπεία, τότε πρέπει να επιλεγθεί η κύρια διάγνωση βάσει της ΕΚΟΚ D002 Κύρια διάγνωση (σελίδα 4).

Παράδειγμα 2

Μία ασθενής που έχει υποστεί μαστεκτομή για καρκίνο μαστού (άνω έξω τεταρτημόριο) επανεισάγεται για τριήμερη ακτινοθεραπεία.

Κύρια διάγνωση: C50.4 Κακόηθες νεόπλασμα: Άνω-έξω τεταρτημορίου του μαστού

Παράδειγμα 3

Ασθενής εισάγεται για σταδιοποίηση (staging) νόσου Hodgkin (λεμφοκυτταρικός, κλασικός τύπος) μετά από προηγηθείσα χημειοθεραπεία.

Κύρια διάγνωση: C81.4 Λέμφωμα Hodgkin - λεμφοκυτταρικός (τύπος)

0201

Επίσης αν απαιτούνται πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις σε διαφορετικούς χρόνους για τη θεραπευτική αντιμετώπιση ενός κακοήθους νεοπλασματος ή μεταστάσεων, πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός του κακοήθους νεοπλασματος ή των μεταστάσεων ως κύρια διάγνωση σε κάθε νοσηλεία κατά την οποία διενεργείται μια συμπληρωματική χειρουργική επέμβαση. Αυτό συμβαίνει γιατί, παρόλο που το κακόηθες νεόπλασμα ή οι μεταστάσεις πιθανότατα εξαιρέθηκαν κατά την αρχική επέμβαση, **ο ασθενής νοσηλεύεται όπως και προηγουμένως εξαιτίας του κακοήθους νεοπλασματος ή των μεταστάσεων**. Δηλαδή το κακόηθες νεόπλασμα ή οι μεταστάσεις αποτελούν την αιτία των συμπληρωματικών επεμβάσεων.

Σε περίπτωση που η εισαγωγή του ασθενούς πραγματοποιείται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση μεταστάσεων, πρέπει να καταχωρίζονται οι μεταστάσεις ως κύρια διάγνωση και επιπλέον μία δευτερεύουσα διάγνωση για τον πρωτοπαθή όγκο, εφόσον αυτός είναι γνωστός. (βλέπε παράδειγμα 4). Το πρωτοπαθές κακόηθες νεόπλασμα θα αποτελέσει δευτερεύουσα διάγνωση αρκετά χρόνια μετά την εξαίρεση του, καθώς, έως τότε, ο ασθενής θεραπεύεται γι αυτό. Σε πρωτοπαθή όγκο άγνωστης εντόπισης, καταχωρίζεται ένας κωδικός της κατηγορίας C80.– *Κακόηθες νεόπλασμα καθορισμένο ως άγνωστης πρωτοπαθούς εντόπισης.*

Παράδειγμα 4

Ασθενής εισάγεται για χειρουργική εξαίρεση ηπατικών μεταστάσεων. Προ τριμήνου είχε υποβληθεί σε χειρουργική εκτομή καρκινώματος του εγκάρσιου κόλου.

Κύρια διάγνωση:	C78.7	<i>Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος και της ενδοηπατικής χοληφόρας οδού</i>
Δευτερεύουσα διάγνωση:	C18.4	<i>Κακόηθες νεόπλασμα: Εγκάρσιου κόλου</i>

Σε περίπτωση που ο ασθενής εισάγεται κυρίως για συστηματική χημειοθεραπεία, «συστηματική» ακτινοθεραπεία (βλέπε πίνακα 1) ή θεραπεία του πρωτοπαθούς όγκου ή των μεταστάσεων με αντισώματα και κυτοκίνες (βλέπε πίνακα 1) πρέπει να καταχωρίζεται ο πρωτοπαθής όγκος ως κύρια διάγνωση.

Πίνακας 1: Ιατρικές πράξεις σχετικά με συστηματική ακτινοθεραπεία και θεραπεία με αντισώματα και κυτοκίνες

552.03.04	<i>Ολοσωματική ακτινοθεραπεία</i>
553.00.02	<i>Θεραπεία των αιμοποιητικών οργάνων με ραδιοϊσότοπα</i>
553.00.05	<i>Άλλη συστηματική θεραπεία με ραδιοϊσότοπα</i>
553.00.06	<i>Ενδοφλέβια μοριακή στοχευμένη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα</i>
553.00.07	<i>Ενδοφλέβια θεραπεία με ραδιενεργά επισημασμένα αντισώματα</i>
553.00.09	<i>Ενδοφλέβια θεραπεία με ραδιενεργά επισημασμένες μεταβολικές ουσίες</i>
553.01	<i>Ακτινοθεραπεία με ιώδιο</i>
554.07.00	<i>Άλλη ανοσοθεραπεία: Με μη τροποποιημένα αντισώματα</i>
554.07.01	<i>Άλλη ανοσοθεραπεία: Με τροποποιημένα αντισώματα</i>
554.07.02	<i>Άλλη ανοσοθεραπεία: Με ανοσοτροποποιητικά φάρμακα</i>

Σε περίπτωση που ο ασθενής εισάγεται για συστηματική χημειοθεραπεία και, κατ' εξαίρεση, δεν είναι γνωστή η προέλευση του πρωτοπαθούς όγκου, πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση ένας κωδικός της κατηγορίας C80.— Κακόηθες νεόπλασμα χωρίς καθορισμένη εντόπιση.

Παράδειγμα 5

Ασθενής με καρκίνο του προστάτη εισάγεται στο τμήμα ημερήσιας νοσηλείας για χημειοθεραπεία. Εφαρμόζεται ένα απλό χημειοθεραπευτικό σχήμα. Ο ασθενής εξέρχεται την ίδια ημέρα.

Κύρια διάγνωση: C61 Κακόηθες νεόπλασμα του προστάτη
 Ιατρική πράξη: 554.02 Απλή χημειοθεραπεία

Παράδειγμα 6

Ασθενής εισάγεται για συστηματική χημειοθεραπεία ηπατικών μεταστάσεων. Προ τριμήνου είχε υποβληθεί σε χειρουργική εκτομή καρκινώματος του εγκάρσιου κόλου.

Κύρια διάγνωση: C18.4 Κακόηθες νεόπλασμα: Εγκάρσιου κόλου
 Δευτερεύουσα διάγνωση: C78.7 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του ήπατος και της ενδοηπατικής χοληφόρας οδού

Σε περίπτωση που ο ασθενής εισάγεται για περιοχική χημειοθεραπεία ή περιοχική ακτινοθεραπεία των μεταστάσεων, πρέπει να καταχωρίζονται οι μεταστάσεις ως κύρια διάγνωση και ο πρωτοπαθής όγκος ως δευτερεύουσα (βλέπε κωδικοποίηση στο 4^ο παράδειγμα).

0201

Σε περίπτωση που ο ασθενής εισάγεται για αντιμετώπιση τόσο του πρωτοπαθούς όγκου, όσο και των μεταστάσεων, πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση η διάγνωση για την οποία καταναλώθηκαν οι περισσότεροι πόροι, σύμφωνα με την ΕΚΟΚ D002 *Κύρια διάγνωση* (σελίδα 4) (δύο ή περισσότερες διαγνώσεις που αντιστοιχούν εξίσου στον ορισμό της κύριας διάγνωσης).

Παράδειγμα 7

Ασθενής εισάγεται εξαιτίας υπερηχογραφικής υποψίας ηπατικών μεταστάσεων, για ανεύρεση του πρωτοπαθούς όγκου και περαιτέρω διερεύνηση. Προκύπτει καρκίνωμα παχέος εντέρου με ηπατικές μεταστάσεις. Διενεργείται ημικολεκτομή με μερική ηπατεκτομή.

Κύρια διάγνωση:

Εναπόκειται στην κρίση του θεράποντα ιατρού

Δευτερεύουσα διάγνωση:

Όταν εισάγεται ένας ασθενής με συμπτωματολογία γνωστού, κατά τη στιγμή της εισαγωγής, νοσήματος, τότε η συμπτωματολογία πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση, εφόσον αντιμετωπίζεται μόνο αυτή θεραπευτικά. Το υποκείμενο νόσημα πρέπει να καταχωρίζεται ως δευτερεύουσα διάγνωση.

Παράδειγμα 8

Ασθενής, στον οποίον είχε διαγνωστεί προ τριμήνου ευμεγέθους επικαλύπτων κακόηθους όγκος εγκεφάλου, εισάγεται λόγω υποτροπιάζουσων επιληπτικών κρίσεων. Αντιμετωπίζονται μόνο οι επιληπτικές κρίσεις.

Κύρια διάγνωση:

R56.8

Άλλοι και μη καθορισμένοι σπασμοί

Δευτερεύουσα διάγνωση:

C71.8

Κακόηθες νεόπλασμα: Επικαλύπτουσα αλλοίωση του εγκεφάλου

Υποτροπή πρωτοπαθούς κακόηθους νεοπλάσματος

Η υποτροπή πρωτοπαθούς κακόηθους νεοπλάσματος οργάνου ή ιστού, που είχε πλήρως εξαιρεθεί, πρέπει να κωδικοποιείται όπως ο πρωτοπαθής όγκος του συγκεκριμένου οργάνου ή ιστού. Δηλαδή η υποτροπή πρέπει να κωδικοποιείται ως πρωτοπαθής όγκος.

Παράδειγμα 9

Ασθενής εισάγεται λόγω υποτροπής καρκινώματος του σώματος του στομάχου, που είχε εξαιρεθεί χειρουργικά προ διετίας.

Κύρια διάγνωση:

C16.2

Κακόηθες νεόπλασμα: Σώματος του στομάχου

Εκτεταμένος καθαρισμός της περιοχής του νεοπλάσματος

Σε περίπτωση εισαγωγής του ασθενούς για εκτεταμένο χειρουργικό καθαρισμό της ανατομικής περιοχής ενός νεοπλάσματος, που είχε εξαιρεθεί στο παρελθόν, πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός του νεοπλάσματος, ακόμα και αν κατά την ιστοπαθολογική εξέταση δεν βρεθεί υπολειπόμενος όγκος.

Στοιχεία κακόηθους νεοπλάσματος μόνο από τη βιοψία

Όταν από το αποτέλεσμα της αρχικής βιοψίας προκύπτει κακόηθες νεόπλασμα, αλλά στο παθολογοανατομικό παρασκεύασμα της χειρουργικής επέμβασης δεν ανευρίσκονται κακόηθη κύτταρα, πρέπει να κωδικοποιείται η διάγνωση, που προέκυψε από την αρχική βιοψία.

0206 Γειτνιάζουσες περιοχές

Γνωστή πρωτοπαθής εστία

Εφόσον ένα νεόπλασμα γνωστής πρωτοπαθούς εστίας επεκτείνεται σε ένα γειτνιάζον όργανο ή μια γειτνιάζουσα ανατομική περιοχή (π.χ. από τον έντερο στην ουροδόχο κύστη ή από τη νήσιδα στον ειλεό), πρέπει να κωδικοποιείται μόνο η πρωτοπαθής εστία. Η επέκταση στη γειτνιάζουσα περιοχή δεν κωδικοποιείται.

Παράδειγμα 1

Μια ασθενής με καρκίνωμα του εξωτραχήλου που επεκτείνεται στον κόλπο εισάγεται για χειρουργική επέμβαση.

Κύρια διάγνωση: C53.1 Κακόηθες νεόπλασμα: Εξωτραχήλου

Άγνωστη πρωτοπαθής εστία

Ένα νεόπλασμα άγνωστης πρωτοπαθούς εστίας, που επεκτείνεται σε δύο ή περισσότερες επικαλυπτόμενες ανατομικά περιοχές εντός μίας ICD- κατηγορίας τριών χαρακτήρων, πρέπει να κωδικοποιείται με το 8 στον τρίτο χαρακτήρα («επικαλύπτουσα αλλοίωση») (βλέπε επίσης ICD-10-GrM σημείωση Κεφαλαίου II). Αυτό ισχύει υπό την προϋπόθεση, ότι δεν υπάρχει άλλος κωδικός που να περιγράφει το συγκεκριμένο συνδυασμό των ανατομικών περιοχών, όπως π.χ. ο C16.0 Κακόηθες νεόπλασμα: Καρδίας του στομάχου (οισοφάγος και στομάχι).

Παράδειγμα 2

Μια ασθενής εισάγεται για χειρουργική εξαίρεση καρκινώματος του έσω- και εξωτραχήλου.

Κύρια διάγνωση: C53.8 Κακόηθες νεόπλασμα: Επικαλύπτουσα αλλοίωση του τραχήλου της μήτρας

0208

Για συγκεκριμένα κακοήθη νεοπλάσματα μη καθορισμένης προέλευσης, που επεκτείνονται σε δύο ή περισσότερες επικαλυπτόμενες ανατομικές περιοχές διαφορετικών ICD- κατηγοριών τριών χαρακτήρων διατίθενται στο ICD-10-GM συγκεκριμένοι κωδικοί.

Παράδειγμα 3

Μια ασθενής με καρκίνωμα του τραχήλου και του κόλπου εισάγεται για πολυήμερη ακτινοθεραπεία. Δεν κατέστη δυνατή η εντόπιση της προέλευσης του όγκου.

Κύρια διάγνωση: C57.8 *Κακόηθες νεόπλασμα: Επικαλύπτουσα αλλοίωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων*

Παρατήρηση: Σε αυτήν την περίπτωση πρόκειται για καρκίνωμα του τραχήλου (C53.) και καρκίνωμα του κόλπου (C52). Εφόσον δεν μπορεί να προσδιοριστεί η προέλευση και το νεόπλασμα επεκτείνεται σε δύο ή περισσότερες ανατομικές περιοχές διαφορετικών ICD- κατηγοριών τριών χαρακτήρων πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός:

C57.8 *Κακόηθες νεόπλασμα: Επικαλύπτουσα αλλοίωση των γυναικείων γεννητικών οργάνων*

Ασαφής/μη καθορισμένη εστία

Για ένα κακόηθες νεόπλασμα, άγνωστης προέλευσης που επεκτείνεται σε γειτνιάζουσες περιοχές (επικαλύπτουσα αλλοίωση) και έχει ασαφή εστία ή εστία που δεν ταξινομείται αλλού, διατίθενται οι κωδικοί της κατηγορίας:

C76.– *Κακόηθες νεόπλασμα άλλων και ασαφώς καθοριζόμενων εντοπίσεων*

Παρατήρηση: Η χρήση αυτού του κωδικού επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία σχετικά με τον τύπο του νεοπλάσματος (π.χ. κακόηθες νεόπλασμα του θώρακα).

0208 Ύφεση συμπτωμάτων σε περίπτωση κακοήθους ανοσοϋπερπλαστικού νοσήματος και λευχαιμίας

Για τους κωδικούς των κατηγοριών

C88.– *Κακοήθη ανοσοϋπερπλαστικά νοσήματα,*

C90.– *Πολλαπλούν μυέλωμα και κακοήθη πλασματοκυτταρικά νεοπλάσματα και*

C91–C95 *Λευχαιμία*

διατίθενται σε σχέση με την ύφεση της νόσου οι 5^{οι} χαρακτήρες

0 *χωρίς να αναφέρεται πλήρης ύφεση* ή

1 *σε πλήρη ύφεση*

Σε αυτό το σημείο πρέπει να δίνεται προσοχή. Ο 5^{ος} χαρακτήρας:

- 0** χωρίς να αναφέρεται πλήρης ύφεση
χωρίς να αναφέρεται ύφεση
σε μερική ύφεση
καταχωρίζεται,
- όταν πρόκειται για την πρώτη εκδήλωση και την αρχική διάγνωση της νόσου,
- όταν **δεν υπάρχει** ύφεση ή όταν παρόλη την υποχώρηση της κλινικής εικόνας η πάθηση υφίσταται όπως και πριν (**μερική ύφεση**),
ή
- όταν δεν είναι γνωστή η κατάσταση της ύφεσης.

- 1** σε πλήρη ύφεση
καταχωρίζεται,
όταν πρόκειται για **πλήρη** ύφεση, δηλαδή **δεν υπάρχουν ευρήματα ή συμπτώματα της κακοήθους νεοπλασίας.**

Για την κωδικοποίηση γνωστού από το ατομικό ιστορικό του ασθενούς κακοήθους νεοπλάσματος βλέπε ΕΚΟΚ 0209 *Ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος.*

Για τις λευχαιμίες που είναι ανθεκτικές στην τυποποιημένη θεραπεία εφόδου [induction therapy], πρέπει να καταχωρίζεται μαζί με τους κωδικούς C91–C95, και ο πρόσθετος κωδικός:

C95.8! *Λευχαιμία, ανθεκτική στην τυποποιημένη θεραπεία εφόδου [induction therapy]*

0209 Ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος

Κακοήθες νεόπλασμα από το ατομικό αναμνηστικό

Ένας κωδικός ιστορικού κακοήθους νεοπλάσματος μπορεί να καταχωριστεί μόνο εφόσον έχει ιαθεί το νεόπλασμα. Η φύση κάθε νεοπλάσματος καθορίζει τότε αυτό θεωρείται ιαθέν. Επειδή αυτή η διαπίστωση μπορεί να γίνει μόνο αναδρομικά, η τελική απόφαση λαμβάνεται κυρίως με «κλινικά» κριτήρια. Δηλαδή έχει μεγαλύτερη σημασία αν έχει ολοκληρωθεί η θεραπευτική αντιμετώπιση του νεοπλάσματος, παρά εάν έχει παρέλθει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα από τη διάγνωση του.

Στις περιπτώσεις όπου η θεραπευτική αντιμετώπιση του κακοήθους νεοπλάσματος έχει ολοκληρωθεί οριστικά, πρέπει να καταχωρίζεται, ως **δευτερεύουσα διάγνωση**, ένας κωδικός της κατηγορίας

Z85.– *Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλάσματος*

εφόσον το νεόπλασμα επιβαρύνει το κόστος νοσηλείας (βλέπε επίσης ΕΚΟΚ D003 *Δευτερεύουσες διαγνώσεις* (σελίδα 10)).

Σε περίπτωση που η αρχική θεραπεία είχε θεωρηθεί ολοκληρωμένη, ο ασθενής παρέμεινε χωρίς θεραπεία για κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά τελικά εμφανίστηκαν

0212

μεταστάσεις από το πρωτοπαθές νεόπλασμα, δεν μπορούν να καταχωριστούν οι κωδικοί της κατηγορίας Z85.-.

Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] ασθενών με ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος

Οι κωδικοί της κατηγορίας:

Z08.- *Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά την θεραπεία για κακοήγη νεοπλάσματα*

χρησιμοποιούνται ως κύρια διάγνωση, μόνο εφόσον ο ασθενής εισάγεται για τακτική επανεξέταση ενός κακοήθους νεοπλασματος και δεν υπάρχουν ευρήματα υπολειπόμενου νεοπλασματος. Ως δευτερεύουσα διάγνωση πρέπει να καταχωρίζεται ο αντίστοιχος κωδικός από την κατηγορία Z85.- *Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος*.

Παράδειγμα 1

Ασθενής εισάγεται για τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από καρκίνωμα ουροδόχου κύστης (πλαγίου τοιχώματος) που είχε αντιμετωπιστεί με ακτινοθεραπεία. Δεν ανευρίσκεται υποτροπή του κακοήθους νεοπλασματος.

Κύρια διάγνωση:	Z08.1	<i>Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από ακτινοθεραπεία για κακοήθες νεόπλασμα</i>
Δευτερεύουσα διάγνωση:	Z85.5	<i>Ατομικό ιστορικό κακοήθους νεοπλασματος της ουροποιητικής οδού</i>
Ιατρική πράξη:	166.01	<i>Διαγνωστική ουρηθροκυστεοσκόπηση</i>

0212 Έγχυση κυτταροτοξικών ουσιών στην ουροδόχο κύστη

Διαγνώσεις

Σε ασθενείς που εισάγονται για έγχυση κυτταροτοξικών ουσιών ή BCG (Bacillus Calmette-Guérin) στην ουροδόχο κύστη, καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση το νεόπλασμα, για την αντιμετώπιση του οποίου γίνεται η έγχυση.

Ο κωδικός Z51.1 *Συνεδρία χημειοθεραπείας για νεόπλασμα* δεν πρέπει να καταχωρίζεται.

Ιατρικές πράξεις

Ο κωδικός της ΕΤΙΠ:

554.01.04 *Έγχυση και τοπική θεραπεία με κυτταροστατικά και ανοσοτροποποιητικά φάρμακα: Στην ουροδόχο κύστη*

πρέπει να καταχωρίζεται μόνο μια φορά ανά νοσηλεία.

0214 Λεμφαγγειακή καρκινωμάτωση

Η λεμφαγγειακή καρκινωμάτωση πρέπει να κωδικοποιείται ως μεταστατική νόσος (μετάσταση) (βλέπε επίσης, ΕΚΟΚ 0201 *Επιλογή και σειρά καταχώρισης των κωδικών* (σελίδα 75)).

Η λεμφαγγειακή καρκινωμάτωση π.χ. του υπεζωκότα πρέπει να καταχωρίζεται με τον κωδικό:

C78.2 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του υπεζωκότα

0215 Λέμφωμα

Λεμφώματα που θεωρούνται «εξωλεμφαδενικά» ή που εντοπίζονται σε άλλες θέσεις εκτός των λεμφαδένων (π.χ. λέμφωμα MALT στομάχου), πρέπει να καταχωρίζονται με τους κωδικούς των κατηγοριών C81 έως C88.

Ένα λέμφωμα δεν θεωρείται μεταστατικό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προσβεβλημένων εντοπίσεων.

Στα λεμφώματα δεν επιτρέπεται να καταχωρίζονται οι ακόλουθοι κωδικοί:

C77.– Δευτεροπαθές και μη καθορισμένο κακόηθες νεόπλασμα των λεμφαδένων

C78.– Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα οργάνων του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος

C79.0 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του νεφρού και της νεφρικής πυέλου

C79.1 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης και άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος

C79.2 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του δέρματος

C79.4 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του νευρικού συστήματος

C79.6 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα της ωοθήκης

C79.7 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του επινεφριδίου

C79.8- Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα άλλων καθορισμένων εντοπίσεων

C79.9 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα μη καθορισμένης εντόπισης

Για την κωδικοποίηση οστικής συμμετοχής σε λεμφώματα, πρέπει να καταχωρίζεται ο ακόλουθος κωδικός:

C79.5 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα των οστών και του μυελού των οστών Προσβολή του νωτιαίου μυελού σε κακόηθη λεμφώματα (καταστάσεις που ταξινομούνται με τους κωδικούς C81-C88).

Για την κωδικοποίηση προσβολής των μηνίγγων ή του εγκεφάλου σε νεοπλασίες του λεμφικού, αιμοποιητικού ή συναφούς ιστού, πρέπει να χρησιμοποιείται ο πρόσθετος κωδικός:

C79.3 Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα του εγκεφάλου και των εγκεφαλικών μηνίγγων.

0215

3 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΙΜΑΤΟΣ, ΤΩΝ ΑΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΜΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν προς το παρόν ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης για το κεφάλαιο 3.

4 ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΑ, ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

0401 Σακχαρώδης διαβήτης

Τύποι σακχαρώδη διαβήτη

Οι διάφοροι τύποι του σακχαρώδη διαβήτη ταξινομούνται στο ICD-10-GrM, ως ακολούθως:

- E10.– *Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1]*
- E11.– *Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 2]*
- E12.– *Σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό*
- E13.– *Άλλες μορφές σακχαρώδους διαβήτη*
- E14.– *Μη καθορισμένος σακχαρώδης διαβήτης*
- O24.0 - O24.3 *Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση: Προϋπάρχων σακχαρώδης διαβήτης*
- O24.4 *Σακχαρώδης διαβήτης που εμφανίζεται κατά τη διάρκεια της κύησης*
- P70.0 *Σύνδρομο θρέφους της μητέρας με διαβήτη της κύησης*
- P70.1 *Σύνδρομο θρέφους διαβητικής μητέρας*
- P70.2 *Νεογνικός σακχαρώδης διαβήτης*
- R73.0 *Παθολογική δοκιμασία ανοχής γλυκόζης*

Παρατήρηση: Η θεραπευτική αγωγή με τη χρήση ινσουλίνης δεν υποδηλώνει τον τύπο του διαβήτη και δεν αποδεικνύει ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη.

Οι κατηγορίες E10–E14

Στον 4^ο χαρακτήρα των κωδικών E10-E14, κωδικοποιούνται πιθανές επιπλοκές του σακχαρώδους διαβήτη (π.χ. κώμα, νεφρικές επιπλοκές).

Στον 5^ο χαρακτήρα κωδικοποιούνται:

- 0 μη καθορισμένος ως απορρυθμισμένος,
- 1 καθορισμένος ως απορρυθμισμένος,
- 2 με άλλες πολλαπλές επιπλοκές, μη καθορισμένος ως απορρυθμισμένος,
- 3 με άλλες πολλαπλές επιπλοκές, καθορισμένος ως απορρυθμισμένος,
- 4 με διαβητικό πόδι, μη καθορισμένος ως απορρυθμισμένος ή
- 5 με διαβητικό πόδι, καθορισμένος ως απορρυθμισμένος.

0401

Οι 5^{οι} χαρακτήρες 0 και 1 χρησιμοποιούνται με τους 4^{ους} χαρακτήρες «2-6», «8» και «9». Οι 5^{οι} χαρακτήρες «2-5» συνδυάζονται αποκλειστικά με το «7» στον 4^ο χαρακτήρα. Εδώ πρέπει να λαμβάνεται υπόψη το γεγονός ότι δεν είναι ιατρικώς δόκιμοι όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί 4^{ων} και 5^{ων} χαρακτήρων.

Σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό

Ο σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό εμφανίζεται κυρίως σε ασθενείς αναπτυσσόμενων κρατών. Εκδηλώνεται με ή χωρίς εμφανή στοιχεία παγκρεατικής νόσου και είναι κυρίως μια κλινική διάγνωση. Ο σακχαρώδης διαβήτης στο πλαίσιο μεταβολικού συνδρόμου δεν πρέπει να κωδικοποιείται με αυτόν τον κωδικό.

Σακχαρώδης διαβήτης μετά από ιατρική επέμβαση

Στην περίπτωση σακχαρώδους διαβήτη μετά από ιατρική επέμβαση πρέπει να καταχωρίζεται αρχικά ένας κωδικός από τους:

E13.- Άλλες μορφές σακχαρώδους διαβήτη
Περιλαμβ.: σακχαρώδης διαβήτης σε θλάξη ή αφαίρεση του παγκρέατος

ακολουθούμενος από τον κωδικό:

E89.1 Υποϊνσουλιναίμια μετά από ιατρική επέμβαση.

Απορρυθμισμένος σακχαρώδης διαβήτης

Η τιμή του σακχάρου αίματος κατά τη στιγμή της εισαγωγής του ασθενούς δεν αποτελεί ένδειξη για τον χαρακτηρισμό του διαβήτη ως «απορρυθμισμένου» ούτε για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, ούτε για τον τύπου 2. Η καταχώριση ως «απορρυθμισμένου» ή «μη απορρυθμισμένου» στηρίζεται στην κλινική πορεία του ασθενούς (αναδρομικά). Ο όρος «απορρυθμισμένος» αναφέρεται στη μεταβολική κατάσταση.

Παράδειγμα 1

Ασθενής με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 εισάγεται λόγω σοβαρής μεταβολικής απορρύθμισης. Δεν παρατηρούνται επιπλοκές.

Κύρια διάγνωση: E10.91 *Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1]: χωρίς επιπλοκές: καθορισμένος ως απορρυθμισμένος*

Δευτερεύουσα διάγνωση: Καμία

Κύρια διάγνωση σε περίπτωση σακχαρώδους διαβήτη με επιπλοκές

Σε περίπτωση συνύπαρξης κάποιου τύπου σακχαρώδους διαβήτη, που κωδικοποιείται με έναν από τους κωδικούς E10.- έως E14.-, και επιπλοκών αυτού, πρέπει να διαπιστωθεί αν ο κύριος λόγος της νοσηλείας είναι:

- η θεραπευτική αντιμετώπιση της βασικής νόσου, του σακχαρώδη διαβήτη, ή
- η θεραπευτική αντιμετώπιση μιας ή περισσότερων επιπλοκών

προκειμένου να γίνει ορθή κωδικοποίηση. Επιπλέον έχει σημασία για την ορθή κωδικοποίηση ο αριθμός των επιπλοκών του σακχαρώδη διαβήτη και αν αυτές πληρούν τα κριτήρια ορισμού της δευτερεύουσας διάγνωσης.

Εφόσον αντιμετωπίζεται η βασική νόσος, δηλαδή ο σακχαρώδης διαβήτης, και συνυπάρχει μόνο μία επιπλοκή (κλινική εκδήλωση), πρέπει να καταχωρίζεται ένας από τους κωδικούς E10–E14, με το «6» στον 4^ο χαρακτήρα (βλέπε παράδειγμα 2) (βλέπε επίσης «σακχαρώδης διαβήτης ως δευτερεύουσα διάγνωση» στη σελίδα 92). Επιπλέον, πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός για την επιπλοκή, εφόσον αυτή πληροί τα κριτήρια ορισμού της δευτερεύουσας διάγνωσης (βλέπε παράδειγμα 3).

Παράδειγμα 2

Ασθενής με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 εισάγεται λόγω σοβαρής μεταβολικής απορρύθμισης. Από το ατομικό αναμνηστικό αναφέρεται διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια ως μοναδική επιπλοκή, η οποία δεν επιβαρύνει το κόστος νοσηλείας.

Κύρια διάγνωση: E10.61 *Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1]: με άλλες καθορισμένες επιπλοκές: καθορισμένος ως απορρυθμισμένος*

Δευτερεύουσα διάγνωση: Καμία

Με αυτήν την κωδικοποίηση γίνεται εμφανές ότι μια γνωστή επιπλοκή (κλινική εκδήλωση) του σακχαρώδη διαβήτη που δεν χρήζει αντιμετώπισης και δεν πληροί τα κριτήρια της δευτερεύουσας διάγνωσης, δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

Παράδειγμα 3

Ασθενής με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 εισάγεται λόγω σοβαρής μεταβολικής απορρύθμισης. Επιπλέον συνυπάρχει διαβητική νεφροπάθεια ως επιπλοκή, η οποία επίσης αντιμετωπίζεται θεραπευτικά.

Κύρια διάγνωση: E10.61+ *Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1]: με άλλες καθορισμένες επιπλοκές: καθορισμένος ως απορρυθμισμένος*

Δευτερεύουσα διάγνωση: N08.3* *Σπειραματικές διαταραχές στον σακχαρώδη διαβήτη*

Παρατήρηση: Ο κωδικός E10.61 είναι κωδικός που αποδίδει την αιτιολογία, για τον κωδικό με τον αστερίσκο N08.3* (κλινική εκδήλωση) και επομένως συμβολίζεται με το σύμβολο του σταυρού (+).

Σημείωση: Σε αυτήν την περίπτωση, για να επιτευχθεί ορθή ομαδοποίηση στο σύστημα DRG, επιλέγεται για τον κωδικό του σακχαρώδη διαβήτη το «6» αντί του «2» στον 4^ο χαρακτήρα, ώστε να διαχωριστεί η θεραπευτική αντιμετώπιση της απορρύθμισης του

0401

σακχαρώδη διαβήτη από τη θεραπευτική αντιμετώπιση της επιπλοκής (κλινικής εκδηλώσης) (βλέπε επίσης παράδειγμα 6). Αυτή η οδηγία κωδικοποίησης αποτελεί έτσι μια εξαίρεση στους κανόνες κωδικοποίησης του σακχαρώδη διαβήτη του ICD-10-GrM.

Εφόσον αντιμετωπίζεται θεραπευτικά η βασική νόσος, δηλαδή ο σακχαρώδης διαβήτης, και συνυπάρχουν πολλαπλές επιπλοκές (κλινικές εκδηλώσεις) αυτού, χωρίς αυτές να αποτελούν το κύριο αντικείμενο της θεραπευτικής αντιμετώπισης, πρέπει να καταχωρίζεται ένας από τους κωδικούς E10–E14, με το «7» στον 4^ο χαρακτήρα. Επιπρόσθετα, πρέπει να καταχωρίζονται οι κωδικοί για τις επιμέρους επιπλοκές, εφόσον αυτές πληρούν τα κριτήρια της δευτερεύουσας διάγνωσης.

Παράδειγμα 4

Ασθενής με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 με πολλαπλές επιπλοκές όπως αθηροσκλήρωση αρτηριών των άκρων, αμφιβληστροειδοπάθεια και νεφροπάθεια εισάγεται λόγω σοβαρής μεταβολικής απορρύθμισης. Επιπρόσθετα αντιμετωπίζονται όλες οι συνυπάρχουσες επιπλοκές.

Κύρια διάγνωση:	E10.73+	<i>Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1]: με πολλαπλές επιπλοκές: με άλλες πολλαπλές επιπλοκές, καθορισμένος ως απορρυθμισμένος</i>
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	I79.2*	<i>Περιφερική αγγειοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού</i>
	H36.0*	<i>Διαθητική αμφιβληστροειδοπάθεια</i>
	N08.3*	<i>Σπειραματικές διαταραχές στον σακχαρώδη διαβήτη</i>

Παρατήρηση: Ο κωδικός E10.73 είναι ένας κωδικός που αποδίδει την αιτιολογία και επομένως επισημαίνεται με το σύμβολο του σταυρού (+). Αυτός ο «αιτιολογικός κωδικός» χρησιμοποιείται για όλους τους ακόλουθους κωδικούς με αστερίσκο (κωδικοί κλινικών εκδηλώσεων), έως ότου εμφανιστεί ένας νέος κωδικός με σταυρό ή χωρίς σήμανση. Έτσι, με τον κωδικό E10.73+ κωδικοποιείται η αιτιολογία των κλινικών εκδηλώσεων I79.2*, H36.0* και N08.3*.

Αν παρουσιάζονται επιπλοκές (κλινικές εκδηλώσεις) του σακχαρώδη διαβήτη, αλλά μόνο μία από αυτές αποτελεί το κύριο αντικείμενο της θεραπευτικής αντιμετώπισης, πρέπει να καταχωρίζεται ένας από τους κωδικούς E10-E14, με τον 4^ο χαρακτήρα να αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη επιπλοκή. Οι κωδικοί των υπόλοιπων κλινικών εκδηλώσεων πρέπει να καταχωρίζονται μόνο εφόσον πληρούν τα κριτήρια του ορισμού της δευτερεύουσας διάγνωσης.

Παράδειγμα 5

Ασθενής με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 με χρόνια προοδευτική διαβητική αγγειοπάθεια αρτηριών των κάτω άκρων, με άλγος στην ηρεμία, εισάγεται για χειρουργική επέμβαση bypass (με αλλογενές πλαστικό μόσχευμα). Επιπρόσθετα αντιμετωπίζεται η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια από την οποία πάσχει, με σοβαρό περιορισμό της οπτικής οξύτητας.

Κύρια διάγνωση:	E10.50+	<i>Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1]: με επιπλοκές από τα περιφερικά αγγεία: μη καθορισμένος ως απορρυθμισμένος</i>
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	I79.2*	<i>Περιφερική αγγειοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού</i>
	I70.22	<i>Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με άλγος ηρεμίας</i>
	E10.30+	<i>Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1]: με οφθαλμικές επιπλοκές: μη καθορισμένος ως απορρυθμισμένος</i>
	H36.0*	<i>Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια</i>
Ιατρικές πράξεις:	339.03.04.02	<i>Διενέργεια άλλης αγγειακής επικοινωνίας και παράκαμψης: Λαγόνιος αρτηρία και σπλαγγνικές αρτηρίες: Λαγονομηριαία</i>
	393.00.04	<i>Είδος μοσχεύματος: Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό)</i>

Σημείωση: Ο κωδικός I70.22 *Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με άλγος ηρεμίας* χρησιμοποιείται σε αυτό το παράδειγμα για περαιτέρω εξειδίκευση της διάγνωσης βάσει του συστήματος σταυρού αστερίσκου. Δεν μπορεί να καταχωριστεί ως κύρια διάγνωση. Ο κωδικός ιατρικής πράξης 393.00.04 *Είδος μοσχεύματος: Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό)* καταχωρίζεται εδώ συμπληρωματικά για να περιγράψει το συγκεκριμένο είδος μοσχεύματος.

Αν παρουσιάζονται επιπλοκές (κλινικές εκδηλώσεις) του σακχαρώδη διαβήτη και κάποιες από αυτές αποτελούν το κύριο αντικείμενο της θεραπευτικής αντιμετώπισης, ακολουθούνται οι κανόνες που αναφέρονται στην παράγραφο «Δύο ή περισσότερες διαγνώσεις που αντιστοιχούν εξίσου στον ορισμό της κύριας διάγνωσης» της ΕΚΟΚ D002 *Κύρια διάγνωση* (σελίδα 4). Ο 4^{ος} χαρακτήρας των κωδικών E10-E14 πρέπει να αποδίδει την κλινική εκδήλωση, που αντιστοιχεί καλύτερα στον ορισμό της κύριας διάγνωσης, σύμφωνα με τον θεράποντα ιατρό. Οι κωδικοί για τις υπόλοιπες κλινικές εκδηλώσεις καταχωρίζονται μόνο εφόσον αντιστοιχούν στον ορισμό της δευτερεύουσας διάγνωσης.

0401

Σακχαρώδης διαβήτης ως δευτερεύουσα διάγνωση

Εφόσον η εισαγωγή οφείλεται σε κάποιον άλλο λόγο εκτός του σακχαρώδη διαβήτη, έχει σημασία για την ορθή κωδικοποίηση:

- αν ο σακχαρώδης διαβήτης πληροί τα κριτήρια του ορισμού της δευτερεύουσας διάγνωσης,
- αν συνυπάρχουν επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη και
- αν αυτές πληρούν τα κριτήρια του ορισμού της δευτερεύουσας διάγνωσης.

Εφόσον ο σακχαρώδης διαβήτης πληροί τα κριτήρια του ορισμού της δευτερεύουσας διάγνωσης, τότε πρέπει να κωδικοποιείται. Οι συνυπάρχουσες επιπλοκές πρέπει να κωδικοποιούνται με έναν από τους κωδικούς E10-E14 με τον αντίστοιχο 4^ο χαρακτήρα. Επιπλέον, πρέπει να καταχωρίζονται οι επιπλοκές που πληρούν τα κριτήρια ορισμού της δευτερεύουσας διάγνωσης.

Αποκλίσεις από τους κανόνες που αφορούν το σακχαρώδη διαβήτη ως κύρια διάγνωση είναι:

- η μη επιλογή του «6» στον 4^ο χαρακτήρα, όταν μπορεί να επιλεγθεί συγκεκριμένος κωδικός για μεμονωμένη επιπλοκή, ή
- η καταχώριση πολλαπλών επιπλοκών σταθερά με το «7» στον 4^ο χαρακτήρα.

Παράδειγμα 6

Ασθενής εισάγεται λόγω κλειστού κατάγματος κεφαλής μηριαίου χωρίς κάκωση μαλακών μορίων. Συνυπάρχει σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2 που αντιμετωπίζεται με διαιτητική και φαρμακευτική αγωγή. Η διαβητική νεφροπάθεια ως μοναδική επιπλοκή του διαβήτη δεν επιβαρύνει το κόστος νοσηλείας.

Κύρια διάγνωση: S42.21 *Κάταγμα του εγγύς άκρου του βραχιόνιου οστού: Κεφαλή*

Δευτερεύουσα διάγνωση: E11.20 *Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 2]: με νεφρικές επιπλοκές: μη καθορισμένος ως απορρυθμισμένος*

Παράδειγμα 7

Ασθενής με χρόνια αρτηριακή υπέρταση και ιστορικό σημαντικής κατάχρησης νικοτίνης εισάγεται λόγω επιδείνωσης γνωστής περιφερικής αρτηριοπάθειας, με άλγος ηρεμίας, για χειρουργική επέμβαση bypass (με αλλογενές πλαστικό μόσχευμα). Επιπρόσθετα αντιμετωπίζονται θεραπευτικά ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 2, μια αρχόμενη διαβητική πολυνευροπάθεια και μια αρχόμενη διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια.

Κύρια διάγνωση: I70.22 *Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με άλγος ηρεμίας*

Δευτερεύουσες διαγνώσεις: I10.00 *Καλοήθης ιδιοπαθής υπέρταση: Χωρίς υπερτασική κρίση*

	E11.72+	<i>Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 2]: με πολλαπλές επιπλοκές: με άλλες πολλαπλές επιπλοκές, μη καθορισμένος ως απορρυθμισμένος</i>
	G63.2*	<i>Διαβητική πολυνευροπάθεια</i>
	H36.0*	<i>Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια</i>
Ιατρικές πράξεις:	339.03.04.02	<i>Διενέργεια άλλης αγγειακής επικοινωνίας και παράκαμψης: Λαγόνιος αρτηρία και σπλαχνικές αρτηρίες: Λαγονομηριαία</i>
	393.00.04	<i>Είδος μοσχεύματος: Αλλογενές πλαστικό (συνθετικό)</i>

Ειδικές επιπλοκές του σακχαρώδη διαβήτη

Σε ό,τι αφορά την κωδικοποίηση των επιπλοκών του σακχαρώδη διαβήτη σε γενικές γραμμές ισχύουν οι ανώτερες οδηγίες.

Οξείες μεταβολικές επιπλοκές

Ο σακχαρώδης διαβήτης με (κετ-)οξέωση πρέπει να κωδικοποιείται με έναν από τους κωδικούς E10-E14 , και το «1» στον 4^ο χαρακτήρα. Σε λίγες περιπτώσεις διαβητικής οξέωσης μπορεί να συνυπάρχει κετοξέωση και γαλακτική οξέωση στον ίδιο ασθενή. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καταχωρίζεται ένας από τους κωδικούς:

E10–E14, με το «73» στον 4^ο και 5^ο χαρακτήρα («με άλλες πολλαπλές επιπλοκές, καθορισμένος ως απορρυθμισμένος»).

Νεφρικές επιπλοκές

Νεφρικά νοσήματα που σχετίζονται αιτιολογικά με τον σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να κωδικοποιούνται με έναν από τους κωδικούς:

E10+–E14+, με το «2» στον 4^ο χαρακτήρα («σακχαρώδης διαβήτης με νεφρικές επιπλοκές»).

Επιπρόσθετα, πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός για τη συγκεκριμένη επιπλοκή, εφόσον αυτή πληροί τα κριτήρια ορισμού της δευτερεύουσας διάγνωσης. Αυτό διαφαίνεται στα ακόλουθα παραδείγματα.

0401

Παράδειγμα 8

Ασθενής προσέρχεται για αντιμετώπιση διαβητικής νεφροπάθειας.

Κύρια διάγνωση: E10.20+ *Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1]: με νεφρικές επιπλοκές: μη καθορισμένος ως απορρυθμισμένος*

Δευτερεύουσα διάγνωση: N08.3* *Σπειραματικές διαταραχές στον σακχαρώδη διαβήτη*

Παράδειγμα 9

Ασθενής εισάγεται για αντιμετώπιση τελικής νεφρικής ανεπάρκειας λόγω διαβητικής νεφροπάθειας.

Κύρια διάγνωση: E10.20+ *Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1]: με νεφρικές επιπλοκές: μη καθορισμένος ως απορρυθμισμένος*

Δευτερεύουσες διαγνώσεις: N08.3* *Σπειραματικές διαταραχές στον σακχαρώδη διαβήτη*

N18.5 *Χρόνια νεφρική νόσος, 5ου σταδίου*

Σημείωση: Ο κωδικός N18.5 *Χρόνια νεφρική νόσος, 5ου σταδίου* χρησιμοποιείται σε αυτό το παράδειγμα για περαιτέρω εξειδίκευση της διάγνωσης βάσει του συστήματος σταυρού-αστερίσκου. Δεν μπορεί να καταχωριστεί ως κύρια διάγνωση.

Διαβητική οφθαλμοπάθεια

Οφθαλμικά νοσήματα, που σχετίζονται αιτιολογικά με τον σακχαρώδη διαβήτη, πρέπει να κωδικοποιούνται με έναν από τους κωδικούς:

E10+—E14+, με το «3» στον 4^ο χαρακτήρα («σακχαρώδης διαβήτης με οφθαλμικές επιπλοκές»).

Επιπρόσθετα, πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός για τη συγκεκριμένη επιπλοκή, εφόσον αυτή πληροί τα κριτήρια ορισμού της δευτερεύουσας διάγνωσης. Αυτό διαφαίνεται στα ακόλουθα παραδείγματα.

Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια

E10+–E14+, με το «3» στον 4^ο χαρακτήρα *Σακχαρώδης διαβήτης με οφθαλμικές επιπλοκές*
 H36.0* *Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια*

Η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια με οίδημα αμφιβληστροειδούς (ωχράς κηλίδας) πρέπει να κωδικοποιείται ως:

E10+–E14+, με το «3» στον 4^ο χαρακτήρα *Σακχαρώδης διαβήτης με οφθαλμικές επιπλοκές*
 H36.0* *Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια*
 H35.8 *Άλλες καθορισμένες διαταραχές του αμφιβληστροειδούς*

Σε περίπτωση που η διαβητική οφθαλμοπάθεια προκαλεί τύφλωση ή ελαττωμένη όραση πρέπει να καταχωρίζεται πρόσθετα ένας κωδικός της κατηγορίας:

H54.– *Τύφλωση και ελαττωμένη όραση.*

Καταρράκτης

Ο διαβητικός καταρράκτης πρέπει να κωδικοποιείται μόνο αν υπάρχει αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ του καταρράκτη και του σακχαρώδη διαβήτη:

E10+–E14+, με το «3» στον 4^ο χαρακτήρα *Σακχαρώδης διαβήτης με οφθαλμικές επιπλοκές*
 H28.0* *Διαβητικός καταρράκτης*

Όταν δεν υπάρχει αιτιολογική συσχέτιση, ο καταρράκτης στους διαβητικούς ασθενείς πρέπει να κωδικοποιείται με έναν κωδικό της κατηγορίας:

H25.– *Γεροντικός καταρράκτης* ή H26.– *Άλλες μορφές καταρράκτη μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς από την κατηγορία E10–E14 Σακχαρώδης διαβήτης.*

Νευροπάθεια και σακχαρώδης διαβήτης

Νευρολογικά νοσήματα, που σχετίζονται αιτιολογικά με τον σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να κωδικοποιούνται ως «σακχαρώδης διαβήτης με νευρολογικές επιπλοκές»

E10+–E14+, με το «4» στον 4^ο χαρακτήρα.

Επιπρόσθετα, πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός για τη συγκεκριμένη επιπλοκή, εφόσον αυτή πληροί τα κριτήρια ορισμού της δευτερεύουσας διάγνωσης. Αυτό διαφαίνεται στα ακόλουθα παραδείγματα.

Διαβητική μονονευροπάθεια

E10+–E14+, με το «4» στον 4^ο χαρακτήρα *Σακχαρώδης διαβήτης με νευρολογικές επιπλοκές*
 G59.0* *Διαβητική μονονευροπάθεια*

0401

Διαβητική αμυοτροφία

E10+—E14+, με το «4» στον 4^ο χαρακτήρα *Σακχαρώδης διαβήτης με νευρολογικές επιπλοκές*
G73.0* *Μυασθενικά σύνδρομα σε ενδοκρινολογικά νοσήματα*

Διαβητική πολυνευροπάθεια

E10+—E14+, με το «4» στον 4^ο χαρακτήρα *Σακχαρώδης διαβήτης με νευρολογικές επιπλοκές*
G63.2* *Διαβητική πολυνευροπάθεια*

Περιφερική αγγειακή νόσος και σακχαρώδης διαβήτης

Περιφερικά αγγειακά νοσήματα, που σχετίζονται αιτιολογικά με τον σακχαρώδη διαβήτη πρέπει να κωδικοποιούνται ως «σακχαρώδης διαβήτης με επιπλοκές από τα περιφερικά αγγεία» E10+—E14+, με το «5» στον 4^ο χαρακτήρα.

Επιπρόσθετα, πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός για τη συγκεκριμένη επιπλοκή, εφόσον αυτή πληροί τα κριτήρια ορισμού της δευτερεύουσας διάγνωσης. Αυτό διαφαίνεται στα ακόλουθα παραδείγματα (βλέπε επίσης το παράδειγμα 5).

Σακχαρώδης διαβήτης με περιφερική αγγειοπάθεια

E10+—E14+, με το «5» στον 4^ο χαρακτήρα *Σακχαρώδης διαβήτης με επιπλοκές από τα περιφερικά αγγεία*
I79.2* *Περιφερική αγγειοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού*

Διαβητικό πόδι

Η διάγνωση «διαβητικό πόδι» πρέπει να κωδικοποιείται με έναν κωδικό της κατηγορίας:

E10—E14, 4^{ος} και 5^{ος} χαρακτήρας:

«.74» *Σακχαρώδης διαβήτης: με πολλαπλές επιπλοκές: με διαβητικό πόδι, μη καθορισμένος ως απορρυθμισμένος*

ή

«.75» *Σακχαρώδης διαβήτης: με πολλαπλές επιπλοκές: με διαβητικό πόδι, καθορισμένος ως απορρυθμισμένος.*

Οι κωδικοί για τις συνυπάρχουσες επιπλοκές, π.χ.

G63.2* *Διαβητική πολυνευροπάθεια,*

I79.2* *Περιφερική αγγειοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού*

πρέπει να καταχωρίζονται μετά. Όλες οι συνυπάρχουσες κλινικές εκδηλώσεις και επιπλοκές πρέπει να κωδικοποιούνται εφόσον πληρούν τα κριτήρια ορισμού της δευτερεύουσας διάγνωσης.

Ο ακόλουθος πίνακας παραθέτει μια επιλογή διαγνώσεων που θα μπορούσαν να ανήκουν στην κλινική εικόνα του «διαβητικού ποδιού»:

1. Λοίμωξη ή/και έλκος

<i>Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας των άκρων</i>	L02.4
<i>Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] των δακτύλων του κάτω άκρου</i>	L03.02
<i>Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] του κάτω άκρου</i>	L03.11

Σημείωση: Στους ακόλουθους κωδικούς τεσσάρων χαρακτήρων της κατηγορίας L89.- Έλκος κατάκλισης και πίεσης κωδικοποιείται στον 5^ο χαρακτήρα η εντόπιση του σημείου πίεσης (βλέπε ICD-10-GrM).

<i>Έλκος κατάκλισης 1ου βαθμού</i>	L89.0-
<i>Έλκος κατάκλισης 2ου βαθμού</i>	L89.1-
<i>Έλκος κατάκλισης 3ου βαθμού</i>	L89.2-
<i>Έλκος κατάκλισης 4ου βαθμού</i>	L89.3-
<i>Έλκος κατάκλισης μη καθορισμένου βαθμού</i>	L89.9-

<i>Έλκος του κάτω άκρου, που δεν ταξινομείται αλλού</i>	L97
---	-----

2. Περιφερική αγγειακή νόσος

<i>Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Άλλη και μη καθορισμένη</i>	I70.20
<i>Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με ισχαιμικό άλγος που προκαλείται από κόπωση</i>	I70.21
<i>Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με άλγος ηρεμίας</i>	I70.22
<i>Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με εξέλκωση</i>	I70.23
<i>Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με γάγγραινα</i>	I70.24

3. Περιφερική νευροπάθεια

<i>Διαβητική πολυνευροπάθεια</i>	G63.2*
<i>Αυτόνομη νευροπάθεια σε ενδοκρινολογικά και μεταβολικά νοσήματα</i>	G99.0*

4. Παραμορφώσεις

<i>Βλαισός μεγάλος δάκτυλος του πόδα (επίκτητος)</i>	M20.1
<i>Δύσκαμπτος μεγάλος δάκτυλος του πόδα</i>	M20.2
<i>Άλλη (επίκτητη) παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του ποδός</i>	M20.3
<i>Άλλη σφυροδακτυλία του ποδός (επίκτητη)</i>	M20.4
<i>Άλλες παραμορφώσεις του(ων) δακτύλου(ων) του ποδός (επίκτητες)</i>	M20.5
<i>Παραμόρφωση με κάμψη: Ποδοκνημικής και άκρου ποδός [ταρσός, μετατάρσιο, δάκτυλα ποδός, ποδοκνημική άρθρωση, άλλες αρθρώσεις του άκρου ποδός]</i>	M21.27

0401

Πτώση του καρπού ή του άκρου πόδα [drop wrist ή drop foot] (επίκτητη): Ποδοκνημικής και άκρου ποδός [περόνη, κνήμη, άρθρωση του γόνατος]	M21.37
Πλατυποδία [Pes planus] (επίκτητη)	M21.4
Επίκτητη γαμψοχειρία, ραιβοχειρία, κοιλοποδία και ραιβοίπποποδία: Ποδοκνημικής και άκρου ποδός [ταρσός, μετατάρσιο, δάκτυλα ποδός, ποδοκνημική άρθρωση, άλλες αρθρώσεις του άκρου ποδός]	M21.57
Άλλες επίκτητες παραμορφώσεις της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός	M21.6
Άλλες καθορισμένες επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων	M21.8-

5. Προηγθείς ακρωτηριασμός

Απώλεια του άκρου ποδός και του αστράγαλου, ετερόπλευρα	Z89.4
Απώλεια του κάτω άκρου στο ύψος του γόνατος ή κάτω απ' αυτό	Z89.5
Απώλεια του κάτω άκρου πάνω από το γόνατο	Z89.6
(Μερική) απώλεια κάτω άκρων, αμφοτερόπλευρα	Z89.7
Εξαιρ.: μεμονωμένη απώλεια των δακτύλων του άκρου ποδός, αμφοτερόπλευρη (Z89.4)	

Παράδειγμα 10

Ασθενής με απορρυθμισμένο σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1 εισάγεται για θεραπευτική αντιμετώπιση διαβητικού ποδιού, με μεικτό έλκος δακτύλου άκρου πόδα (επί εδάφους αγγειοπάθειας και νευροπάθειας) και ερυσίτελας κνήμης.

Κύρια διάγνωση:	E10.75+	Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1]: με πολλαπλές επιπλοκές: με διαβητικό πόδι, καθορισμένος ως απορρυθμισμένος
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	G63.2*	Διαβητική πολυνευροπάθεια
	I79.2*	Περιφερική αγγειοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
	I70.23	Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με εξέλκωση
	A46	Ερυσίτελας [κυτταρίτιδα]

Σημείωση: Ο κωδικός I70.23 Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με εξέλκωση χρησιμοποιείται σε αυτό το παράδειγμα για περαιτέρω εξειδίκευση της διάγνωσης βάσει του συστήματος σταυρού-αστερίσκου. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως κύρια διάγνωση.

Μεταβολικό σύνδρομο

Σε περίπτωση «μεταβολικού συνδρόμου» πρέπει να καταχωρίζονται χωριστά οι επιμέρους διαταραχές (βλέπε επίσης ΕΚΟΚ D004 *Σύνδρομο* (σελίδα 13)).

Διαταραχές της ενδοκρινούς έκκρισης του παγκρέατος

Οι κωδικοί:

- E16.0 *Φαρμακευτικής αιτιολογίας υπογλυκαιμία χωρίς κώμα*
 - E16.1 *Άλλες μορφές υπογλυκαιμίας*
 - E16.2 *Υπογλυκαιμία, μη καθορισμένη*
 - E16.8 *Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος*
 - E16.9 *Διαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος, μη καθορισμένη*
- δεν πρέπει να καταχωρίζονται σε **διαβητικούς ασθενείς** ως κύριοι κωδικοί.

0403 Κυστική ίνωση

Σε ασθενείς με κυστική ίνωση πρέπει να καταχωρίζεται ως **κύρια διάγνωση** ένας κωδικός της κατηγορίας:

E84.- *Κυστική ίνωση,*

ανεξάρτητα από την κλινική εκδήλωση της νόσου που ευθύνεται για την εισαγωγή. Η συγκεκριμένη κλινική εκδήλωση πρέπει να καταχωρίζεται πάντα ως δευτερεύουσα διάγνωση.

Σε περιπτώσεις συνδυασμού κλινικών εκδηλώσεων πρέπει να δίνεται προσοχή ώστε από τους κωδικούς της κατηγορίας:

E84.8- *Κυστική ίνωση με άλλες εκδηλώσεις*

να χρησιμοποιείται ο σωστός κωδικός:

E84.80 *Κυστική ίνωση με πνευμονικές και εντερικές εκδηλώσεις*

E84.87 *Κυστική ίνωση με άλλες πολλαπλές εκδηλώσεις*

E84.88 *Κυστική ίνωση με άλλες εκδηλώσεις*

Παράδειγμα 1

Ασθενής με ινοκυστική νόσο και λοίμωξη από αιμόφιλο ινφλουέντζας εισάγεται για θεραπευτική αντιμετώπιση βρογχίτιδας.

Κύρια διάγνωση: E84.0 *Κυστική ίνωση με πνευμονικές εκδηλώσεις*

Δευτερεύουσα διάγνωση: J20.1 *Οξεία βρογχίτιδα από αιμόφιλο της ινφλουέντζας [H. influenzae]*

0403

Ο κωδικός E84.80 *Κυστική ίνωση με πνευμονικές και εντερικές εκδηλώσεις* δεν πρέπει να καταχωρίζεται, αν η εντερική εκδήλωση αποτελεί το κύριο αντικείμενο της θεραπευτικής αντιμετώπισης και η νοσηλεία π.χ. πραγματοποιείται για χειρουργική αντιμετώπιση επιπλοκής που προκύπτει από την εντερική εκδήλωση. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός:

E84.1 *Κυστική ίνωση με εντερικές εκδηλώσεις*

ως κύρια διάγνωση και επιπρόσθετα ο κωδικός E84.0 *Κυστική ίνωση με πνευμονικές εκδηλώσεις* ως δευτερεύουσα. Αυτή η οδηγία κωδικοποίησης αποτελεί **εξαιρέση** στις οδηγίες του ICD-10-GM σχετικά με την κωδικοποίηση της κυστικής ίνωσης, με συνδυασμό κλινικών εκδηλώσεων.

Σε περίπτωση νοσηλείας που **δεν αφορά την κυστική ίνωση**, πρέπει να κωδικοποιείται το νόσημα (π.χ. κάταγμα) ως κύρια διάγνωση και ένας κωδικός της κατηγορίας E84.– *Κυστική ίνωση*, ως δευτερεύουσα.

5 ΨΥΧΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

0501 Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών (ναρκωτικά, αλκοόλ και νικοτίνη)

Γενικές σημειώσεις

Για τους κωδικούς της κατηγορίας F10-F19 *Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές της συμπεριφοράς που οφείλονται στη χρήση ψυχοτρόπων ουσιών*, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι γενικές σημειώσεις στο ICD-10-GrM. Περιγραφές όπως «περιστασιακή κατανάλωση αλκοόλ» ή «βαρύς πότης» δεν πρέπει να καταχωρίζονται.

Όταν μπορεί να καταχωριστεί παραπάνω από ένας κωδικός τεσσάρων χαρακτήρων από τους κωδικούς της κατηγορίας F10-F19 (π.χ. «οξεία τοξίκωση [οξεία μέθη]», «εξάρτηση» ή «ψυχωσική διαταραχή»), τότε πρέπει να καταχωρίζονται όλοι οι σχετικοί κωδικοί (βλέπε παράδειγμα 1).

Για τους ασθενείς που λαμβάνουν (συνταγογραφούμενα ή μη συνταγογραφούμενα) φάρμακα σε υπερδοσολογία, δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί F10-F19. Οι περιπτώσεις υπερδοσολογίας πρέπει να κωδικοποιούνται με τους αντίστοιχους κωδικούς για δηλητηριάσεις από τον κατάλογο των φαρμάκων και χημικών ουσιών (κεφάλαιο XIX *Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες*).

Οξεία τοξίκωση [οξεία μέθη]

Σε περίπτωση οξείας τοξίκωσης (οξείας μέθης)) πρέπει να καταχωρίζεται ο αντίστοιχος κωδικός από τους F10-F19 με το «0» στον 4^ο χαρακτήρα, σε **συνδυασμό** με έναν ακόμα κωδικό τεσσάρων χαρακτήρων από τους F10-F19, αν απαιτείται (βλέπε παράδειγμα 1). Εφόσον η οξεία τοξίκωση (οξεία μέθη) αποτελεί την αιτία εισαγωγής, κωδικοποιείται αυτή ως κύρια διάγνωση.

Παράδειγμα 1

Ασθενής εισάγεται λόγω οξείας μέθης, σε έδαφος συνδρόμου εξάρτησης από το αλκοόλ.

Κύρια διάγνωση: F10.0 *Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση οινοπνευματωδών: Οξεία τοξίκωση [οξεία μέθη]*

Δευτερεύουσα διάγνωση: F10.2 *Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση οινοπνευματωδών: Σύνδρομο εξάρτησης*

0501

Κατάχρηση ουσιών

Στον 4^ο χαρακτήρα καταχωρίζεται το «1», αν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ ενός συγκεκριμένου νοσήματος και κατάχρησης αλκοόλ ή φαρμάκων. Αυτό αφορά, για παράδειγμα, διαγνώσεις που χαρακτηρίζονται ως «προκαλούμενες από αλκοόλ» ή «σχετιζόμενες με αλκοόλ».

Παράδειγμα 2

Σε έναν ασθενή διαγιγνώσκεται οισοφαγίτιδα σχετιζόμενη με την κατανάλωση αλκοόλ.

Κύρια διάγνωση:	K20	<i>Οισοφαγίτιδα</i>
Δευτερεύουσα διάγνωση:	F10.1	<i>Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς οφειλόμενες στη χρήση οινόπνευματων: Κατάχρηση ουσιών</i>

Στον παραπάνω ορισμό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι δεν μπορεί να καταχωριστεί το «1» στον 4^ο χαρακτήρα όταν υπάρχει συγκεκριμένο ψυχιατρικό νόσημα σχετιζόμενο με φάρμακα ή αλκοόλ, ειδικά αν πρόκειται για σύνδρομο εξάρτησης ή ψυχωτική διαταραχή.

6 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

0601 Εγκεφαλικό επεισόδιο

1. Οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο

Σε περίπτωση που ο ασθενής βρίσκεται υπό θεραπευτική αγωγή αντιμετώπισης του οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου και των άμεσων επιπτώσεών του (νευρολογικών ελλειμμάτων), πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός της κατηγορίας I60-I69 *Νοσήματα των εγκεφαλικών αγγείων μαζί με τους αντίστοιχους κωδικούς για τα νευρολογικά ελλείμματα* (π.χ. ημιπληγία, αφασία, ημιανοψία, αμέλεια [neglect]).

Παράδειγμα 1

Ασθενής εισάγεται λόγω εγκεφαλικού επεισοδίου με χαλαρή ημιπληγία και αφασία.

Κύρια διάγνωση: I63.3 *Εγκεφαλικό έμφρακτο από θρόμβωση των εγκεφαλικών αρτηριών*

Δευτερεύουσες διαγνώσεις: G81.0 *Χαλαρή ημιπάρεση και ημιπληγία*
R47.0 *Δυσφασία και αφασία*

Το εγκεφαλικό επεισόδιο πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση και όλες οι συνοδές λειτουργικές διαταραχές ως δευτερεύουσες διαγνώσεις.

2. «Παλαιό εγκεφαλικό επεισόδιο»

Ο ασθενής έχει ιστορικό παλαιού εγκεφαλικού επεισοδίου με υφιστάμενα κατά την παρούσα νοσηλεία νευρολογικά ελλείμματα. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να κωδικοποιούνται τα νευρολογικά ελλείμματα (π.χ. ημιπληγία, αφασία, ημιανοψία, αμέλεια [neglect]) σύμφωνα με τις ΕΚΟΚ D003 *Δευτερεύουσες διαγνώσεις* (σελίδα 10) και επιπρόσθετα να καταχωρίζεται ένας κωδικός από τους:

I69.– *Δευτεροπαθείς καταστάσεις των νοσημάτων των εγκεφαλικών αγγείων*

Παράδειγμα 2

Ασθενής εισάγεται με πνευμονία από πνευμονιόκοκκο. Ο ασθενής είχε υποστεί προ τριετίας οξύ εγκεφαλικό επεισόδιο και λαμβάνει έκτοτε αντιαμοπεταλιακή αγωγή. Επιπλέον εξαιτίας υπολειπόμενης σπαστικής ημιπάρεσης χρήζει αυξημένης νοσηλευτικής φροντίδας.

Κύρια διάγνωση: J13 *Πνευμονία από στρεπτόκοκκο της πνευμονίας [S. Pneumoniae]*

Δευτερεύουσες διαγνώσεις: G81.1 *Σπαστική ημιπάρεση και ημιπληγία*
I69.4 *Δευτεροπαθείς καταστάσεις ενός εγκεφαλικού επεισοδίου, μη καθορισμένου ως αιμορραγικού ή εμφρακτικού*

0603

Παρατήρηση:

Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ότι στα εγκεφαλικά επεισόδια η **δυσφαγία, και η ακράτεια ούρων και κοπράνων** πρέπει να κωδικοποιούνται μόνο αν πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (βλέπε επίσης ΕΚΟΚ 1804 *Ακράτεια* (σελίδα 155)).

Η *δυσφαγία* (R13.–) πρέπει π.χ. να κωδικοποιείται μόνο αν απαιτείται ρινογαστρικός σωλήνας για εντερική σίτιση ή χρειάζεται θεραπευτική αντιμετώπιση της για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 7 ημερολογιακών ημερών, μετά την εμφάνιση του εγκεφαλικού επεισοδίου.

0603 Τετραπληγία και παραπληγία, μη τραυματικής αιτιολογίας

Για την κωδικοποίηση τραυματικής τετραπληγίας ή παραπληγίας βλέπε επίσης την ΕΚΟΚ 1910 *Τραυματισμός του νωτιαίου μυελού* (σελίδα 164).

Αρχική (οξεία) φάση παραπληγίας ή τετραπληγίας

Η «οξεία» φάση μιας μη τραυματικής παραπληγίας ή τετραπληγίας αφορά την πρώτη εισαγωγή του ασθενούς, λόγω λειτουργικού ελλείμματος μη τραυματικής αιτιολογίας, όπως π.χ. σε εγκάρσια μυελίτιδα ή έμφρακτο του νωτιαίου μυελού. Μπορεί επίσης να πρόκειται για έναν ασθενή που αντιμετωπίστηκε χειρουργικά ή συντηρητικά και βρισκόταν σε κλινική ύφεση, αλλά παρουσιάζει τέτοια επιδείνωση, ώστε να απαιτεί την ίδια εντατική θεραπευτική αντιμετώπιση με ασθενείς που εισάγονται για πρώτη φορά μετά από τραυματισμό.

Σε περίπτωση εισαγωγής ασθενούς με νόσημα, που προκαλεί οξεία βλάβη του νωτιαίου μυελού (π.χ. μυελίτιδα), πρέπει να καταχωρίζονται οι ακόλουθοι κωδικοί:

Το νόσημα ως κύρια διάγνωση π.χ.:

G04.9 *Εγκεφαλίτιδα, μυελίτιδα και εγκεφαλομυελίτιδα, μη καθορισμένη και ένας κωδικός της κατηγορίας*

G82.– *Παραπάρεση και παραπληγία, τετραπάρεση και τετραπληγία, με το «0» ή «1» στον 5^ο χαρακτήρα.*

Για το λειτουργικό επίπεδο της βλάβης του νωτιαίου μυελού πρέπει να καταχωρίζεται ένας πρόσθετος κωδικός της κατηγορίας:

G82.6-! *Λειτουργικό επίπεδο της βλάβης του νωτιαίου μυελού.*

Όψιμη (χρόνια) φάση μιας παραπληγίας ή τετραπληγίας

Η χρόνια φάση μιας παραπληγίας ή τετραπληγίας αφορά τη χρονική περίοδο κατά την οποία έχει ολοκληρωθεί η θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας νόσου (π.χ. μιας μυελίτιδας) που προκάλεσε την παράλυση.

Αν ένας ασθενής προσέρχεται για θεραπευτική αντιμετώπιση κατά τη χρόνια φάση της παραπληγίας ή της τετραπληγίας, πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός της κατηγορίας:

G82.– *Παραπάρεση και παραπληγία, τετραπάρεση και τετραπληγία, με το «2» ή «3» στον 5^ο χαρακτήρα ως κύρια διάγνωση.*

0603

Αν ο ασθενής εισάγεται για αντιμετώπιση άλλου νοσήματος όπως π.χ. λοίμωξη ουροποιητικού, κάταγμα μηρού κ.α., τότε πρέπει να κωδικοποιείται το νόσημα για το οποίο εισήχθη και να ακολουθεί ένας κωδικός της κατηγορίας:

G82.- *Παραπάρεση και παραπληγία, τετραπάρεση και τετραπληγία, με το «2» ή «3» στον 5^ο χαρακτήρα, καθώς και οι άλλες συνυπάρχουσες παθήσεις. Η σειρά καταχώρισης αυτών των παθήσεων πρέπει να είναι σύμφωνη με τον ορισμό της κύριας διάγνωσης.*

Για το λειτουργικό επίπεδο της βλάβης του νωτιαίου μυελού πρέπει να καταχωρίζεται επιπλέον ο αντίστοιχος κωδικός της κατηγορίας:

G82.6-! *Λειτουργικό επίπεδο της βλάβης του νωτιαίου μυελού.*

0603

7 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΦΘΑΛΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ

0702 Καταρράκτης: Δευτερογενής εισαγωγή φακού

Σε περιπτώσεις που ο φακός έχει εξαιρεθεί σε προηγούμενη επέμβαση, ή έχει παρεκτοπιστεί ή μετατοπιστεί, και δεν έχει τοποθετηθεί στην ορθή του θέση, πρέπει να καταχωρίζεται κατά την εισαγωγή του φακού ο κωδικός:

H27.0 Αφακία.

0704 Ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος κερατοειδούς

Η ανεπάρκεια και απόρριψη μοσχεύματος κερατοειδούς πρέπει να κωδικοποιείται με τον κωδικό:

T86.83 *Ανεπάρκεια και απόρριψη άλλων μεταμοσχευθέντων οργάνων και ιστών: Μοσχεύματος κερατοειδούς του οφθαλμού*

Δευτερεύουσες διαγνώσεις που σχετίζονται με την απόρριψη ή την ανεπάρκεια ενός μοσχεύματος κερατοειδούς πρέπει να κωδικοποιούνται επιπρόσθετα με τον κωδικό T86.83, όπως π. χ. με τους κωδικούς:

H44.0 *Πυώδης ενδοφθαλμίτιδα*

H44.1 *Άλλες μορφές ενδοφθαλμίτιδας*

H20.- *Ιριδοκυκλίτιδα*

H16.- *Κερατίτιδα*

H18.- *Άλλες διαταραχές του κερατοειδούς*

Z96.1 *Υπαρξη ενδοφθάλμιου φακού*

0704

0801

8 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΩΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΑΣΤΟΕΙΔΟΥΣ ΑΠΟΦΥΣΗΣ

0801 Βαρηκοΐα ή κώφωση

Οι διαγνώσεις βαρηκοΐα και κώφωση μπορούν να κωδικοποιηθούν με έναν αντίστοιχο κωδικό από τις κατηγορίες:

H90.— *Απώλεια ακοής τύπου αγωγιμότητας και νευροαισθητηριακού τύπου και*

H91.— *Άλλες περιπτώσεις απώλειας ακοής*

ως κύριες διαγνώσεις στις ακόλουθες περιπτώσεις:

- διερεύνηση σε παιδιά όταν διενεργείται αξονική τομογραφία ή ακοολογικές δοκιμασίες υπό νάρκωση
- αιφνίδια απώλεια ακοής σε ενήλικα.

0801

9 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

0901 Ισχαιμική καρδιοπάθεια

Στηθάγχη (I20.-)

Σε ασθενή με στηθάγχη πρέπει να καταχωρίζεται ο αντίστοιχος κωδικός πριν από τον κωδικό της αθηροσκλήρωσης των στεφανιαίων αγγείων.

Αν εισαχθεί ασθενής με ασταθή στηθάγχη, η οποία κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του εξελιχθεί σε έμφραγμα μυοκαρδίου, πρέπει να καταχωρίζεται μόνο ο κωδικός για το έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Σε περίπτωση που ο ασθενής εκδηλώσει μετεμφραγματική στηθάγχη, μπορεί να καταχωριστεί ο κωδικός I20.0 *Ασταθής στηθάγχη*, ως συμπληρωματικός κωδικός.

Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (I21.-)

Ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου που χαρακτηρίζεται ως οξύ ή που συνέβη εντός των τελευταίων τεσσάρων εβδομάδων (28 ημερών), πρέπει να καταχωρίζεται με έναν κωδικό της κατηγορίας:

I21.- *Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου*

Οι κωδικοί της κατηγορίας I21.- *Οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου* πρέπει να καταχωρίζεται για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του εμφράγματος, τόσο στο πρώτο νοσοκομείο που δέχεται τον ασθενή, όσο και στα λοιπά εξειδικευμένα κέντρα στα οποία εισάγεται ή διακομίζεται ο ασθενής εντός τεσσάρων εβδομάδων (28 ημερών) μετά το έμφραγμα.

Υποτροπιάζον έμφραγμα του μυοκαρδίου (I22.-)

Με αυτόν τον κωδικό πρέπει να καταχωρίζεται το έμφραγμα του μυοκαρδίου που συμβαίνει εντός τεσσάρων εβδομάδων (28 ημερών) μετά από προηγούμενο έμφραγμα του μυοκαρδίου.

Παλιό έμφραγμα του μυοκαρδίου (I25.2-)

Ο κωδικός:

I25.2- *Παλιό έμφραγμα του μυοκαρδίου*

αφορά μια διάγνωση από το ατομικό αναμνηστικό, ακόμα και αν δεν περιέχεται ως «κωδικός Z» στο κεφάλαιο XXI *Παράγοντες που επηρεάζουν την κατάσταση της υγείας και την επαφή με τις υπηρεσίες υγείας*. Αυτός ο κωδικός πρέπει να καταχωρίζεται πρόσθετα, μόνο εφόσον έχει σημασία για την παρούσα νοσηλεία.

0901

Άλλες μορφές χρόνιας ισχαιμικής καρδιοπάθειας (I25.8)

Ένα έμφραγμα του μυοκαρδίου, το οποίο αντιμετωπίζεται θεραπευτικά μετά από χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τεσσάρων εβδομάδων (28 ημερών) μετά την εκδήλωσή του, πρέπει να καταχωρίζεται με τον κωδικό:

I25.8 Άλλες μορφές χρόνιας ισχαιμικής καρδιοπάθειας

Ισχαιμική καρδιοπάθεια που είχε αντιμετωπιστεί χειρουργικά/επεμβατικά

Αν κατά την παρούσα νοσηλεία αντιμετωπίζεται μια ισχαιμική καρδιοπάθεια που είχε αντιμετωπιστεί χειρουργικά/επεμβατικά στο παρελθόν, τότε πρέπει να εφαρμόζεται η ακόλουθη κωδικοποίηση:

Αν τα ήδη υπάρχοντα bypass/stent παραμένουν βατά και πραγματοποιείται νέα επέμβαση για τη διάνοιξη στένωσης άλλων αγγειακών τμημάτων, πρέπει να καταχωρίζεται ένας από τους κωδικούς:

I25.11 Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια: Νόσος ενός αγγείου,

I25.12 Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια: Νόσος δύο αγγείων,

I25.13 Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια: Νόσος τριών αγγείων
ή

I25.14 Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια: Στένωση της αριστερής κύριας στεφανιαίας αρτηρίας [αριστερού στελέχους]

μαζί με τον κωδικό:

Z95.1 Ύπαρξη αορτοστεφανιαίας παράκαμψης

ή τον κωδικό:

Z95.5 Ύπαρξη εμφυτεύματος και μοσχεύματος στεφανιαίας αγγειοπλαστικής.

Οι κωδικοί:

I25.15 Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια: Με στενωμένα τα αγγεία της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης [bypass]

I25.16 Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια: Με στενωμένες ενδοαγγειακές προθέσεις [stents]

πρέπει να καταχωρίζονται μόνο όταν έχει προσβληθεί το ήδη υπάρχον bypass/stent. Σε αυτήν την περίπτωση οι κωδικοί:

Z95.1 Ύπαρξη αορτοστεφανιαίας παράκαμψης ή

Z95.5 Ύπαρξη εμφυτεύματος και μοσχεύματος στεφανιαίας αγγειοπλαστικής

δεν πρέπει να καταχωρίζονται ως συμπληρωματική διάγνωση.

0902

Παράδειγμα 1

Ασθενής εισάγεται με ασταθή στηθάγχη που εκδηλώνεται τρία χρόνια μετά από επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης [bypass]. Η στεφανιογραφία έδειξε στένωση του φλεβικού μοσχεύματος.

Κύρια διάγνωση: I20.0 *Ασταθής στηθάγχη*

Δευτερεύουσα διάγνωση: I25.15 *Αθηροσκληρωτική καρδιοπάθεια: Με στενωμένα τα αγγεία της αορτοστεφανιαίας παράκαμψης [bypass]*

Απαραίτητη προϋπόθεση για την καταχώριση των κωδικών:

Z95.1 *Υπαρξη αορτοστεφανιαίας παράκαμψης ή*

Z95.5 *Υπαρξη εμφυτεύματος και μοσχεύματος στεφανιαίας αγγειοπλαστικής*

είναι, πέρα από την ύπαρξη πληροφοριών από το ατομικό αναμνηστικό του ασθενή για προηγούμενη αορτοστεφανιαία παράκαμψη ή αγγειοπλαστική, οι πληροφορίες αυτές να κρίνονται **σημαντικές** για την παρούσα νοσηλεία (βλέπε ΕΚΟΚ D003 *Δευτερεύουσες διαγνώσεις* (σελίδα 10)).

0902 Οξύ πνευμονικό οίδημα

Όταν διαγιγνώσκεται «οξύ πνευμονικό οίδημα», πρέπει να καταχωρίζεται με βάση το υποκείμενο αίτιο.

Ένα οξύ πνευμονικό οίδημα, π.χ. καρδιακής αιτιολογίας, πρέπει να καταχωρίζεται με τον κωδικό:

I50.14 *Αριστερή καρδιακή ανεπάρκεια: Με συμπτώματα στην ηρεμία.*

Βλέπε επίσης τις σημειώσεις και τις εξαιρέσεις στο ICD-10-GrM που αφορούν τον κωδικό:

J81 *Πνευμονικό οίδημα.*

0903 Καρδιακή ανακοπή

Η καρδιακή ή καρδιοαναπνευστική ανακοπή (I46.- *Καρδιακή ανακοπή*) πρέπει να καταχωρίζεται **μόνο** αν εφαρμοστούν μέτρα αναζωογόνησης στον ασθενή, ανεξάρτητα από την τελική έκβαση.

Η καρδιακή ανακοπή (I46.- *Καρδιακή ανακοπή*) **δεν** πρέπει να κωδικοποιείται ως κύρια διάγνωση, αν είναι γνωστή η υποκείμενη αιτία.

Σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής, η καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση πρέπει να καταχωρίζεται επιπλέον με τον κωδικό ΕΤΙΠ:

577.01 *Καρδιακή ή καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση.*

0904

0904 Υπερτασική καρδιοπάθεια (I11.–)

Εάν υπάρχει αιτιολογική σχέση μεταξύ μιας καρδιοπάθειας και της υπέρτασης, πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός για την καρδιοπάθεια (π.χ. της κατηγορίας I50.– *Καρδιακή ανεπάρκεια* ή I51.– *Επιπλοκές μιας καρδιοπάθειας και ασαφώς καθορισμένη καρδιοπάθεια*) και να ακολουθεί ένας κωδικός της κατηγορίας I11.– *Υπερτασική καρδιοπάθεια*. Αν για την καρδιοπάθεια δεν υπάρχει άλλος ειδικός κωδικός, τότε πρέπει να καταχωρίζεται μόνον ένας κωδικός της κατηγορίας I11.– *Υπερτασική καρδιοπάθεια*.

Όταν η καρδιοπάθεια και η υπέρταση συνυπάρχουν χωρίς αιτιολογική σχέση, πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.

0905 Υπερτασική νεφροπάθεια (I12.–)

Εάν υπάρχει αιτιολογική σχέση μεταξύ μιας νεφροπάθειας και της υπέρτασης, πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός για τη νεφροπάθεια (π.χ. από την κατηγορία N18.– *Χρόνια νεφρική νόσος*) και να ακολουθεί ένας κωδικός της κατηγορίας I12.– *Υπερτασική νεφροπάθεια*. Αν για τη νεφροπάθεια δεν υπάρχει άλλος ειδικός κωδικός, τότε πρέπει να καταχωρίζεται μόνον ένας κωδικός της κατηγορίας I12.– *Υπερτασική νεφροπάθεια*.

Όταν η νεφροπάθεια και η υπέρταση συνυπάρχουν χωρίς αιτιολογική σχέση, πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά.

0906

0906 Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια (I13.–)

Σε περιπτώσεις όπου συνυπάρχει υπερτασική καρδιοπάθεια (I11.–) και υπερτασική νεφροπάθεια (I12.–), πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός για την καρδιοπάθεια (π.χ. από την κατηγορία I50.– *Καρδιακή ανεπάρκεια*) και ένας για τη νεφροπάθεια (π.χ. από την κατηγορία N18.– *Χρόνια νεφρική νόσος*) και να ακολουθεί ένας κωδικός της κατηγορίας:

I13.– *Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια.*

Αν για την καρδιοπάθεια και τη νεφροπάθεια δεν υπάρχει άλλος ειδικός κωδικός, τότε πρέπει να καταχωρίζεται μόνο ένας κωδικός της κατηγορίας I13.– *Υπερτασική καρδιοπάθεια και νεφροπάθεια.*

Η κύρια διάγνωση καθορίζεται με βάση την ΕΚΟΚ D002 *Κύρια διάγνωση* (σελίδα 4).

0908 Πρόσθετες ιατρικές πράξεις που σχετίζονται με καρδιοχειρουργικές επεμβάσεις**Καρδιοπνευμονική παράκαμψη (ΚΠΠ)**

Για επεμβάσεις κατά τη διάρκεια των οποίων εφαρμόζεται κατά βάση καρδιοπνευμονική παράκαμψη, πρέπει να περιλαμβάνεται η χρήση της καρδιοπνευμονικής παράκαμψης στον κωδικό. Αυτό διαφαίνεται και από τις αντίστοιχες σημειώσεις στην ΕΤΙΠ.

Εξαιρέση αποτελούν οι επεμβάσεις, κατά τη διάρκεια των οποίων εφαρμόζεται καρδιοπνευμονική παράκαμψη με βαθιά ή πολύ βαθιά συστηματική υποθερμία. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καταχωρίζεται επιπλέον ένας κωδικός από τους:

585.01.04 *Χειρουργική εξωσωματική κυκλοφορία (με χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης): Με βαθιά υποθερμία (20 έως 26°C)*

ή

585.01.05 *Χειρουργική εξωσωματική κυκλοφορία (με χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης): Με πολύ βαθιά συστηματική υποθερμία (κάτω από 20°C)*

Η χρήση ενδοαορτικού μπαλονιού (balloon), πρέπει να καταχωρίζεται ανάλογα με τον αντίστοιχο βαθμό της υποθερμίας (ακόμα και σε νορμοθερμία) με έναν κωδικό της κατηγορίας:

585.01 *Χειρουργική εξωσωματική κυκλοφορία (με χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης) [...]*

με το «1» στην 6^η υποδιαίρεση *Με ενδοαορτικό μπαλόνι.*

0909

Όταν η χρήση καρδιοαναπνευστικής παράκαμψης δεν περιλαμβάνεται στον κωδικό της ιατρικής πράξης (π.χ. 336.02 Διενέργεια αορτοστεφανιαίας παράκαμψης (bypass), με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (minimally invasive)), τότε πρέπει να καταχωρίζεται με έναν αντίστοιχο κωδικό της κατηγορίας:

585.01 Χειρουργική εξωσωματική κυκλοφορία (με χρήση συσκευής καρδιοπνευμονικής παράκαμψης)

Προσωρινός βηματοδότης, προσωρινά ηλεκτρόδια

Επειδή η εμφύτευση ηλεκτροδίων για προσωρινή καρδιακή βηματοδότηση αποτελεί διαδικασία ρουτίνας σε μια επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης, δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

0909 Αναθεώρηση καρδιοχειρουργικής επέμβασης ή επανεπέμβαση καρδιάς και περικαρδίου

Επανεπέμβαση θεωρείται κάθε νέα επέμβαση με διάνοιξη περικαρδίου ή ανοικτή επέμβαση σε καρδιακές βαλβίδες, μετά από προηγηθείσα καρδιοχειρουργική επέμβαση.

Κατά κανόνα πρέπει να καταχωρίζεται σε κάθε καρδιοχειρουργική επανεπέμβαση, μαζί με τους ειδικούς κωδικούς ιατρικών πράξεων, και ο πρόσθετος κωδικός:

337.09.05 Άλλες επεμβάσεις σε καρδιά και περικάρδιο: Επανεπέμβαση.

Όταν αναθεωρείται μια ήδη υπάρχουσα αορτοστεφανιαία παράκαμψη ή διενεργείται μια νέα, πρέπει να καταχωρίζονται συμπληρωματικά οι κωδικοί:

336.03.01 Άλλη επαναγγείωση της καρδιάς: Αναθεώρηση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης

ή

336.03.02 Άλλη επαναγγείωση της καρδιάς: Διενέργεια νέας αορτοστεφανιαίας παράκαμψης

Παράδειγμα 1

Ασθενής εισάγεται για αντικατάσταση μοσχεύματος αορτικής βαλβίδας. Προ δετίας είχε υποβληθεί σε αντικατάσταση αορτικής βαλβίδας με βιολογική βαλβίδα και ταυτόχρονη αορτοστεφανιαία παράκαμψη.

Ιατρικές πράξεις: 335.02.00.00 Αντικατάσταση καρδιακής προσθετικής βαλβίδας: Αορτική βαλβίδα: Ξενομόσχευμα από τεχνητή πρόθεση
337.09.05 Άλλες επεμβάσεις σε καρδιά και περικάρδιο: Επανεπέμβαση

0911 Βηματοδότες/απινιδωτές

Παρατήρηση: Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία περιλαμβάνει διευκρινίσεις που αφορούν την κωδικοποίηση διαγνώσεων και ιατρικών πράξεων, που σχετίζονται με βηματοδότες. Τα ίδια ισχύουν αναλογικά και για την κωδικοποίηση της εμφύτευσης, αντικατάστασης ή απομάκρυνσης απινιδωτή.

Μόνιμος βηματοδότης

Αν αφαιρεθεί ένα προσωρινό ηλεκτρόδιο και εμφυτευθεί μόνιμος βηματοδότης, πρέπει να κωδικοποιείται ο μόνιμος βηματοδότης ως αρχική εμφύτευση και όχι ως αντικατάσταση.

Ο έλεγχος του βηματοδότη κατά τη διάρκεια της νοσηλείας ενός ασθενή για εμφύτευση βηματοδότη αποτελεί ιατρική πράξη ρουτίνας και γι' αυτό δεν πρέπει να κωδικοποιείται ως χωριστή ιατρική πράξη.

Σε περίπτωση ελέγχου του βηματοδότη σε κάποια άλλη χρονική στιγμή (όχι κατά τη διάρκεια της νοσηλείας για την εμφύτευση του), πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός:

126.06.00 *Καρδιολογική ηλεκτροφυσιολογική μελέτη χωρίς χρήση καθετήρα/ων: Σε εμφυτευμένο βηματοδότη*

Σε περίπτωση νοσηλείας για αντικατάσταση γεννήτριας βηματοδότη/απινιδωτή, πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση ένας κωδικός της κατηγορίας:

Z45.0- *Ρύθμιση και χειρισμός καρδιακής (ηλεκτρονικής) συσκευής*

μαζί με τον αντίστοιχο κωδικό της ιατρικής πράξης.

Οι επιπλοκές ενός βηματοδότη/απινιδωτή πρέπει να κωδικοποιούνται με τους ακόλουθους κωδικούς:

T82.1 *Μηχανική επιπλοκή καρδιακής ηλεκτρονικής συσκευής (αυτός ο κωδικός εμπεριέχει τις διαταραχές λειτουργίας του βηματοδότη και των ηλεκτροδίων, ενός τμήματος ηλεκτροδίου ή την αποκόλληση του ηλεκτροδίου)*

T82.7 *Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση που οφείλεται σε άλλες καρδιακές και αγγειακές συσκευές, εμφυτεύματα και μοσχεύματα*

T82.8 *Άλλες επιπλοκές καρδιακών και αγγειακών προσθετικών βαλβίδων, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων*

Η ύπαρξη εμφυτευμένου βηματοδότη/απινιδωτή σε ασθενή, πρέπει να καταχωρίζεται με τον κωδικό:

Z95.0 *Υπαρξη καρδιακής ηλεκτρονικής συσκευής.*

0912

**0912 Εισαγωγή για σύγκλειση αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας ή
αφαίρεση αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης**

Σε περίπτωση νοσηλείας για σύγκλειση αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας ή αφαίρεση αρτηριοφλεβικής αναστόμωσης, πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση ο κωδικός:

248.8 Άλλη καθορισμένη χειρουργική τακτική εξέταση παρακολούθησης
[follow-up]

μαζί με τον ακόλουθο κωδικό ιατρικών πράξεων:

339.04.06 Αναθεώρηση αγγειοχειρουργικής επέμβασης: Σύγκλειση αρτηριοφλεβικής επικοινωνίας.

10 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1001 Μηχανικός αερισμός

Ορισμός

Μηχανικός αερισμός (μηχανική υποστήριξη της αναπνοής) καλείται η διαδικασία, κατά την οποία η ανταλλαγή αερίων μέσω του πνεύμονα πραγματοποιείται με μηχανική υποστήριξη. Η αναπνοή του ασθενούς διευκολύνεται με την ενίσχυση ή αντικατάσταση του έργου της αναπνοής. Ο μηχανικός αερισμός είναι κατά κανόνα συνεχής και ο ασθενής είναι διασωληνωμένος ή φέρει τραχειοστομία. Σε ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), ο μηχανικός αερισμός μπορεί να γίνεται με αναπνευστικές συσκευές (μάσκες), όταν αυτές αντικαθιστούν τη συνήθη διασωλήνωση ή τραχειοστομία.

Κωδικοποίηση

Όταν ο μηχανικός αερισμός πληροί τα κριτήρια του παραπάνω ορισμού:

- 1) αρχικά πρέπει να κωδικοποιείται η διάρκεια του μηχανικού αερισμού
- 2) και στη συνέχεια πρέπει να καταχωρίζεται **συμπληρωματικά**:
 - 2α) ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:
 - 570.01 *Απλή ενδοτραχειακή διασωλήνωση*
 - 570.04 *Διασωλήνωση με σωλήνα διπλού αυλού*
 - 570.06 *Τοποθέτησης μάσκας για μηχανική υποστήριξη της αναπνοής*ή/και
 - 2β) ο αντίστοιχος κωδικός από τους:
 - 331.01 *Παροδική τραχειοστομία ή*
 - 331.02 *Μόνιμη τραχειοστομία*αν διενεργήθηκε **τραχειοστομία** για διευκόλυνση του μηχανικού αερισμού.
- 3) σε **νεογνά και βρέφη** πρέπει να καταχωρίζεται **συμπληρωματικά** ένας κωδικός από τους:
 - 571.01 *Μηχανικός αερισμός και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής σε νεογνά και βρέφη*
- 4) για την ειδική περίπτωση **ασθενών με κατ' οίκον μηχανικό αερισμό, μέσω τραχειοστομίας**, η καταχώριση πρέπει να γίνεται σε αντιστοιχία με τους ασθενείς της ΜΕΘ που δέχονται μηχανικό αερισμό μέσω αναπνευστικών συσκευών (μασκών).

Δηλαδή η διάρκεια μηχανικού αερισμού πρέπει να καταγράφεται και στην ειδική περίπτωση ενός ασθενούς που λαμβάνει «εντατική ιατρική παρακολούθηση».

Υπολογισμός της διάρκειας μηχανικού αερισμού

Ο μηχανικός αερισμός (βλέπε τον ορισμό στην 1^η παράγραφο) που ξεκίνησε για την πραγματοποίηση μιας χειρουργικής επέμβασης ή κατά τη διάρκεια αυτής και που **δεν διαρκεί πάνω από 24 ώρες, δεν υπολογίζεται** στη συνολική διάρκεια του μηχανικού αερισμού. Ο μηχανικός αερισμός στο πλαίσιο χορήγησης αναισθησίας σε μια χειρουργική επέμβαση θεωρείται αναπόσπαστο κομμάτι της επέμβασης.

Ωστόσο, όταν ο μηχανικός αερισμός ξεκινάει προς πραγματοποίηση μιας χειρουργικής επέμβασης ή κατά τη διάρκεια αυτής, και **διαρκεί περισσότερο από 24 ώρες, τότε συνυπολογίζεται** στη συνολική διάρκεια αερισμού.

Ο μηχανικός αερισμός που δεν εξυπηρετεί τους σκοπούς μιας επέμβασης π.χ. κατά την εντατική περίθαλψη μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση ή έγκαιρα, υπολογίζεται, ανεξαρτήτως διάρκειας, στη συνολική διάρκεια του μηχανικού αερισμού. Σε ασθενείς που χειρουργούνται ενώ βρίσκονται ήδη σε μηχανικό αερισμό, τότε η διάρκεια της επέμβασης συνυπολογίζεται στη συνολική διάρκεια του μηχανικού αερισμού.

Σε περίπτωση μίας ή περισσότερων περιόδων μηχανικού αερισμού κατά τη διάρκεια της ίδιας νοσηλείας, υπολογίζεται η συνολική διάρκεια μηχανικού αερισμού με βάση τους παραπάνω κανόνες, και το άθροισμα στρογγυλοποιείται στην επόμενη ακέραιη ώρα (βλέπε επίσης ΕΚΟΚ Ρ005 Πολλαπλές ιατρικές πράξεις/ιατρικές πράξεις που διαφέρουν ως προς το μέγεθος, τη διάρκεια ή τον αριθμό/ αμφοτερόπλευρες ιατρικές πράξεις (σελίδα 50)).

Έναρξη

Ο υπολογισμός της διάρκειας του μηχανικού αερισμού ξεκινάει με ένα από τα ακόλουθα γεγονότα:

- **Ενδοτραχειακή διασωλήνωση**

Σε ασθενείς που διασωληνώνονται για μηχανικό αερισμό, ο υπολογισμός της διάρκειας του μηχανικού αερισμού ξεκινάει με τη σύνδεση στον αναπνευστήρα.

Ενίοτε χρειάζεται να αλλαχθεί ο ενδοτραχειακός σωλήνας λόγω μηχανικών προβλημάτων. Η χρονική διάρκεια της απομάκρυνσης και άμεσης αντικατάστασης του ενδοτραχειακού σωλήνα θεωρείται σε αυτήν την περίπτωση μέρος της συνολικής διάρκειας του μηχανικού αερισμού και επομένως ο υπολογισμός της διάρκειας του μηχανικού αερισμού συνεχίζεται κανονικά.

Σε ασθενείς που ο μηχανικός αερισμός ξεκινάει με ενδοτραχειακή διασωλήνωση και στη συνέχεια διενεργείται τραχειοστομία, ο υπολογισμός της διάρκειας του μηχανικού αερισμού ξεκινάει με την ενδοτραχειακή διασωλήνωση. Η διάρκεια του μηχανικού αερισμού μέσω τραχειοστομίας συνυπολογίζεται.

- **Μηχανικός αερισμός με αναπνευστική συσκευή (μάσκα)**

Ο υπολογισμός της διάρκειας του μηχανικού αερισμού ξεκινάει από τη στιγμή της εφαρμογής του.

- **Τραχειοστομία**

(Με άμεση έναρξη μηχανικού αερισμού) Ο υπολογισμός της διάρκειας του μηχανικού αερισμού ξεκινάει από τη στιγμή της εφαρμογής του.

- **Εισαγωγή ενός ασθενή, που βρίσκεται ήδη υπό μηχανικό αερισμό**

Για τους ασθενείς που βρίσκονται ήδη υπό μηχανικό αερισμό κατά την εισαγωγή τους, ο υπολογισμός της διάρκειας του μηχανικού αερισμού ξεκινάει από τη στιγμή της εισαγωγής τους (βλέπε επίσης παρακάτω «ασθενείς που διακομίζονται»).

Λήξη

Ο υπολογισμός της διάρκειας μηχανικού αερισμού τελειώνει με ένα από τα ακόλουθα γεγονότα:

- **Αποσωλήνωση**
- **Τερματισμός του μηχανικού αερισμού μετά από διαδικασία αποδέσμευσης (weaning).**

Παρατήρηση:

Για ασθενείς με τραχειοστομία (μετά από διαδικασία αποδέσμευσης (weaning)) ισχύει:

Σε ασθενείς υπό μηχανικό αερισμό ο τραχειοσωλήνας παραμένει στη θέση του για μερικές ημέρες (ή και περισσότερο π.χ. σε νευρομυϊκά νοσήματα) μετά το τέλος του μηχανικού αερισμού. Σε αυτήν την περίπτωση, ο υπολογισμός της διάρκειας του μηχανικού αερισμού σταματάει κατά τη διακοπή της μηχανικής υποστήριξης.

- **Εξιτήριο, θάνατος ή διακομιδή ενός ασθενή που λαμβάνει μηχανική υποστήριξη της αναπνοής (βλέπε επίσης παρακάτω «ασθενείς που διακομίζονται»).**

Η **μέθοδος αποδέσμευσης (weaning, π.χ. CPAP, SIMV, PSV)** δεν πρέπει να κωδικοποιείται χωριστά.

Η **διάρκεια της διαδικασίας αποδέσμευσης (weaning)** συνυπολογίζεται στη διάρκεια του μηχανικού αερισμού. (συμπεριλαμβανομένων των χρονικών περιόδων εκτός αναπνευστήρα, κατά τη διάρκεια κάθε προσπάθειας αποδέσμευσης). Μπορεί να υπάρξουν πολλαπλές προσπάθειες αποδέσμευσης του ασθενή από τον αναπνευστήρα.

Ο τερματισμός της διαδικασίας αποδέσμευσης **μπορεί να οριστεί μόνο αναδρομικά μετά από την εμφάνιση σταθερής αναπνευστικής κατάστασης του ασθενή.**

Ο ασθενής βρίσκεται σε σταθερή αναπνευστική κατάσταση, όταν αναπνέει πλήρως, αυτόματα και χωρίς μηχανική υποστήριξη, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αυτό το χρονικό διάστημα ορίζεται ως ακολούθως:

- **24 ώρες:** για ασθενείς με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής διάρκειας **έως 7 ημέρες** (συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας αποδέσμευσης)
- **36 ώρες:** για ασθενείς με μηχανική υποστήριξη της αναπνοής διάρκειας **άνω των 7 ημερών** (συμπεριλαμβανομένης και της διαδικασίας αποδέσμευσης)

Για τον υπολογισμό της διάρκειας του μηχανικού αερισμού, ως λήξη της διαδικασίας αποδέσμευσης θεωρείται ο τερματισμός της τελευταίας περιόδου του μηχανικού αερισμού.

Παράδειγμα 1

Ασθενής βρίσκεται υπό μηχανικό αερισμό από τις 05/07. Στις 10/07 και ώρα 12.00 σταματάει η μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, με σκοπό να ξεκινήσει η αναπνευστική φυσιοθεραπεία. Στις 11/07 και ώρα 10.00 επανασυνδέεται ο ασθενής με τον αναπνευστήρα, λόγω αναπνευστικής αστάθειας (πριν τη συμπλήρωση του χρονικού διαστήματος των 24 ωρών που αφορά τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, διάρκειας έως 7 ημερών). Για τον υπολογισμό της συνολικής διάρκειας μηχανικού αερισμού συνυπολογίζεται και το διάστημα από τις 12.00 στις 10/07 έως τις 10/00 στις 11.07, όπου ο ασθενής δεν είναι συνδεδεμένος με τον αναπνευστήρα.

Παράδειγμα 2

Ασθενής βρίσκεται σε μηχανικό αερισμό από τις 05/07. Στις 10/07 και ώρα 12.00 σταματάει η μηχανική υποστήριξη της αναπνοής με σκοπό να ξεκινήσει η αναπνευστική φυσιοθεραπεία. Στις 11/07 στις 12.00, διαπιστώνεται ότι ο ασθενής είναι αναπνευστικά σταθερός και έχει επαρκείς αυτόματες αναπνοές (λήξη του συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος των 24 ωρών που αφορά τη μηχανική υποστήριξη της αναπνοής, διάρκειας έως 7 ημερών). Ο υπολογισμός της διάρκειας μηχανικού αερισμού λήγει στις 10/07, στις 12.00. Αν ο ασθενής ξαναχρηαστεί μηχανικό αερισμό σε κάποια μεταγενέστερη χρονική στιγμή (μετά τις 12.00 στις 11/07), τότε ξεκινάει νέα περίοδος μηχανικού αερισμού.

Στη διαδικασία αποδέσμευσης (weaning) συνυπολογίζονται και τα ενδιάμεσα διαλείμματα υποβοηθούμενου μη επεμβατικού αερισμού και η υποστήριξη της αναπνοής, π.χ. με αναπνευστικές συσκευές CPAP/ASB ή μάσκες CPAP σε εναλλαγή με αυτόματη αναπνοή (χωρίς μηχανική υποστήριξη). Η απλή χορήγηση και εισπνοή οξυγόνου μέσω αναπνευστικών συσκευών ή ενδοτραχειακών καθετήρων δεν συνυπολογίζεται.

Στην ειδική περίπτωση αποδέσμευσης (weaning) με εναλλαγή περιόδων μηχανικής υποστήριξης με μάσκες CPAP και αυτόματων αναπνοών του ασθενή, η διαδικασία αυτή συμπεριλαμβάνεται στη συνολική διάρκεια μηχανικού αερισμού, μόνον εφόσον εφαρμόζονται μάσκες CPAP για συνολικό διάστημα 6 ωρών τουλάχιστον ανά ημερολογιακή ημέρα.

Σε αυτήν την περίπτωση, ο υπολογισμός της συνολικής διάρκειας μηχανικού αερισμού σταματά κατά τη λήξη της τελευταίας εφαρμογής μάσκας CPAP, την τελευταία ημερολογιακή ημέρα κατά την οποία εφαρμόστηκε για τουλάχιστον 6 ώρες συνολικά.

Παράδειγμα 3

Ασθενής βρίσκεται υπό μηχανικό αερισμό από τις 02/07. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αποδέσμευσης, εφαρμόζονται μάσκες CPAP

στις 10/07 για συνολικά 8 ώρες

στις 11/07 για συνολικά 6 ώρες (τελευταία εφαρμογή μάσκας CPAP έληξε στις 22.00)

στις 12/07 για συνολικά 4 ώρες.

Ο υπολογισμός της συνολικής διάρκειας αερισμού, συμπεριλαμβανομένης της περιόδου αποδέσμευσης, λήγει επομένως στις 11/07, στις 22.00.

Ασθενείς που διακομίζονται**Ασθενείς υπό μηχανικό αερισμό ή διασωληνωμένοι**

Όταν διακομίζεται ένας ασθενής που βρίσκεται υπό μηχανικό αερισμό, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι βασικοί κανόνες:

Το νοσοκομείο που διακομίζει τον ασθενή υπολογίζει τη συνολική διάρκεια του μηχανικού αερισμού που εφαρμόστηκε σε αυτό και καταχωρίζει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους κωδικούς ΕΤΙΠ:

- έναν από την κατηγορία 570, για την προσπέλαση για τον μηχανικό αερισμό,
- έναν από τις κατηγορίες 331.01, 331.02, για την τραχειοστομία,
- έναν από την κατηγορία 571.01, για τον μηχανικό αερισμό και την υποστήριξη της αναπνοής σε νεογνά και βρέφη,

εφόσον αυτές οι ιατρικές πράξεις πραγματοποιήθηκαν στο νοσοκομείο που διακομίζει τον ασθενή.

Το νοσοκομείο που παραλαμβάνει τον ασθενή υπολογίζει τη συνολική διάρκεια του μηχανικού αερισμού που εφαρμόστηκε σε αυτό, και επιπλέον για νεογνά πρέπει να καταχωρίζει έναν κωδικό της κατηγορίας 571.01. Δεν καταχωρίζεται κωδικός για την προσπέλαση για τον μηχανικό αερισμό, αφού αυτή πραγματοποιήθηκε στο νοσοκομείο που διακόμισε τον ασθενή.

Όταν διακομίζεται διασωληνωμένος ασθενής, στον οποίο δεν εφαρμόζεται μηχανικός αερισμός, το νοσοκομείο που διακομίζει τον ασθενή πρέπει να καταχωρίζει την προσπέλαση για τον μηχανικό αερισμό (570), επίσης και την τραχειοστομία, αν απαιτείται (331.01, 331.02). Το νοσοκομείο που υποδέχεται τον ασθενή δεν καταχωρίζει ξανά αυτές τις ιατρικές πράξεις, αφού έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

Διασωλήνωση χωρίς εφαρμογή μηχανικού αερισμού

Ένας ασθενής μπορεί να διασωληνωθεί, ακόμα και αν δεν απαιτείται μηχανικός αερισμός, π.χ. όταν είναι απαραίτητο να διατηρηθεί ανοιχτός ο αεραγωγός. Τα παιδιά ενδεχομένως να διασωληνωθούν σε διαγνώσεις όπως άσθμα, croup ή επιληψία και οι ενήλικες σε περιπτώσεις εγκαυμάτων ή σοβαρών τραυμάτων.

1001

Η διασωλήνωση σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καταχωρίζεται με έναν κωδικό της κατηγορίας:

570.00 Διασφάλιση ανοιχτών αεραγωγών

570.01 Απλή ενδοτραχειακή διασωλήνωση

Συνεχής θετική πίεση αεραγωγών (CPAP)

Κωδικοί από τους:

571.01.00 Μηχανικός αερισμός και μηχανική υποστήριξη της αναπνοής σε νεογνά και βρέφη: Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής με συνεχή θετική πίεση αεραγωγού (CPAP)

πρέπει να καταχωρίζονται μόνο σε **νεογνά και βρέφη** ανεξάρτητα από τη διάρκεια θεραπείας (δηλαδή ακόμα και αν αυτή διαρκεί λιγότερο από 24 ώρες). Ειδικά ο κωδικός ΕΤΙΠ 571.01.00.00 καταχωρίζεται μόνο όταν η θεραπεία διαρκεί τουλάχιστον 30 λεπτά.

Η διάρκεια της μηχανικής υποστήριξης της αναπνοής, με συνεχή θετική πίεση αεραγωγών (CPAP) σε νεογνά και βρέφη συνηγορείται στη συνολική διάρκεια του μηχανικού αερισμού.

Όταν αντιμετωπίζεται σε ενήλικες, παιδιά και εφήβους διαταραχή όπως υπνική άπνοια με CPAP, δεν πρέπει να καταχωρίζονται οι κωδικοί των κατηγοριών 571.01.00 και 571.02.00 *Μηχανική υποστήριξη της αναπνοής σε παιδιά και εφήβους με συνεχή θετική πίεση αεραγωγού (CPAP)*, ούτε η διάρκεια μηχανικού αερισμού. Η αρχική εφαρμογή μιας θεραπευτικής αγωγής με μάσκα CPAP ή/και ο έλεγχος ή η βελτιστοποίηση μιας ήδη εφαρμοσμένης αγωγής με CPAP πρέπει να κωδικοποιούνται με έναν κωδικό της κατηγορίας 571.07 *Εγκατάσταση ρινικής ή στοματορινικής συσκευής θετικής πίεσης αεραγωγών, σε διαταραχές αναπνοής που σχετίζονται με τον ύπνο*.

Όταν εφαρμόζεται CPAP ή μάσκες CPAP ως μέθοδοι αποδέσμευσης (weaning), δεν μπορούν να καταχωριστούν οι κωδικοί των κατηγοριών 571.01.00 και 571.02.00. Αντίθετα η εφαρμογή CPAP ως μέθοδος αποδέσμευσης (weaning) συνηγορείται στην ολική διάρκεια μηχανικού αερισμού (βλέπε: ορισμός «μηχανικού αερισμού», «μέθοδος αποδέσμευσης (weaning)», «διάρκεια της διαδικασίας αποδέσμευσης», «λήξη του μηχανικού αερισμού»).

11 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΕΠΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1101 Σκωληκοειδίτις

Για την καταχώριση ενός κωδικού από τις κατηγορίες:

K35.- *Οξεία σκωληκοειδίτιδα*

K36 *Άλλες μορφές σκωληκοειδίτιδας*

K37 *Σκωληκοειδίτιδα, μη καθορισμένη*

επαρκεί η κλινική διάγνωση της σκωληκοειδίτιδας. Δεν είναι απαραίτητη η ιστοπαθολογική επιβεβαίωση αυτής της διάγνωσης.

1102 Συμφύσεις

Η λύση ενδοκοιλιακών συμφύσεων μπορεί να είναι ο πρωτεύων λόγος μιας χειρουργικής επέμβασης («κύρια ιατρική πράξη»), ή να διενεργείται στο πλαίσιο μιας άλλης χειρουργικής επέμβασης («δευτερεύουσα ιατρική πράξη»). Ακόμα και αν η συμφυσιόλυση διενεργηθεί στο πλαίσιο άλλης χειρουργικής επέμβασης κοιλίας, ενδεχομένως να απαιτηθεί σε συγκεκριμένες περιπτώσεις πρόσθετο ιατρικό κόστος. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να καταχωρίζεται για την ύπαρξη των συμφύσεων ένας κωδικός ICD-10-GrM (π.χ. K66.0 *Περιτοναϊκές συμφύσεις*) και για τη λύση αυτών ένας κωδικός ETIP των κατηγοριών:

346.09.01 *Λύση περιτοναϊκών συμφύσεων και ουλώδους ιστού ή*

346.09.02 *Συμφυσιόλυση.*

1103 Έλκος στομάχου με γαστρίτιδα

Για ασθενείς με έλκος στομάχου πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός της κατηγορίας:

K25.- *Γαστρικό έλκος*

ακολουθούμενος από έναν κωδικό της κατηγορίας:

K29.- *Γαστρίτιδα και δωδεκαδακτυλίτιδα,*

εφόσον συνυπάρχουν και τα δύο νοσήματα.

1105 Αιμορραγία πεπτικού

Όταν εισάγεται ασθενής για διερεύνηση αιμορραγίας ανώτερου πεπτικού και ανευρίσκονται κατά την ενδοσκόπηση έλκος, διάβρωση ή κίρσοι, πρέπει να κωδικοποιείται η διαγνωσθείσα νόσος ως «με αιμορραγία». Ένα οξύ έλκος στομάχου με αιμορραγία πρέπει να καταχωρίζεται για παράδειγμα ως:

K25.0 *Γαστρικό έλκος: Οξύ, με αιμορραγία*

1107

Σε περίπτωση οισοφαγίτιδας από παλινδρόμηση με αιμορραγία, πρέπει να καταχωρίζονται οι κωδικοί:

K21.0 *Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση [ΓΟΠ] με οισοφαγίτιδα και*

K22.8 *Άλλα καθορισμένα νοσήματα του οισοφάγου [Αιμορραγία του οισοφάγου ΜΚΑ]*

Η αιμορραγία της βλάβης που αναφέρεται στην έκθεση της ενδοσκόπησης μπορεί να καταχωριστεί, ακόμα και αν αυτή δεν παρατηρείται κατά τη διάρκεια της κλινικής εξέτασης ούτε κατά τη διάρκεια της νοσηλείας.

Δεν διατίθενται για όλες τις κατηγορίες κωδικοποίησης βλαβών πεπτικού κωδικοί με την πρόσθετη περιγραφή «με αιμορραγία». Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να καταχωρίζεται ένας πρόσθετος κωδικός της κατηγορίας:

K92.- *Άλλα νοσήματα του πεπτικού συστήματος*

Σε περιπτώσεις «αιμορραγίας από το ορθό», στις οποίες δεν μπορεί να διαπιστωθεί η εστία ενεργούς αιμορραγίας ή κατά τις οποίες δεν διενεργήθηκε η αντίστοιχη εξέταση, πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός:

K92.2 *Αιμορραγία πεπτικού, μη καθορισμένη*

Ο κωδικός:

K62.5 *Αιμορραγία πρωκτού και ορθού*

δεν μπορεί να καταχωριστεί σε αυτήν την περίπτωση.

Όταν εξετάζεται ένας ασθενής με μέλαινες κενώσεις ή αίμα στα κόπρανα, δεν είναι απαραίτητο η βλάβη που ανευρίσκεται κατά την ενδοσκόπηση να αποτελεί και την αιτία των μέλαινων κενώσεων ή του αίματος στα κόπρανα. Αν δεν υπάρχει αιτιολογική συσχέτιση μεταξύ του συμπτώματος και του αποτελέσματος της εξέτασης, πρέπει να καταχωρίζεται αρχικά το σύμπτωμα και στη συνέχεια το αποτέλεσμα της εξέτασης.

Κάποιες φορές εισάγονται ασθενείς με ιστορικό πρόσφατης αιμορραγίας πεπτικού για ενδοσκόπηση, προκειμένου να διαπιστωθεί η εστία της αιμορραγίας, αλλά κατά την ενδοσκόπηση δεν ανευρίσκεται ενεργή αιμορραγία. Το γεγονός ότι δεν ανευρέθηκε ενεργή αιμορραγία κατά τη διάρκεια της νοσηλείας, δεν αποκλείει την αρχική καταχώριση ενός κωδικού με την περιγραφή «με αιμορραγία», ούτε την καταχώριση ενός κωδικού από την κατηγορία K92.- *Άλλα νοσήματα του πεπτικού συστήματος*, εφόσον προκύπτει σαφής κλινική διάγνωση από το ιστορικό ή από άλλα κλινικά στοιχεία.

1107 Αφυδάτωση σε γαστρεντερίτιδα

Σε περιπτώσεις νοσηλείας για θεραπευτική αντιμετώπιση γαστρεντερίτιδας με αφυδάτωση, πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση η νόσος γαστρεντερίτιδα και η «αφυδάτωση» (E86 *Ελάττωση του όγκου (των υγρών)*) πρέπει να καταχωρίζεται ως δευτερεύουσα διάγνωση.

12 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΔΟΡΙΟΥ ΙΣΤΟΥ

1205 Πλαστική χειρουργική

Η χρήση πλαστικής χειρουργικής μπορεί να οφείλεται σε αισθητικούς ή ιατρικούς λόγους. Σε χειρουργικές επεμβάσεις που υπαγορεύονται από ιατρικούς λόγους, πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση η νοσολογική οντότητα ή/και ο παράγοντας κινδύνου που αποτελεί τον λόγο της επέμβασης.

Όταν η επέμβαση γίνεται για καθαρά αισθητικούς λόγους, πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός του ICD-10-GrM της κατηγορίας Z ως κύρια διάγνωση.

Αποκατάσταση μιας ουλής

Σε περίπτωση αποκατάστασης μιας ουλής, πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός:

L90.5 *Ουλώδεις καταστάσεις και ίνωση του δέρματος*

όταν η επέμβαση αποκατάστασης διενεργείται λόγω προβλημάτων της ουλής (π.χ. άλγος).

Αντίθετα όταν η επέμβαση αποκατάστασης της ουλής γίνεται για αισθητικούς λόγους, πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός:

Z42.- *Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από πλαστική επέμβαση*

Αφαίρεση εμφυτεύματος μαστού

Τα εμφυτεύματα μαστού αφαιρούνται είτε για ιατρικούς είτε για αισθητικούς λόγους.

Όταν η αφαίρεση εμφυτευμάτων μαστού γίνεται για ιατρικούς λόγους, πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός από τους ακόλουθους:

T85.4 *Μηχανική επιπλοκή πρόθεσης και εμφυτεύματος του μαστού*

T85.78 *Λοίμωξη και φλεγμονώδης αντίδραση από άλλες εσωτερικές προθέσεις, εμφυτεύματα και μοσχεύματα*

T85.82 *Ινοκυστικές αλλοιώσεις σε μαστό με πρόθεση ή εμφύτευμα*

T85.88 *Άλλες επιπλοκές εσωτερικών προθέσεων, εμφυτευμάτων και μοσχευμάτων, που δεν ταξινομούνται αλλού*

Όταν η αφαίρεση εμφυτευμάτων μαστού γίνεται για αισθητικούς λόγους, πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός:

Z42.1 *Τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] μετά από πλαστική επέμβαση του μαστού [μαζικού αδένος]*

Προληπτική υποδόρια μαστεκτομή

Αυτή η επέμβαση διενεργείται σε περιπτώσεις όπως π.χ. θετικό οικογενειακό ιστορικό καρκίνου του μαστού, χρόνιο άλγος, χρόνια λοίμωξη, λοβώδες καρκίνωμα του άλλου

1205

μαστού, καρκίνωμα μαστού in situ ή ινοκυστική μαστοπάθεια. Αυτές οι περιπτώσεις πρέπει να κωδικοποιούνται ως κύρια διάγνωση.

13 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΤΙΚΟΥ ΙΣΤΟΥ

Δεν υπάρχουν προς το παρόν ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες για το κεφάλαιο 13.

14 ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

1401 Αιμοκάθαρση

Διαγνώσεις

Η κύρια διάγνωση, σε ασθενείς που εισάγονται ειδικά για αιμοκάθαρση, εξαρτάται από τη διάρκεια της νοσηλείας τους.

α) Για **ημερήσια νοσηλεία** (εισιτήριο και εξιτήριο την ίδια ημέρα, ή την αμέσως επόμενη ημέρα, σε περίπτωση νυχτερινής αιμοκάθαρσης) πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση ο κωδικός:

Z49.1 *Εξωσωματική αιμοκάθαρση*

Επιπλέον πρέπει να καταχωρίζεται ως δευτερεύουσα διάγνωση το υποκείμενο νόσημα.

β) Για **νοσηλεία περισσότερων ημερών** (εξιτήριο την επόμενη ημέρα της εισαγωγής ή αργότερα), πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση το υποκείμενο νόσημα που ευθύνεται για τη νοσηλεία. Οι κωδικοί Z49.1 *Εξωσωματική αιμοκάθαρση* και Z99.2 *Χρόνια εξάρτηση από αιμοκάθαρση* δεν μπορούν να καταχωριστούν.

Ιατρικές πράξεις

Στους κωδικούς για **συνεχή** αιμοδιήθηση (585.03.01, .07, .08, αιμοκάθαρση (585.04.06, .07), αιμοδιαδιήθηση (585.05.01, .07, .08) και περιτοναϊκή κάθαρση (585.07.01, .02), πρέπει να κωδικοποιείται η διάρκεια της διαδικασίας στην 6^η υποδιαίρεση.

Η διάρκεια υπολογίζεται από την αρχή έως το τέλος της διαδικασίας. Σε πολλαπλές συνεδρίες (αιμοδιήθησης, αιμοκάθαρσης, κ.ο.κ.) κατά τη διάρκεια μιας νοσηλείας πρέπει να κωδικοποιείται κάθε επιμέρους συνεδρία χωριστά (δεν αθροίζονται οι ώρες συνεδριών). Διακοπή λόγω αλλαγής φίλτρου ή λόγω τεχνικών ζητημάτων, όπως και διακοπή διάρκειας μικρότερης των 24 ωρών, δεν δικαιολογεί εκ νέου κωδικοποίηση της συνεδρίας.

1403 Πρωκτογεννητικά οξυτενή κονδυλώματα

Οι εισαγωγές ενός ασθενούς για αντιμετώπιση πρωκτογεννητικών οξυτενών κονδυλωμάτων πρέπει να κωδικοποιούνται με μια κύρια διάγνωση από τον ακόλουθο πίνακα:

περιπρωκτικά	K62.8	<i>Άλλα καθορισμένα νοσήματα του πρωκτού και του ορθού</i>
τραχήλου μήτρας	N88.8	<i>Άλλα καθορισμένα μη φλεγμονώδη νοσήματα του τραχήλου της μήτρας</i>
γυναικείου κόλπου	N89.8	<i>Άλλα καθορισμένα μη φλεγμονώδεις παθήσεις του κόλπου</i>
αιδοίου	N90.8	<i>Άλλα καθορισμένα μη φλεγμονώδη νοσήματα του αιδοίου και του περινέου</i>
πέους	N48.8	<i>Άλλα καθορισμένα νοσήματα του πέους</i>

1406

Ο κωδικός:

A63.0 *Οξυτενή κονδυλώματα του πρωκτού και των γεννητικών οργάνων (αφροδίσια)*

πρέπει να καταχωρίζεται ως δευτερεύουσα διάγνωση.

1406 Επεμβάσεις αποκατάστασης σε ακρωτηριασμό γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM)

Ορισμός

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει τον «ακρωτηριασμό των γυναικείων γεννητικών οργάνων» ως εξής:

Όλες οι διαδικασίες που περιλαμβάνουν τη μερική ή ολική αφαίρεση των εξωτερικών γυναικείων γεννητικών οργάνων ή άλλους τραυματισμούς των γυναικείων γεννητικών οργάνων είτε για πολιτιστικούς είτε για άλλους μη θεραπευτικούς λόγους.

Κωδικοποίηση

Κατά την κωδικοποίηση, πρέπει να καταχωρίζονται τα νοσήματα εξαιτίας των οποίων απαιτείται η επέμβαση αποκατάστασης.

Αν δεν υφίσταται συγκεκριμένο νόσημα, πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση ο κωδικός:

N90.8 *Άλλες καθορισμένες μη φλεγμονώδεις παθήσεις του αιδοίου και του περινέου*

15 ΚΥΗΣΗ, ΤΟΚΕΤΟΣ ΚΑΙ ΛΟΧΕΙΑ

1501 Ορισμός γέννησης ζώντος και θνησιγενούς νεογνού, αποβολής

Ζων νεογνό

Ζων νεογνό είναι το προϊόν της σύλληψης, το οποίο εξέρχεται της μήτρας και εμφανίζει μετά τον τοκετό αναπνοή ή κάποιο άλλο σημείο ζωής, όπως καρδιακό παλμό, αιματική ροή ομφάλιου λώρου ή εμφανή κίνηση των ραβδωτών μυών, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της κύησης και την απολίνωση του ομφάλιου λώρου ή την αποκόλληση του πλακούντα. Κάθε νεογνό που πληροί αυτές τις προϋποθέσεις θεωρείται ζωντανό νεογνό.

- (1) Γέννηση ζώντος νεογνού, για το οποίο ισχύουν οι γενικές διατάξεις καταχώρισης και καταγραφής των γεννήσεων, θεωρείται κάθε περίπτωση όπου, μετά τον αποχωρισμό από τη μητέρα, υπάρχει καρδιακός ρυθμός ή αιματική ροή ομφάλιου λώρου ή φυσιολογική αναπνευστική λειτουργία.

Εμβρυϊκός θάνατος [έμβρυο που γεννήθηκε νεκρό]

Εμβρυϊκός θάνατος είναι ο θάνατος ενός προϊόντος σύλληψης πριν από τον αποχωρισμό του από τη μητέρα, ανεξάρτητα από τη διάρκεια της κύησης. Ο θάνατος επιβεβαιώνεται όταν το κύημα μετά τον αποχωρισμό από τη μητέρα δεν αναπνέει, ούτε έχει άλλες ενδείξεις ζωής, όπως π.χ. καρδιακό παλμό, αιματική ροή ομφάλιου λώρου ή εμφανή κίνηση των ραβδωτών μυών.

- (2) Νεογνό χωρίς καμία από τις αναγραφόμενες στην παρ. 1 ενδείξεις ζωής, με βάρος γέννησης τουλάχιστον 500gr, θεωρείται θνησιγενές ή νεκρό κατά τη γέννηση.
- (3) Κύημα χωρίς καμία από τις αναγραφόμενες στην παρ.1 ενδείξεις ζωής, με βάρος γέννησης μικρότερο των 500gr, θεωρείται προϊόν αποβολής. Δεν καταγράφεται από την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία.

(ICD-10-GrM Τόμος II, Εγχειρίδιο οδηγιών, Κεφάλαιο 5.7.1)

1504 Επιπλοκές μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση (O08.–)

Ένας κωδικός της κατηγορίας:

O08.– *Επιπλοκές μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση*

πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση μόνο αν η ασθενής εισάγεται λόγω απώτερης επιπλοκής μετά από προηγηθείσα αποβολή.

1504

Παράδειγμα 1

Μια ασθενής εισάγεται με διάχυτη ενδαγγειακή πήξη μετά από προκλητή αποβολή τη 10^η εβδομάδα εγκυμοσύνης, η οποία πραγματοποιήθηκε προ διημέρου σε άλλο νοσοκομείο.

Κύρια διάγνωση: 008.1 *Όψιμη ή σοβαρή αιμορραγία μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση*

Η διάρκεια της κύησης δεν πρέπει να κωδικοποιείται ως δευτερεύουσα διάγνωση, εφόσον η εισαγωγή πραγματοποιήθηκε για αντιμετώπιση μιας επιπλοκής προηγηθείσας προκλητής αποβολής.

Ένας κωδικός της κατηγορίας:

008.– *Επιπλοκές μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση*

πρέπει να καταχωρίζεται ως **δευτερεύουσα διάγνωση**, για να κωδικοποιήσει μια επιπλοκή που σχετίζεται με τους κωδικούς των κατηγοριών 000–002 (*εξωμήτριος κύηση, μύλη κύηση, άλλα παθολογικά προϊόντα σύλληψης*).

Παράδειγμα 2

Μια ασθενής εισάγεται σε καταπληξία λόγω ρήξης σαλπινγικής κύησης, στην 6^η εβδομάδα κύησης.

Κύρια διάγνωση: 000.1 *Σαλπινγική κύηση*

Δευτερεύουσες διαγνώσεις: 008.3 *Καταπληξία [shock] μετά από αποβολή, εξωμήτριο και μύλη κύηση*

009.1! *Διάρκεια [ηλικία] κύησης: 5 έως και 13 ολοκληρωμένες εβδομάδες*

Όταν εισάγεται μια ασθενής λόγω κατακράτησης τμήματος του πλακούντα μετά από προηγηθείσα ατελή αποβολή, πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση μια **ατελής αποβολή με επιπλοκές** (003–006 και στον 4^ο χαρακτήρα το «0» έως «3»).

Παράδειγμα 3

Μια ασθενής εισάγεται με αιμορραγία λόγω κατακράτησης τμήματος του πλακούντα, δύο εβδομάδες μετά από αυτόματη αποβολή. Η αποβολή συνέβη στην 5η εβδομάδα κύησης και αντιμετωπίστηκε στο τμήμα ημερήσιας νοσηλείας.

Κύρια διάγνωση: 003.1 *Αυτόματη αποβολή: Ατελής, επιπλεγμένη από όψιμη ή σοβαρή αιμορραγία*

Η διάρκεια εγκυμοσύνης δεν πρέπει να κωδικοποιείται ως δευτερεύουσα διάγνωση, εφόσον η εισαγωγή πραγματοποιήθηκε για αντιμετώπιση επιπλοκής μιας ατελούς αποβολής.

Ένας κωδικός της κατηγορίας:

008.– Επιπλοκές μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση

πρέπει να καταχωρίζεται σε συνδυασμό με τους κωδικούς των κατηγοριών 003–007 ως **δευτερεύουσα διάγνωση**, για να είναι πιο συγκεκριμένη η κωδικοποίηση (σύγκρινε παράδειγμα 3 με παράδειγμα 4).

Παράδειγμα 4

Μια ασθενής εισάγεται με καταπληξία λόγω ατελούς αποβολής στη 12^η εβδομάδα κύησης.

Κύρια διάγνωση:	003.3	<i>Αυτόματη αποβολή: Ατελής, με άλλες μη καθορισμένες επιπλοκές</i>
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	008.3	<i>Καταπληξία [shock] μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση</i>
	009.1!	<i>Διάρκεια [ηλικία] κύησης: 5 έως και 13 ολοκληρωμένες εβδομάδες</i>

1505 Πρόωρος τερματισμός της κύησης

Σε περίπτωση που η κύηση πρέπει να τερματιστεί πρόωρα π.χ. για ιατρικούς λόγους, τότε ισχύουν οι ακόλουθες κατευθυντήριες οδηγίες:

- Όταν η κύηση τερματίζεται ως προκλητή **αποβολή** (βάρος κυήματος μικρότερο των 500g, χωρίς σημεία ζωής), πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός της κατηγορίας:

004.– Προκλητή αποβολή

ως κύρια διάγνωση, μαζί με έναν κωδικό της κατηγορίας

009.–! Διάρκεια [ηλικία] κύησης

και έναν κωδικό που να αποδίδει την αιτία του τερματισμού, όπως π.χ.:

035.0 Περιθάλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) διαμαρτίας διάπλασης του κεντρικού νευρικού συστήματος του εμβρύου.

- Όταν η κύηση τερματίζεται πρόωρα με **γέννηση θνησιγενούς νεογνού** (βάρος κυήματος τουλάχιστον 500g, χωρίς ενδείξεις ζωής), πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση η αιτία για τον τερματισμό της κύησης, όπως π.χ.:

035.0 Περιθάλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) διαμαρτίας διάπλασης του κεντρικού νευρικού συστήματος του εμβρύου.

Ως δευτερεύουσες διαγνώσεις πρέπει να καταχωρίζονται ένας από τους κωδικούς:

1506

060.1 *Πρόωρες (αυτόματες) ωδίνες με πρόωρο τοκετό ή*

060.3 *Πρόωρος τοκετός χωρίς αυτόματες ωδίνες*

μαζί με έναν κωδικό της κατηγορίας:

009.-! *Διάρκεια [ηλικία] κύησης*

όπως και ο κωδικός:

Z37.1! *Τοκετός ενός θνησιγενούς νεογνού (ή ο αντίστοιχος κωδικός για πολύδυμη κύηση).*

3. Όταν η κύηση τερματίζεται πρόωρα με **γέννηση ζώντος νεογνού**, πρέπει να καταχωρίζεται η αιτία του τερματισμού της κύησης ως κύρια διάγνωση, π.χ.:

035.0 *Περίθαλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) διαμαρτίας διάπλασης του κεντρικού νευρικού συστήματος του εμβρύου*

Ως δευτερεύουσες διαγνώσεις πρέπει να καταχωρίζονται ένας από τους κωδικούς:

060.1 *Πρόωρες (αυτόματες) ωδίνες με πρόωρο τοκετό ή*

060.3 *Πρόωρος τοκετός χωρίς αυτόματες ωδίνες*

μαζί με έναν κωδικό της κατηγορίας:

009.-! *Διάρκεια [ηλικία] κύησης*

όπως και ο κωδικός:

Z37.0! *Τοκετός ενός ζώντος νεογνού (ή ο αντίστοιχος κωδικός για πολύδυμη κύηση).*

1506 **Αυτόματος κολπικός τοκετός μονόδυμης κύησης**

Ο κωδικός **080 Αυτόματος τοκετός**

πρέπει να καταχωρίζεται αποκλειστικά σε αυτόματο κολπικό τοκετό μονόδυμης κύησης:

χωρίς ύπαρξη ανωμαλιών ή επιπλοκών που περιγράφονται σε άλλα σημεία του κεφαλαίου XV «Κύηση, τοκετός και λοχεία» και

χωρίς μαιευτικούς χειρισμούς ή εμβρυουλκία ή σικουουλκία.

Οι μοναδικές μαιευτικές ιατρικές πράξεις που μπορούν να συνδυαστούν με την κύρια διάγνωση **080 Φυσιολογικός τοκετός ενός νεογνού** είναι οι ακόλουθες:

591.00 *Επισκληρίδια παρακέντηση και έγχυση για αντιμετώπιση πόνου*

373.00 *Τεχνητή ρήξη υμένων [αμνιοτομή]*

373.08.00 *Επισιοτομή*

626.00 *Παρακολούθηση και εκτέλεση φυσιολογικού τοκετού*

626.01 *Παρακολούθηση και εκτέλεση τοκετού υψηλού κινδύνου*

Παρατήρηση: Η διάγνωση O80 μπορεί να συνδυαστεί με τον κωδικό 626.01, μόνο υπό την προϋπόθεση, ότι ο τοκετός υψηλού κινδύνου καταλήγει σε αυτόματο κολπικό τοκετό χωρίς επιπλοκές.

Παράδειγμα 1

Αυτόματος κολπικός τοκετός υγιούς νεογνού στην 39^η εβδομάδα κύησης, με ακεραιότητα του περινέου.

Κύρια διάγνωση:	O80	Φυσιολογικός τοκετός ενός νεογνού
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	O09.6!	Διάρκεια [ηλικία] κύησης: 37 έως και 41 ολοκληρωμένες εβδομάδες
	Z37.0!	Τοκετός ενός ζώντος νεογνού
Ιατρική πράξη:	626.00	Παρακολούθηση και εκτέλεση φυσιολογικού τοκετού

1507 Έκβαση

Από το νοσοκομείο στο οποίο έλαβε χώρα ο **κάθε** τοκετός, πρέπει να καταχωρίζεται για τη μητέρα ο αντίστοιχος κωδικός της κατηγορίας:

Z37.-! Έκβαση τοκετού

Αυτός ο κωδικός δεν μπορεί να αποτελεί την κύρια διάγνωση.

1508 Διάρκεια της κύησης

Κατά την εισαγωγή της μητέρας στο νοσοκομείο, πρέπει να καταχωρίζεται (στον ιατρικό της φάκελο) ένας κωδικός της κατηγορίας:

O09.-! Διάρκεια [ηλικία] κύησης

για την κωδικοποίηση της διάρκειας [ηλικίας] κύησης.

Σε περίπτωση εισαγωγής για αντιμετώπιση επιπλοκών από προηγουμένως αντιμετωπισθείσα αποβολή, **δεν** πρέπει να κωδικοποιείται η διάρκεια [ηλικία] της κύησης.

1509 Τοκετός σε πολύδυμη κύηση

Όταν μια πολύδυμη κύηση οδηγεί σε αυτόματο τοκετό π.χ. διδύμων, πρέπει να καταχωρίζονται οι κωδικοί:

O30.0 Δίδυμη κύηση

Z37.2! Τοκετός διδύμων, αμφότερα γεννημένα ζώντα

626.01 Παρακολούθηση και διενέργεια τοκετού υψηλού κινδύνου.

Σε περίπτωση που τα νεογνά πολύδυμης κύησης γεννιούνται με διαφορετική μέθοδο το καθένα, τότε πρέπει να κωδικοποιούνται και οι δύο μέθοδοι τοκετού.

1510

Παράδειγμα 1

Πρώτος τοκετός διδύμων στην 35^η εβδομάδα κύησης, το πρώτο από τα δίδυμα γεννιέται με εξελκυσμό από ισχιακή προβολή, το δεύτερο με «κλασική καισαρική τομή» (διατομή του ισθμού της μήτρας), λόγω δυστοκίας, σε εγκάρσιο σχήμα.

Κύρια διάγνωση:	O64.8	<i>Δυστοκία που οφείλεται σε άλλη ανώμαλη θέση, σχήμα και προβολή του εμβρύου</i>
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	O32.5	<i>Περίθαλψη της μητέρας για πολύδυμη κύηση με ανώμαλη προβολή ή θέση ενός ή περισσότερων εμβρύων</i>
	O30.0	<i>Δίδυμη κύηση</i>
	O60.1	<i>Πρώρες (αυτόματες) ωδίνες με πρόωρο τοκετό</i>
	O09.5!	<i>Διάρκεια (ηλικία) κύησης: 34 έως και 36 ολοκληρωμένες εβδομάδες</i>
	Z37.2!	<i>Τοκετός διδύμων, αμφοτέρα γεννημένα ζώντα</i>
Ιατρικές πράξεις:	372.07.01	<i>Αυτόματος και κοιλιακός επεμβατικός τοκετός σε ισχιακή προβολή εμβρύου: Υποβοηθούμενος τοκετός με ειδικούς χειρισμούς του μαιευτήρα</i>
	374.00.01	<i>Κλασική καισαρική τομή: Δευτερογενής</i>

1510 Επιπλοκές κατά την κύηση

Στο κεφάλαιο XV περιλαμβάνονται δύο ομάδες κωδικών για την κωδικοποίηση επιπλοκών της κύησης:

O20–O29 Άλλα νοσήματα της μητέρας που σχετίζονται κυρίως με την κύηση και

O94–O99 Άλλες νοσολογικές οντότητες κατά την περίοδο της κύησης, που δεν ταξινομούνται αλλού.

Καταστάσεις που σχετίζονται κυρίως με την κύηση πρέπει να κωδικοποιούνται με ειδικούς κωδικούς της ομάδας O20–O29.

Παράδειγμα 1

Μια ασθενής εισάγεται στην 30^η εβδομάδα κύησης, για αντιμετώπιση συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα, το οποίο επιδεινώθηκε λόγω της κύησης.

Κύρια διάγνωση: O26.82 *Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα κατά την κύηση*
 Δευτερεύουσα διάγνωση: O09.4! *Διάρκεια [ηλικία] κύησης: 26 έως και 33 ολοκληρωμένες εβδομάδες*

Η επιδείνωση του συνδρόμου καρπιαίου σωλήνα λόγω κύησης περιγράφεται με ειδικό κωδικό από το κεφάλαιο XV (O26.– *Περίθαλψη της μητέρας για άλλες καταστάσεις που σχετίζονται κυρίως με την κύηση*). Ο κωδικός αυτός επαρκεί για την ακριβή καταχώριση της διάγνωσης.

Διάχυτες ενοχλήσεις και συμπτώματα κατά την κύηση, για τα οποία δεν ανευρίσκεται συγκεκριμένη αιτία, πρέπει να καταχωρίζονται με τον κωδικό:

O26.88 *Άλλες καθορισμένες καταστάσεις που σχετίζονται με την κύηση.*

Για την καταχώριση άλλων επιπλοκών της κύησης (ή καταστάσεων που επιδεινώνονται στην κύηση ή που αποτελούν την κύρια αιτία μαιευτικών χειρισμών) διατίθενται οι κωδικοί:

O98.– *Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα της μητέρας που ταξινομούνται αλλού, αλλά επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία*

και

O99.– *Άλλα νοσήματα της μητέρας που ταξινομούνται αλλού αλλά επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία,*

οι οποίοι πρέπει να καταχωρίζονται σε συνδυασμό με κωδικούς δευτερεύουσας διάγνωσης από άλλα κεφάλαια του ICD-10-GM, προκειμένου να αποδοθεί η υποκείμενη νόσος (βλέπε παραδείγματα 2 και 3).

Παράδειγμα 2

Κύηση (30^η εβδομάδα κύησης), επιλεγμένη με σιδηροπενία.

Κύρια διάγνωση: O99.0 *Αναιμία που επιπλέκει την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία*

Δευτερεύουσες διαγνώσεις: D50.9 *Σιδηροπενική αναιμία, μη καθορισμένη*
 O09.4! *Διάρκεια [ηλικία] κύησης: 26 έως και 33 ολοκληρωμένες εβδομάδες*

Η αναιμία που επιπλέκει την κύηση πρέπει να καταχωρίζεται με τον κωδικό O99.0. Απαιτείται πρόσθετος κωδικός για την καταχώριση του είδους της αναιμίας.

1511

Παράδειγμα 3

Μια ασθενής στην 30^η εβδομάδα κύησης εισάγεται λόγω αλλεργικού βρογχικού άσθματος που επιπλέκει την κύηση.

Κύρια διάγνωση: O99.5 *Νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος που επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία*

Δευτερεύουσες διαγνώσεις: J45.0 *Κυρίως αλλεργικό βρογχικό άσθμα*
O09.4! *Διάρκεια [ηλικία] κύησης: 26 έως και 33 ολοκληρωμένες εβδομάδες*

Κύηση ως συνυπάρχουσα κατάσταση

Όταν εισάγεται μια ασθενής λόγω νοσήματος, το οποίο ούτε επιπλέκει την κύηση, ούτε επιπλέκεται από αυτήν, τότε πρέπει να καταχωρίζεται το νόσημα αυτό ως κύρια διάγνωση, με την ακόλουθη δευτερεύουσα διάγνωση:

Z34 *Παρακολούθηση φυσιολογικής κύησης*

Παράδειγμα 4

Μια ασθενής που βρίσκεται στην 30^η εβδομάδα κύησης εισάγεται με κάταγμα μετακάρπιου οστού.

Κύρια διάγνωση: S62.32 *Κάταγμα άλλου μετακάρπιου οστού: Διάφυση*

Δευτερεύουσες διαγνώσεις: Z34 *Επίβλεψη φυσιολογικής κύησης*
O09.4! *Διάρκεια (ηλικία) κύησης: 26 έως και 33 ολοκληρωμένες εβδομάδες*

1511 Προσδιορισμός της κύριας διάγνωσης σε περίπτωση τοκετού

Σε περίπτωση που διενεργείται τοκετός κατά τη διάρκεια νοσηλείας οφειλόμενης σε άλλη νοσολογική οντότητα, πρέπει να γίνονται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:

- Αν η θεραπευτική αντιμετώπιση του αρχικού νοσήματος διήρκεσε **περισσότερο από επτά ημερολογιακές ημέρες** πριν τον τοκετό, ως κύρια διάγνωση πρέπει να καταχωρίζεται το αρχικό νόσημα.
- Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ως κύρια διάγνωση πρέπει να καταχωρίζεται η διάγνωση που αναφέρεται στον τοκετό.

1512 Ανώμαλη προβολή και θέση εμβρύου

Οι ανώμαλες εμβρυϊκές προβολές και θέσεις **κατά τον τοκετό** πρέπει να κωδικοποιούνται.

Σε κύηση, π.χ. ισχιακής προβολής με δυστοκία πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση ο κωδικός:

064.1 *Δυστοκία που οφείλεται σε ισχιακή προβολή*

ή σε αυτόματο τοκετό χωρίς δυστοκία πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός:

032.1 *Περίθαλψη της μητέρας λόγω ισχιακή προβολή του εμβρύου.*

Οι ινιακές προβολές όπως η πρόσθια, οπίσθια, πλάγια και διαγώνια ινιακή προβολή πρέπει να καταχωρίζονται μόνον εφόσον ακολουθεί ιατρική επέμβαση.

Ο κωδικός 080 (*Φυσιολογικός τοκετός ενός νεογνού*) δεν πρέπει να καταχωρίζεται.

1514 Μειωμένες εμβρυϊκές κινήσεις

Σε περίπτωση εισαγωγής της ασθενούς, με τη διάγνωση «μειωμένες εμβρυϊκές κινήσεις», πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός:

036.8 *Περίθαλψη της μητέρας λόγω άλλων καθορισμένων επιπλοκών του εμβρύου*

όταν δεν είναι γνωστή η υποκείμενη αιτία.

Η υποκείμενη αιτία των μειωμένων εμβρυϊκών κινήσεων πρέπει ωστόσο να κωδικοποιείται, εφόσον είναι γνωστή. Σε αυτήν την περίπτωση δεν πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός 036.8.

1515 Ουλή μήτρας

Ο κωδικός 034.2 *Περίθαλψη της μητέρας για ουλή της μήτρας από προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση* πρέπει να καταχωρίζεται όταν:

- η ασθενής εισάγεται για προγραμματισμένη καισαρική τομή λόγω προηγηθείσας καισαρικής τομής
- η προσπάθεια κοιλιακού τοκετού αποτυγχάνει λόγω ουλής της μήτρας (π.χ. καισαρική τομή ή άλλη χειρουργική τομή) και η ασθενής οδηγείται σε καισαρική τομή
- η υφιστάμενη ουλή μήτρας απαιτεί ιατρική αντιμετώπιση, αλλά ο τοκετός δεν διενεργείται κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας, π.χ. ιατρική παρακολούθηση πριν τον τοκετό λόγω άλγους μήτρας εξαιτίας υφιστάμενης ουλής.

1518 Τοκετός πριν από την εισαγωγή της μητέρας

Σε περίπτωση που ο τοκετός επισυμβεί πριν από την άφιξη της μητέρας στο νοσοκομείο και δεν διενεργείται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας καμία ιατρική πράξη που σχετίζεται με τον τοκετό, ούτε προκύπτουν επιπλοκές της μητέρας κατά τη λοχεία, πρέπει να καταχωρίζεται ο αντίστοιχος κωδικός της κατηγορίας:

Z39.- *Περίθαλψη μετά τον τοκετό και εξέταση*

Σε περίπτωση που μια **επιπλοκή** απαιτεί νοσηλεία, αυτή πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση και επιπλέον πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός της κατηγορίας Z39.-.

1519

Σε περίπτωση που το νεογνό ασθενεί και χρειάζεται να διακομιστεί σε άλλο νοσοκομείο, η δε μητέρα μεταφέρεται μαζί του ως συνοδό μέλος και λαμβάνει εκεί τη συνήθη περίθαλψη μετά τον τοκετό, τότε πρέπει και από το δεύτερο νοσοκομείο να καταχωρίζεται επιπλέον ο αντίστοιχος κωδικός της κατηγορίας Z39.-.

Σε περίπτωση που η μητέρα διακομιστεί από ένα νοσοκομείο σε άλλο για περίθαλψη μετά από καισαρική τομή, χωρίς να υπάρχει κατάσταση που να πληροί τον ορισμό της κύριας ή δευτερεύουσας διάγνωσης, τότε πρέπει να καταχωρίζεται στο δεύτερο νοσοκομείο ο αντίστοιχος κωδικός της κατηγορίας Z39.- ως κύρια διάγνωση και ο κωδικός:

Z48.8 Άλλη καθορισμένη χειρουργική τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up] ως δευτερεύουσα διάγνωση.

1519 Πρόωρος τοκετός, πρόωρες ωδίνες και ψευδής έναρξη τοκετού

Ο τοκετός (αυτόματος, προκλητός ή με καισαρική τομή) που επισυμβαίνει πριν τη συμπλήρωση της 37^{ης} εβδομάδας κύησης (πρόωρος τοκετός) πρέπει να καταχωρίζεται με τους κωδικούς:

O60.1 Πρόωρες (αυτόματες) ωδίνες με πρόωρο τοκετό, ή

O60.3 Πρόωρος τοκετός χωρίς αυτόματες ωδίνες.

Η αιτία του πρόωρου τοκετού πρέπει να κωδικοποιείται, εφόσον είναι γνωστή, ως κύρια διάγνωση, ακολουθούμενη από τους κωδικούς O60.1 ή O60.3 ως δευτερεύουσα διάγνωση. Αν δεν είναι γνωστή η αιτία του πρόωρου τοκετού, πρέπει να καταχωρίζονται οι O60.1 ή O60.3 ως κύριοι κωδικοί.

Επιπλέον, πρέπει να καταχωρίζεται ως δευτερεύουσα διάγνωση, ένας κωδικός της κατηγορίας:

O09.-| Διάρκεια [ηλικία] κύησης.

Πρόωρες ωδίνες που έχουν επίδραση στη διαστολή του τραχήλου της μήτρας, πριν τη συμπλήρωση της 37^{ης} εβδομάδας κύησης, και που οδηγούν σε τελειόμηνο τοκετό στην ίδια νοσηλεία, πρέπει να καταχωρίζονται με τον κωδικό:

O60.2 Πρόωρες ωδίνες με τελειόμηνο τοκετό.

Η αιτία των πρόωρων ωδίνων, εφόσον είναι γνωστή, πρέπει να κωδικοποιείται ως κύρια διάγνωση, ακολουθούμενη από τον κωδικό O60.2 ως δευτερεύουσα διάγνωση. Αν δεν είναι γνωστή η αιτία των πρόωρων ωδίνων, πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός O60.2 ως κύρια διάγνωση.

Επιπλέον πρέπει να καταχωρίζεται, ως δευτερεύουσα διάγνωση, ένας κωδικός της κατηγορίας:

O09.-| Διάρκεια [ηλικία] κύησης.

Πρόωρες ωδίνες που έχουν επίδραση στη διαστολή του τραχήλου της μήτρας πριν τη συμπλήρωση της 37^{ης} εβδομάδας κύησης, και που δεν οδηγούν σε τελειόμηνο τοκετό στην ίδια νοσηλεία, πρέπει να καταχωρίζονται με τον κωδικό:

O60.0 Πρόωρες ωδίνες χωρίς τοκετό

Η αιτία των πρόωρων ωδίνων, εφόσον είναι γνωστή, πρέπει να κωδικοποιείται ως κύρια διάγνωση, ακολουθούμενη από τον κωδικό O60.0 ως δευτερεύουσα διάγνωση. Αν δεν είναι γνωστή η αιτία των πρόωρων ωδίνων, πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός O60.0 ως κύρια διάγνωση.

Επιπλέον, πρέπει να καταχωρίζεται ως δευτερεύουσα διάγνωση ένας κωδικός της κατηγορίας:

O09.-! *Διάρκεια [ηλικία] κύησης*

Σε εισαγωγές με ωδίνες που δεν έχουν επίδραση στη διαστολή του τραχήλου της μήτρας (ψευδής τοκετός) πρέπει να καταχωρίζονται οι κωδικοί:

O47.0 *Ψευδής έναρξη τοκετού πριν τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης ή*

O47.1 *Ψευδής έναρξη τοκετού μετά τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης.*

Η αιτία του ψευδούς τοκετού, εφόσον είναι γνωστή, πρέπει να κωδικοποιείται ως κύρια διάγνωση, ακολουθούμενη από τον κωδικό της κατηγορίας O47.- ως δευτερεύουσα διάγνωση. Αν δεν είναι γνωστή η αιτία του ψευδούς τοκετού, πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός της κατηγορίας O47.- ως κύρια διάγνωση.

Συμπληρωματικά προς τον κωδικό O47.0 *Ψευδής έναρξη τοκετού πριν τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης*, πρέπει να καταχωρίζεται, ως δευτερεύουσα διάγνωση, ένας κωδικός της κατηγορίας:

O09.-! *Διάρκεια [ηλικία] κύησης*

1520 Αύξηση χρονικής διάρκειας και παράταση κύησης

Ο κωδικός O48 *Παράταση της κύησης*

πρέπει να καταχωρίζεται όταν ο τοκετός επισυμβαίνει μετά τη συμπλήρωση της 41^{ης} εβδομάδας κύησης, ή όταν το νεογνό εμφανίζει σαφή στοιχεία παρατασικού νεογνού.

Παράδειγμα 1

Ο τοκετός ενός νεογνού επισυμβαίνει την 42^η εβδομάδα κύησης.

Κύρια διάγνωση:	O48	<i>Παράταση της κύησης</i>
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	Z37.0!	<i>Τοκετός ενός ζώντος νεογνού</i>
	O09.7!	<i>Διάρκεια [ηλικία] κύησης: Περισσότερες από 41 ολοκληρωμένες εβδομάδες</i>
Ιατρική πράξη:	626.01	<i>Παρακολούθηση και εκτέλεση τοκετού υψηλού κινδύνου</i>

1521

Παράδειγμα 2

Ο τοκετός ενός νεογνού επισυμβαίνει την 40^η εβδομάδα κύησης. Το νεογνό εμφανίζει σαφή στοιχεία παρατασικού νεογνού.

Κύρια διάγνωση:	O48	<i>Παράταση της κύησης</i>
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	Z37.0!	<i>Τοκετός ενός ζώντος νεογνού</i>
	O09.6!	<i>Διάρκεια [ηλικία] κύησης: 37 έως και 41 ολοκληρωμένες εβδομάδες</i>
Ιατρική πράξη:	626.01	<i>Παρακολούθηση και εκτέλεση τοκετού υψηλού κινδύνου</i>

1521 Παρατεταμένος τοκετός

Σε περίπτωση πρόκλησης τεχνητών ωδίνων στο νοσοκομείο, ο τοκετός θεωρείται παρατεταμένος όταν δεν περατώνεται μετά από **18 ώρες** τακτικών ωδίνων. Η καταχώριση γίνεται με έναν από τους ακόλουθους κωδικούς:

O63.– *Παρατεταμένος τοκετός*

O75.5 *Παράταση τοκετού μετά από τεχνητή ρήξη των εμβρυϊκών υμένων*

O75.6 *Παράταση τοκετού μετά από αυτόματη ή μη καθορισμένη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων*

1524 Παράταση της φάσης εξώθησης σε επισκληρίδια αναισθησία

Η επισκληρίδια αναισθησία μπορεί να παρατείνει τη φάση εξώθησης. Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός:

O74.6 *Άλλες επιπλοκές της ραχιαίας και επισκληρίδιας αναισθησίας κατά τη διάρκεια των ωδίνων και του τοκετού*

1525 Προγραμματισμένη και επείγουσα καισαρική τομή

Προγραμματισμένη καλείται η καισαρική τομή που διενεργείται πριν ή μετά την έναρξή των ωδίνων, αλλά έχει αποφασιστεί πριν την έναρξή τους.

Επείγουσα καλείται η καισαρική τομή που κρίνεται απαραίτητη εξαιτίας μιας επείγουσας κατάστασης ή της εξέλιξης του τοκετού, λόγω πιθανότητας επιπλοκών της μητέρας ή του εμβρύου (π.χ. σύνδρομο HELLP, διακοπή συσπάσεων, εμβρυϊκή δυσπραγία), ακόμα και αν αυτή ήταν αρχικά προγραμματισμένη. Για την κωδικοποίηση πρέπει να καταχωρίζεται ο αντίστοιχος κωδικός της κατηγορίας:

374 *Καισαρική τομή και ανάπτυξη του παιδιού*

Παράδειγμα 1

Μια ασθενής με ισχιακή προβολή του εμβρύου έχει προγραμματισμένη ημερομηνία καισαρικής τομής κατά την 40^ή εβδομάδα κύησης. Εισάγεται δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία, τη νύχτα, λόγω πρόωρης ρήξης υμένων. Όλα τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα είναι φυσιολογικά, δεν υπάρχουν ενδείξεις αρχόμενης ή επαπειλούμενης ενδοαμνιακής λοίμωξης και δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει οι ωδίνες. Εκτελείται η συνήθης προετοιμασία για την καισαρική τομή και αποφασίζεται η αναμονή μέχρι το επόμενο πρωί, κατά το οποίο διενεργείται κλασική καισαρική τομή.

Ιατρική πράξη: 374.00.00 *Κλασική καισαρική τομή: Πρωτογενής*

Παράδειγμα 2

Μια ασθενής με ισχιακή προβολή του εμβρύου έχει προγραμματισμένη ημερομηνία καισαρικής τομής κατά την 40^ή εβδομάδα κύησης. Εισάγεται δύο ημέρες πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία τη νύχτα λόγω πρόωρης ρήξης υμένων. Όλα τα κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα είναι φυσιολογικά, δεν υπάρχουν ενδείξεις αρχόμενης ή επαπειλούμενης ενδοαμνιακής λοίμωξης και δεν έχουν ακόμη ξεκινήσει οι ωδίνες. Εκτελείται η συνήθης προετοιμασία για την καισαρική τομή και αποφασίζεται η αναμονή μέχρι το επόμενο πρωί. Κατά τη διάρκεια της νύχτας παρατηρούνται αυξημένες ωδίνες και έξοδος αμνιακού υγρού πράσινου χρώματος. Αποφασίζεται η άμεση διενέργεια της καισαρικής τομής λόγω πιθανότητας εμβρυϊκών επιπλοκών.

Ιατρική πράξη: 374.00.01 *Κλασική καισαρική τομή: Δευτερογενής*

1525

16 ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

1601 Νεογνά

Η νεογνική περίοδος ορίζεται ως εξής:

«Η νεογνική περίοδος αρχίζει με τη γέννηση και ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση της 28^{ης} ημέρας ζωής».

(ICD-10-GrM Τόμος II, Εγχειρίδιο οδηγιών, Κεφάλαιο 5.7.1)

Ένας κωδικός από την κατηγορία:

Z38.– Γεννημένα ζώντα νεογνά σύμφωνα με τον τόπο γέννησης

πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση, εφόσον το νεογνό είναι υγιές (συμπεριλαμβανομένων των νεογνών στα οποία διενεργήθηκε περιτομή). Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει νεογνά που:

- α) γεννήθηκαν στο νοσοκομείο
- β) γεννήθηκαν εκτός νοσοκομείου και εισήχθησαν αμέσως μετά τη γέννηση.

Παράδειγμα 1

Εισάγεται νεογνό που γεννήθηκε στο σπίτι (κολπικός τοκετός). Δεν ανευρίσκεται κάποιο νόσημα.

Κύρια διάγνωση: Z38.1 Ένα νεογνό, γεννημένο εκτός νοσοκομείου

Για πρόωρα νεογνά ή νεογνά που γεννήθηκαν νοσούντα ή νόσησαν κατά τη διάρκεια της νοσηλείας τους, πρέπει οι κωδικοί των νοσολογικών αυτών οντοτήτων να καταχωρίζονται πριν από ένα κωδικό της κατηγορίας Z38.– Γεννημένα ζώντα νεογνά σύμφωνα με τον τόπο γέννησης.

Παράδειγμα 2

Νεογνό που γεννήθηκε υγιές εντός νοσοκομείου (κολπικός τοκετός) λαμβάνει θεραπευτική αγωγή, λόγω σπασμών που εμφανίστηκαν τρεις μέρες μετά τον τοκετό.

Κύρια διάγνωση: P90 Νεογνικοί σπασμοί

Δευτερεύουσα διάγνωση: Z38.0 Ένα νεογνό, γεννημένο σε νοσοκομείο

1601

Παράδειγμα 3

Πρόωρο νεογνό που γεννήθηκε την 36^η εβδομάδα κύησης, με βάρος γέννησης 2280 gr και ήπια περιγεννητική ασφυξία, υποβάλλεται σε θεραπευτική αγωγή αμέσως μετά τη γέννησή του.

Κύρια διάγνωση:	P07.12	<i>Νεογνό: Βάρος γέννησης από 1500gr έως μικρότερο των 2500gr ($\geq 1500\text{gr}$ έως $< 2500\text{gr}$)</i>
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	P21.1	<i>Ήπια ή μέτρια περιγεννητική ασφυξία</i>
	Z38.0	<i>Ένα νεογνό, γεννημένο σε νοσοκομείο</i>

Οι κωδικοί της κατηγορίας Z38.– δεν μπορούν να καταχωριστούν σε περιπτώσεις δεύτερης ή μεταγενέστερης νοσηλείας.

Παράδειγμα 4

Άρρεν νεογνό διακομίζεται κατά τη 2^η ημέρα της ζωής του, μετά από καισαρική τομή, από το νοσοκομείο Α στο νοσοκομείο Β, με σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας και πνευμοθώρακα.

Νοσοκομείο Α:

Κύρια διάγνωση:	P22.0	<i>Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας [ΣΑΔ, RDS] του νεογνού</i>
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	P25.1	<i>Πνευμοθώρακας που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο</i>
	Z38.0	<i>Ένα νεογνό, γεννημένο σε νοσοκομείο</i>

Νοσοκομείο Β:

Κύρια διάγνωση:	P22.0	<i>Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας [ΣΑΔ, RDS] του νεογνού</i>
Δευτερεύουσα διάγνωση:	P25.1	<i>Πνευμοθώρακας που προκαλείται κατά την περιγεννητική περίοδο</i>

Παράδειγμα 5

Νεογνό εισάγεται σε ηλικία 7 ημερών, λόγω νεογνικού ικτέρου, για φωτοθεραπεία. Υποβάλλεται σε συνεχόμενη φωτοθεραπεία για 12 ώρες.

Κύρια διάγνωση:	P59.9	<i>Νεογνικός ίκτερος, μη καθορισμένος</i>
Ιατρική πράξη:	556.00.02	<i>Φωτοθεραπεία στο νεογνό (σε υπερχολερυθριναιμία)</i>

1602 Ορισμός των καταστάσεων που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο

Η περιγεννητική περίοδος ορίζεται ως εξής:

«Η περιγεννητική περίοδος αρχίζει με τη συμπλήρωση 22 εβδομάδων κυοφορίας (154 ημερών, όταν το βάρος γέννησης είναι φυσιολογικά 500gr) και ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 7 ημερών μετά τη γέννηση».

(ICD-10-GrM Τόμος II, Εγχειρίδιο οδηγιών, Κεφάλαιο 5.7.1)

Οι καταστάσεις που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο περιγράφονται στο κεφάλαιο XVI *Ορισμένες καταστάσεις που προκαλούνται κατά την περιγεννητική περίοδο* του ICD-10-GrM. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και οι επεξηγήσεις αυτού του κεφαλαίου.

Παράδειγμα 1

Πρόωρο νεογνό με πνευμονική υποπλασία διακομίζεται στην παιδιατρική κλινική άλλου νοσοκομείου. Η μητέρα είχε πρόωρη ρήξη υμένων την 25^η εβδομάδα κύησης. Η κύηση επιμηκύνθηκε με τοκώλυση έως την 29^η εβδομάδα. Λόγω υποψίας ενδοαμνιακής λοίμωξης και ύπαρξης παθολογικού καρδιοτοκογραφήματος, διενεργήθηκε καισαρική τομή την 29^η εβδομάδα κύησης. Η πνευμονική υποπλασία αποδίδεται στην προωρότητα, λόγω της πρόωρης ρήξης των υμένων. Η κλινική που παραλαμβάνει το νεογνό, πρέπει να καταχωρίσει τους ακόλουθους κωδικούς:

Κύρια διάγνωση:	P28.0	Πρωτοπαθής ατελεκτασία του νεογνού
Δευτερεύουσα διάγνωση:	P01.1	Έμβρυο και νεογνό που έχει υποστεί βλάβη εξαιτίας πρώιμης ρήξης των εμβρυϊκών υμένων

Πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κάποιες καταστάσεις (όπως π.χ. μεταβολικές διαταραχές), που μπορούν να εμφανιστούν κατά την περιγεννητική περίοδο, δεν περιγράφονται στο κεφάλαιο XVI. Αν το νεογνό παρουσιάσει κάποιες από αυτές τις καταστάσεις, τότε πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός από το αντίστοιχο κεφάλαιο του ICD-10-GrM, χωρίς κωδικό από το κεφάλαιο XVI.

Παράδειγμα 2

Νεογνό διακομίζεται από τη μαιευτική στην παιδιατρική κλινική λόγω γαστρεντερίτιδας από ροταϊό.

Κύρια διάγνωση:	A08.0	Εντερίτιδα από ροταϊούς
Δευτερεύουσα διάγνωση:	Z38.0	Ένα νεογνό, γεννημένο σε νοσοκομείο

1603

1603 Ειδικά μέτρα υποστήριξης για το νοσούν νεογνό**Παρεντερική θεραπεία**

Ένας κωδικός από τους:

501.00 *Χορήγηση φαρμάκων και ηλεκτρολυτικών διαλυμάτων σε νεογνό με ενδαγγειακή έγχυση*

πρέπει να καταχωρίζεται όταν π.χ. γίνεται **παρεντερική χορήγηση υγρών**, για αναπλήρωση υδατανθράκων και ενυδάτωση ή σε ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Το ίδιο ισχύει και για την προφυλακτική παρεντερική χορήγηση υγρών σε πρόωρα νεογνά, με βάρος γέννησης μικρότερο των 2000gr, προς αποφυγή υπογλυκαμίας ή ηλεκτρολυτικής διαταραχής.

Φωτοθεραπεία

Ένας κωδικός διάγνωσης για ίκτερο νεογνού πρέπει να καταχωρίζεται **μόνο** εφόσον η φωτοθεραπεία διήρκεσε **περισσότερο από 12 ώρες**.

Χορήγηση οξυγόνου σε νεογνά

Η χορήγηση οξυγόνου σε νεογνά πρέπει να κωδικοποιείται με τον κωδικό 572.00 *Χορήγηση οξυγόνου σε νεογνό*.

1604 Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας νεογνού/Νόσος υαλοειδούς μεμβράνης/Έλλειψη επιφανειοδραστικού παράγοντα

Ο κωδικός για το σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας νεογνού (P22.0 *Σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας [ΣΑΔ, RDS] του νεογνού*) πρέπει να χρησιμοποιείται για την κωδικοποίηση των ακόλουθων νοσημάτων:

- νόσος υαλοειδούς μεμβράνης
- σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας
- έλλειψη επιφανειοδραστικού παράγοντα (surfactant)

1605 Σύνδρομο μαζικής εισρόφησης και παροδική ταχύπνοια νεογνού

Η κατηγορία κωδικών:

P24.– *Σύνδρομο εισρόφησης στο νεογνό*

πρέπει να χρησιμοποιείται όταν η αναπνευστική διαταραχή που προκαλείται από το σύνδρομο εισρόφησης απαιτεί **χορήγηση οξυγόνου διάρκειας μεγαλύτερης των 24 ωρών**.

Ο κωδικός:

P22.1 *Παροδική ταχύπνοια του νεογνού*

πρέπει να χρησιμοποιείται στις ακόλουθες καταστάσεις:

- παροδική ταχύπνοια νεογνού (ανεξαρτήτως διάρκειας οξυγονοθεραπείας)
- ή
- σύνδρομο εισρόφησης νεογνού, εφόσον η αναπνευστική διαταραχή απαιτεί χορήγηση οξυγόνου διάρκειας μικρότερης των 24 ωρών.

1606 Υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια [YIE]

Η υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια χωρίζεται κλινικά σε:

- 1^ο βαθμού Νευρική κώση, υπερδιεγερσιμότητα, μυδρίαση κόρης, ταχυκαρδία αλλά απουσία σπασμών.
- 2^ο βαθμού Λήθαργος, μύση κόρης, βραδυκαρδία, μειωμένα νεογνικά αντανακλαστικά (π.χ. αντανακλαστικό εναγκαλισμού), υποτονία και σπασμοί.
- 3^ο βαθμού Stupor, βυθιότητα, σπασμοί, απουσία αντανακλαστικού εναγκαλισμού και προμηκικών αντανακλαστικών.

Στο ICD-10-GrM, υπάρχει για την κωδικοποίηση της υποξικής ισχαιμικής εγκεφαλοπάθειας ο κωδικός

P91.6 *Υποξική ισχαιμική εγκεφαλοπάθεια [YIE] του νεογνού*

Οι κωδικοί για την αντίστοιχη βαρύτητα της YIE πρέπει να καταχωρίζονται επιπρόσθετα, όπως φαίνεται ακολούθως. Τα ανωτέρω συμπτώματα και σημεία -με εξαίρεση τους σπασμούς- δεν πρέπει να καταχωρούνται επιπρόσθετα.

Κωδικοποίηση:

1 ^ο βαθμού YIE	P91.3 <i>Νεογνική εγκεφαλική ευερεθιστότητα</i> +
	P21.0 <i>Σοβαρή περιγεννητική ασφυξία</i> ή
	P20.- <i>Ενδομήτρια υποξία</i>
2 ^ο βαθμού YIE	P91.4 <i>Νεογνική εγκεφαλική κατασταλτική δυσλειτουργία</i> +
	P90 <i>Νεογνικοί σπασμοί (αν υπάρχουν)</i> +
	P21.0 <i>Σοβαρή περιγεννητική ασφυξία</i> ή
	P20.- <i>Ενδομήτρια υποξία</i>
3 ^ο βαθμού YIE	P91.5 <i>Νεογνικό κώμα</i> +
	P90 <i>Νεογνικοί σπασμοί (αν υπάρχουν)</i> +
	P21.0 <i>Σοβαρή περιγεννητική ασφυξία</i> ή
	P20.- <i>Ενδομήτρια υποξία</i>

1606

17 ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ, ΔΥΣΠΛΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΡΩΜΟΣΩΜΙΚΕΣ ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ

Δεν υπάρχουν προς το παρόν ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες για το κεφάλαιο 17.

18 ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ, ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΑΞΙΝΟΜΟΥΝΤΑΙ ΑΛΛΟΥ

1804 Ακράτεια

Η ακράτεια έχει κλινική σημασία όταν:

- δεν μπορεί να θεωρηθεί «φυσικό επακόλουθο» μιας ιατρικής πράξης ή αγωγής (π.χ. μετά από ορισμένες επεμβάσεις ή σε ορισμένες καταστάσεις).
- δεν μπορεί να θεωρηθεί προβλεπόμενη, ως μέρος της φυσιολογικής ανάπτυξης (όπως π.χ. στα νήπια).
- επιμένει σε έναν ασθενή με σαφή αναπηρία ή νοητική στέρηση.

Οι κωδικοί για την ακράτεια ούρων και κοπράνων:

N39.3 *Ακράτεια ούρων [από προσπάθεια]*

N39.4- *Άλλη καθορισμένη ακράτεια ούρων*

R32 *Μη καθορισμένη ακράτεια ούρων,*

R15 *Ακράτεια κοπράνων*

πρέπει να καταχωρίζονται μόνο εφόσον η ακράτεια αποτελεί αιτία νοσηλείας ή έχει κλινική σημασία, όπως αναφέρεται παραπάνω.

1805 Πυρετικοί σπασμοί

Ο κωδικός:

R56.0 *Πυρετικοί σπασμοί*

πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση, μόνο αν δεν υπάρχουν υποκείμενα νοσήματα, όπως πνευμονία ή άλλες εστίες λοίμωξης. Αν είναι γνωστή η υποκείμενη αιτία, πρέπει να καταχωρίζεται αυτή ως κύρια διάγνωση, και ο κωδικός R56.0 *Πυρετικοί σπασμοί* ως δευτερεύουσα.

1806 Διαγνώσεις που σχετίζονται με τον πόνο και ιατρικές πράξεις θεραπείας του

Οξύς πόνος

Όταν ένας ασθενής υποβάλλεται σε θεραπεία μετεγχειρητικού ή άλλου, σχετιζόμενου με κάποιο νόσημα, πόνου, πρέπει να καταχωρίζεται μόνο η διενεργηθείσα επέμβαση ή το νόσημα που προκαλεί τον πόνο.

Ο κωδικός:

R52.0 *Οξύς πόνος*

1806

πρέπει να καταχωρίζεται μόνο όταν δεν είναι γνωστή η εντόπιση και η αιτία του οξέος πόνου.

Μη επεμβατικές μέθοδοι θεραπείας οξέος πόνου (με εξαίρεση τον κωδικό ΕΤΙΠ 591.09 *Σύνθετη περίθλαση οξέος πόνου*) πρέπει να καταχωρίζονται, εφόσον εφαρμόζονται ως ανεξάρτητες ιατρικές πράξεις. Σε αυτήν την περίπτωση, πρέπει να κωδικοποιούνται με έναν κωδικό της κατηγορίας 591 (βλέπε ΕΚΟΚ Ρ001 *Γενικές κατευθυντήριες οδηγίες για τις ιατρικές πράξεις, παράδειγμα 3* (σελίδα 40)).

Χρόνιος πόνος/πόνος ανθεκτικός στη θεραπεία/πόνος σε κακοήθειες

Όταν εισάγεται ένας ασθενής αποκλειστικά για θεραπεία πόνου, και αντιμετωπίζεται μόνο ο πόνος, πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός για την εντόπιση του άλγους ως κύρια διάγνωση. Αυτό ισχύει και για τον πόνο που οφείλεται σε κακοήθεια. Η υποκείμενη νόσος πρέπει να καταχωρίζεται ως δευτερεύουσα διάγνωση, σε αντιστοιχία με την ΕΚΟΚ D002 *Κύρια διάγνωση* (σελίδα 4), παράγραφος «Καταχώριση ενός συμπτώματος ως κύρια διάγνωση».

Παράδειγμα 1

Ασθενής εισάγεται για αντιμετώπιση χρόνιας, ανθεκτικής στη θεραπεία οσφυαλγίας, εξαιτίας όγκου των οστών. Στον ασθενή εμφυτεύεται διεγέρτης νωτιαίου μυελού με σύστημα μονήρους ηλεκτροδίου, μόνιμης επισκληρίδιας νευροδιέγερσης. Αντιμετωπίζεται αποκλειστικά η οσφυαλγία.

Κύρια διάγνωση:	M54.5	<i>Οσφυαλγία</i>
Δευτερεύουσα διάγνωση:	C41.4	<i>Κακόηθες νεόπλασμα των οστών και των αρθρικών χόνδρων: Οστών της πυέλου</i>
Ιατρικές πράξεις:	303.09.14.00	<i>Άλλες επεμβάσεις του νωτιαίου μυελού και συναφών δομών: Εμφύτευση ή αντικατάσταση νευροδιεγέρτη για επισκληρίδια νευροδιέγερση νωτιαίου μυελού με εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης: Σύστημα ενός διαύλου, πλήρως εμφυτεύσιμο, μη επαναφορτιζόμενο</i>
	303.09.03.04	<i>Άλλες επεμβάσεις του νωτιαίου μυελού και συναφών δομών: Εμφύτευση ή αντικατάσταση ηλεκτροδίου νευροδιέγερσης για διέγερση του νωτιαίου μυελού: Εμφύτευση ή αντικατάσταση συστήματος μόνιμης νευροδιέγερσης με μονήρες ηλεκτρόδιο στον επισκληρίδιο χώρο, διαδερμικά</i>

Οι κωδικοί:

R52.1 *Χρόνιος επίμονος πόνος ή*

R52.2 *Άλλος χρόνιος πόνος*

πρέπει να καταχωρίζονται ως **κύρια διάγνωση**, μόνον εφόσον δεν μπορεί να καθοριστεί η εντόπιση του πόνου (βλέπε εξαιρέσεις στην κατηγορία R52.–) και πληρούν τον ορισμό της κύριας διάγνωσης.

Παράδειγμα 2

Ασθενής εισάγεται για διερεύνηση χρόνιου, ανθεκτικού στην θεραπεία πόνου. Κατά τη διάρκεια της νοσηλείας δεν μπορεί να εντοπιστεί η αιτιολογία και η προέλευση του άλγους.

Κύρια διάγνωση: R52.1 *Χρόνιος επίμονος πόνος*

Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις χρόνιου άλγους, πρέπει να καταχωριστεί το νόσημα που προκαλεί το άλγος ως κύρια διάγνωση, εφόσον αποτελεί την αιτία νοσηλείας του ασθενούς.

Παράδειγμα 3

Ασθενής εισάγεται για αντιμετώπιση οστικών μεταστάσεων κακοήθους όγκου του άνω λοβού του πνεύμονα. Λαμβάνει μεταξύ άλλων μορφίνη για ανακούφιση από τον πόνο των οστικών μεταστάσεων.

Κύρια διάγνωση: C79.5 *Δευτεροπαθές κακόηθες νεόπλασμα των οστών και του μυελού των οστών*

Δευτερεύουσα διάγνωση: C34.1 *Κακόηθες νεόπλασμα: Άνω λοβού (βρόγχου)*

1806

19 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ, ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΛΛΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΠΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΑΙΤΙΕΣ

1902 Επιπολής τραυματισμοί

Οι επιπολής τραυματισμοί, π.χ. εφελκιδωποιημένες βλάβες ή εκχυμώσεις, δεν πρέπει να κωδικοποιούνται, όταν συνδυάζονται με βαρείς τραυματισμούς στην ίδια ανατομική εντόπιση, εκτός εάν αυξάνουν το συνολικό κόστος αντιμετώπισης του βαρέως τραυματισμού, π.χ. λόγω χρονικής καθυστέρησης (βλέπε επίσης ΕΚΟΚ D003 *Δευτερεύουσες διαγνώσεις* (σελίδα 10)).

Παράδειγμα 1

Ασθενής προσέρχεται για αντιμετώπιση υπερκονδυλίου κατάγματος βραχιονίου και εκχύμωση αγκώνα, καθώς και κατάγματος του σώματος της ωμοπλάτης.

Κύρια διάγνωση: S42.41 *Κάταγμα του άπω άκρου του βραχιονίου οστού: Υπερκονδύλιο*

Δευτερεύουσα διάγνωση: S42.11 *Κάταγμα της ωμοπλάτης: Σώμα*

Σε αυτήν την περίπτωση, η εκχύμωση στην περιοχή του αγκώνα δεν πρέπει να κωδικοποιείται.

1903 Κάταγμα και εξάρθρημα

Για την κωδικοποίηση καταγμάτων ή εξάρθρημάτων σπονδύλων βλέπε επίσης την ΕΚΟΚ 1910 *Τραυματισμός του νωτιαίου σωλήνα* (σελίδα 164).

Κάταγμα και εξάρθρημα με κάκωση μαλακών μορίων

Για την κωδικοποίηση καταγμάτων και εξάρθρημάτων με συνοδό κάκωση μαλακών μορίων, απαιτείται η χρήση δύο κωδικών. Πρώτα καταχωρίζεται ο κωδικός του κατάγματος ή του εξάρθρηματος και ακολούθως ο αντίστοιχος κωδικός για τον βαθμό βαρύτητας της κάκωσης των μαλακών μορίων (Sx1.84!–Sx1.89!). Για τα κλειστά κατάγματα μηδενικού βαθμού ή τα εξάρθρηματα με κάκωση μαλακών μορίων μηδενικού βαθμού (χαρακτηριζόμενα ως «μικρή κάκωση μαλακών μορίων, απλός τύπος κατάγματος») ή μη καθορισμένου βαθμού δεν απαιτείται πρόσθετος κωδικός.

1903

Παράδειγμα 1

Ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο με ανοικτό κάταγμα μηριαίου οστού 2^{ου} (II) βαθμού.

Κύρια διάγνωση: S72.3 Κάταγμα της διάφυσης του μηριαίου οστού

Δευτερεύουσα διάγνωση: S71.88! Κάκωση μαλακών μορίων 2ου (II) βαθμού, σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρημα του ισχίου και του μηρού

Παράδειγμα 2

Ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο για αντιμετώπιση ανοικτού εξαρθήματος της άρθρωσης του ώμου, πρόσθιο εξάρθρημα και κάκωση μαλακών μορίων 1^{ου} (I) βαθμού.

Κύρια διάγνωση: S43.01 Εξάρθρημα της άρθρωσης του ώμου, πρόσθιο εξάρθρημα

Δευτερεύουσα διάγνωση: S41.87! Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρημα βραχίονα

Κάταγμα με εξάρθρημα

Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός τόσο για το κάταγμα όσο και για το εξάρθρημα. Ο πρώτος κωδικός πρέπει να αφορά το κάταγμα. Σε ορισμένες περιπτώσεις, το ICD-10-GrM προβλέπει την απόκλιση από αυτόν τον κανόνα, κατά την κωδικοποίηση ενός κατάγματος συνδυασμένου με εξάρθρημα:

Για παράδειγμα το κάταγμα-εξάρθρημα Monteggia καταχωρίζεται ως κάταγμα (S52.21 Κάταγμα του εγγύς τμήματος της ωλένης με εξάρθρημα της κεφαλής της κερκίδας).

Κάταγμα και εξάρθρημα στην ίδια ή διαφορετική θέση

Σε περίπτωση συνδυασμού κατάγματος με εξάρθρημα και κάκωση μαλακών μορίων στην ίδια θέση, επαρκεί η καταχώριση ενός πρόσθετου κωδικού για την κάκωση μαλακών μορίων.

Παράδειγμα 3

Ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο για αντιμετώπιση ανοικτού κατάγματος κεφαλής βραχιονίου 1^{ου} (I) βαθμού με (ανοικτό) πρόσθιο εξάρθρωμα της άρθρωσης του ώμου, με συνοδό κάκωση μαλακών μορίων 1^{ου} (I) βαθμού.

Κύρια διάγνωση: S42.21 *Κάταγμα του εγγύς άκρου του βραχιονίου οστού: Κεφαλή*

Δευτερεύουσες διαγνώσεις: S41.87! *Κάκωση μαλακών μορίων 1ου (I) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρωμα βραχίονα*

S43.01 *Εξάρθρωμα της άρθρωσης του ώμου, πρόσθιο εξάρθρωμα*

Σε περίπτωση που ένας ασθενής έχει υποστεί πολλαπλά κατάγματα ή εξαρθρήματα διαφορετικών θέσεων, πρέπει να καταχωρίζεται για κάθε θέση ο αντίστοιχος κωδικός για τον βαθμό της κάκωσης των μαλακών μορίων (Sx1.84!–Sx1.89!), εφόσον δεν πρόκειται για κάκωση μηδενικού βαθμού (μικρού βαθμού κάκωση).

Οστική θλάση

Η οστική θλάση (“bone bruise”, ακτινολογικά επιβεβαιωμένο κάταγμα του σπογγώδους οστού χωρίς κάταγμα του φλοιού) πρέπει να κωδικοποιείται ως κάταγμα, στην αντίστοιχη θέση.

1905 Ανοικτά τραύματα και κακώσεις

Για κάθε περιοχή του σώματος, διατίθεται στο κεφάλαιο XIX *Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες από εξωτερικές αιτίες* μια παράγραφος, η οποία αφορά ανοικτά τραύματα. Σε αυτήν περιλαμβάνονται κωδικοί ανοικτών τραυμάτων, που σχετίζονται με κατάγματα ή εξαρθήματα ή ανοικτές ρήξεις εσωτερικών κοιλοτήτων (π.χ. ενδοκρανιακά, ενδοθωρακικά και ενδοκοιλιακά τραύματα).

Το ανοικτό τραύμα πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις να κωδικοποιείται **πρόσθετα** (συμπληρωματικά) της κάκωσης (π.χ. του κατάγματος), βλέπε επίσης ΕΚΟΚ 1903 *Κάταγμα και εξάρθρωμα* (σελίδα 159).

Ανοικτά τραύματα με συνοδό κάκωση αγγείων, νεύρων και τενόντων

Σε τραυματισμό με συνοδό κάκωση αγγείων, η σειρά κωδικοποίησης εξαρτάται από τον κίνδυνο απώλειας του προσβεβλημένου μέλους του σώματος. Σε περίπτωση υψηλού κινδύνου απώλειας μέλους, πρέπει κατά τον τραυματισμό με κάκωση αρτηρίας και νεύρου να κωδικοποιείται:

- πρώτα η κάκωση της αρτηρίας,
- μετά η κάκωση του νεύρου,
- μετά η ενδεχόμενη κάκωση των τενόντων,
- τελευταία η κάκωση των μαλακών μορίων.

1905

Σε περιπτώσεις, όπου παρά τον τραυματισμό νεύρων και αρτηριών, δεν είναι πιθανή η απώλεια του προσβεβλημένου μέλους, πρέπει η σειρά κωδικοποίησης να ακολουθεί τον βαθμό βαρύτητας του εκάστοτε τραυματισμού.

Ανοικτή ενδοκρανιακή, ενδοθωρακική ή ενδοκοιλιακή κάκωση

Σε περίπτωση ανοικτής ενδοκρανιακής, ενδοθωρακικής ή ενδοκοιλιακής κάκωσης, πρέπει πρώτα να καταχωρίζεται ο κωδικός για την ενδοκρανιακή, ενδοθωρακική ή ενδοκοιλιακή κάκωση, ακολουθούμενος από τον κωδικό για την ανοικτή κάκωση.

Παράδειγμα 1

Ασθενής εισάγεται με πλήρη ρήξη νεφρικού παρεγχύματος, ρήξη σπληνός με συμμετοχή του παρεγχύματος και μικρές ρήξεις σε πολλαπλά τμήματα του λεπτού εντέρου καθώς και εκσπλάχνωση.

Κύρια διάγνωση:	S37.03	<i>Πλήρης ρήξη νεφρικού παρεγχύματος</i>
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	S36.03	<i>Τραυματική ρήξη σπληνός με συμμετοχή του παρεγχύματος</i>
	S36.49	<i>Τραυματισμός: Άλλα και πολλαπλά τμήματα του λεπτού εντέρου</i>
	S31.83!	<i>Ανοικτό τραύμα (οποιοδήποτε τμήματος της κοιλιάς της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου) σε συνδυασμό με ενδοκοιλιακή κάκωση</i>

Ανοικτό κάταγμα με ενδοκρανιακή, ενδοθωρακική ή ενδοκοιλιακή κάκωση

Όπου ένα ανοικτό κάταγμα κρανίου συνδυάζεται με ενδοκρανιακή κάκωση ή ένα ανοικτό κάταγμα κορμού, συνδυάζεται με ενδοθωρακική ή ενδοκοιλιακή κάκωση, πρέπει να καταχωρίζεται:

- ένας κωδικός για την ενδοκρανιακή ή ενδοθωρακική ή ενδοκοιλιακή κάκωση,
- ένας από τους ακόλουθους κωδικούς:

S01.83! *Ανοικτό τραύμα (οποιοδήποτε μέρους της κεφαλής) σε συνδυασμό με ενδοκρανιακή κάκωση*

S21.83! *Ανοικτό τραύμα (οποιοδήποτε τμήματος του θώρακα) σε συνδυασμό με ενδοθωρακική κάκωση*

ή

S31.83! *Ανοικτό τραύμα (οποιοδήποτε τμήματος της κοιλιάς της οσφυοϊερής περιοχής και της πυέλου) σε συνδυασμό με ενδοκοιλιακή κάκωση*

οι κωδικοί για το κάταγμα

και

- ένας κωδικός για τον βαθμό βαρύτητας της κάκωσης μαλακών μορίων του ανοικτού κατάγματος από τις κατηγορίες:
- S01.87!–S01.89!,
S21.87!–S21.89!
- ή
- S31.87!–S31.89!.

Επιπλοκές ανοικτών τραυμάτων

Η κωδικοποίηση των επιπλοκών των ανοικτών τραυμάτων εξαρτάται από το αν υπάρχουν συγκεκριμένοι κωδικοί που να τις περιγράφουν. Αν είναι δυνατή η κωδικοποίηση της επιπλοκής με έναν συγκεκριμένο κωδικό του ICD-10-GrM, τότε πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός αυτός (π.χ. λοίμωξη όπως ερυσίπελας, φλέγμονας-κυτταρίτιδα ή σήψη κ.ο.κ.), ακολουθούμενος από έναν κωδικό για το ανοικτό τραύμα.

Παράδειγμα 2

Ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο με φλέγμονα [κυτταρίτιδα] άκρας χείρας μετά από δήγμα γαλής χρονικά απροσδιόριστο. Κατά την εισαγωγή του στο νοσοκομείο διαπιστώνονται στο θέναρ δύο σικτοί τραυματισμοί, που περιβάλλονται από ερυθρότητα και έντονο οίδημα της άκρας χείρας και του πήχεως. Στις καλλιέργειες που λαμβάνονται με βαμβακοφόρο στυλεό αναπτύσσεται χρυσίζων σταφυλόκοκκος (*Staphylococcus aureus*). Ο ασθενής υποβάλλεται σε ενδοφλέβια αντιβιοτική αγωγή.

Κύρια διάγνωση:	L03.10	Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] του άνω άκρου
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	S61.0	Ανοικτό τραύμα ενός ή περισσότερων δακτύλων χωρίς βλάβη του όνυχα
	B95.6!	Χρυσίζων σταφυλόκοκκος [<i>Staphylococcus aureus</i>] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κωδικοποίηση της επιπλοκής ενός ανοικτού τραύματος με έναν συγκεκριμένο κωδικό, πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός για το ανοικτό τραύμα, ακολουθούμενος από έναν κωδικό της κατηγορίας:

T89.0- *Επιπλοκές ανοικτού τραύματος.*

1909 Απώλεια των αισθήσεων

Απώλεια των αισθήσεων σχετιζόμενη με τραυματισμό

Σε περίπτωση που προκύπτει απώλεια των αισθήσεων, η οποία **συνδέεται** με έναν τραυματισμό, τότε πρέπει να καταχωρίζεται το είδος του τραυματισμού **πριν** από έναν

1910

κωδικό της κατηγορίας S06.7-! *Απώλεια συνείδησης μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση*, για τη διάρκεια της απώλειας των αισθήσεων.

Παράδειγμα 1

Ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο με κάταγμα ηθμοειδούς οστού (με ακτινολογική επιβεβαίωση). Στην αξονική τομογραφία διαπιστώνεται εκτεταμένο υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Ο ασθενής είχε απώλεια αισθήσεων για χρονική διάρκεια 3 ωρών.

Κύρια διάγνωση:	S06.5	<i>Τραυματική υποσκληρίδια αιμορραγία</i>
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	S02.1	<i>Κάταγμα της βάσης του κρανίου</i>
	S06.71!	<i>Απώλεια συνείδησης μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση: Διάρκειας από 30 λεπτά έως 24 ώρες</i>
Ιατρική πράξη:	220.00	<i>Αξονική τομογραφία κρανίου χωρίς έγχυση σκιαγραφικού</i>

Απώλεια αισθήσεων, μη σχετιζόμενη με τραυματισμό

Εφόσον η απώλεια των αισθήσεων του ασθενούς δεν σχετίζεται με τραυματισμό, πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ακόλουθοι κωδικοί:

- R40.0 *Υπνηλία*
- R40.1 *Εμβροντησία*
- R40.2 *Κώμα, μη καθορισμένο*

1910 Τραυματισμός του νωτιαίου μυελού (με μετατραυματική παραπληγία και τετραπληγία)

Η οξεία – άμεσα μετατραυματική φάση

Με τον όρο «οξεία φάση» σε έναν τραυματισμό του νωτιαίου μυελού ορίζεται η χρονική περίοδος αμέσως μετά τον τραυματισμό. Μπορεί να περιλαμβάνει αρκετές νοσηλείες.

Όταν ένας ασθενής με τραυματισμό του νωτιαίου μυελού εισάγεται στο νοσοκομείο (π.χ. με συμπίεση του νωτιαίου μυελού, θλάση, ρήξη, ολική ή μερική διατομή του), πρέπει να κωδικοποιούνται τα ακόλουθα:

1. Το είδος της βλάβης του νωτιαίου μυελού πρέπει να καταχωρίζεται ως αρχικός κωδικός (πλήρης ή ατελής διατομή του μυελού).
2. Το ύψος (επίπεδο) της λειτουργικής βλάβης του νωτιαίου μυελού πρέπει να καταχωρίζεται με έναν κωδικό της κατηγορίας:

S14.7!, S24.7!, S34.7! *Ύψος λειτουργικής βλάβης σε τραυματισμό της αυχενικής, θωρακικής, οσφυοϊερής μοίρας νωτιαίου μυελού*

Για την καταχώριση του λειτουργικού ύψους της βλάβης πρέπει να δίδεται προσοχή στις σημειώσεις των κωδικών S14.7!, S24.7! και S34.7! του ICD-10-GrM.

Ασθενείς με τραυματισμούς του νωτιαίου μυελού έχουν υποστεί κατά πάσα πιθανότητα και κάταγμα ή εξάρθρωμα σπονδύλου/ων. Συνεπώς, πρέπει να κωδικοποιούνται επίσης τα ακόλουθα:

3. Η εντόπιση του κατάγματος, όταν συνυπάρχει κάταγμα σπονδύλου.
4. Η εντόπιση του εξάρθρωματος, όταν συνυπάρχει εξάρθρωμα.
5. Ο βαθμός βαρύτητας της κάκωσης μαλακών μοριών του κατάγματος/εξάρθρωματος.

Παράδειγμα 1

Ασθενής εισάγεται με συμπιεστικό κάταγμα στον Θ12. Συνυπάρχει κάκωση νωτιαίου μυελού στο ίδιο ύψος με ατελή παραπληγία και ύψος λειτουργικής βλάβης O2.

Κύρια διάγνωση:	S24.12	<i>Μερική διατομή της θωρακικής μοίρας του νωτιαίου μυελού</i>
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	S34.72!	<i>Τραυματισμός σπονδυλικής στήλης (ύψος λειτουργικής βλάβης): O2</i>
	S22.06	<i>Κάταγμα θωρακικού σπονδύλου: Θ11 και Θ12</i>

Η οξεία φάση – διακομιδή του ασθενούς

Όταν ένας ασθενής έχει υποστεί κάκωση νωτιαίου μυελού, εξαιτίας ενός τραυματισμού, και διακομίζεται επειγόντως από ένα εφημερεύον νοσοκομείο σε ένα άλλο εφημερεύον νοσοκομείο, πρέπει και στα δύο νοσοκομεία να καταχωρίζεται ο κωδικός για το είδος της κάκωσης, ως κύρια διάγνωση, και ο αντίστοιχος κωδικός για το ύψος της λειτουργικής βλάβης, ως δευτερεύουσα διάγνωση.

Παράδειγμα 2

Ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο Α με βαριά κάκωση νωτιαίου μυελού. Η αξονική τομογραφία αναδεικνύει εξάρθρωμα Θ7/Θ8 με κάκωση νωτιαίου μυελού στο ίδιο ύψος. Νευρολογικά διαπιστώνεται μερική διατομή του νωτιαίου μυελού κάτω από το ύψος του Θ8. Μετά από τη σταθεροποίησή του στο νοσοκομείο Α, ο ασθενής διακομίζεται στο νοσοκομείο Β όπου διενεργείται σπονδυλοδεσία.

Νοσοκομείο Α

Κύρια διάγνωση:	S24.12	<i>Μερική διατομή της θωρακικής μοίρας του νωτιαίου μυελού</i>
Δευτερεύουσα διάγνωση:	S24.75!	<i>Τραυματισμός της θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, ύψος λειτουργικής βλάβης: Θ8/Θ9</i>
	S23.14	<i>Εξάρθρωμα θωρακικού σπονδύλου: Θ7/Θ8 και Θ8/Θ9</i>

1910

Ιατρική πράξη:	220.03	Αξονική τομογραφία σπονδυλικής στήλης και του νωτιαίου μυελού χωρίς έγχυση σκιαγραφικού
Νοσοκομείο Β		
Κύρια διάγνωση:	S24.12	Μερική διατομή της θωρακικής μοίρας του νωτιαίου μυελού
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	S24.75!	Τραυματισμός της θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, ύψος λειτουργικής βλάβης: Θ8/Θ9
	S23.14	Εξάρθρωμα θωρακικού σπονδύλου: Θ7/Θ8 και Θ8/Θ9
Ιατρικές πράξεις:	383.06.04.01	Σπονδυλοδεσία: Συνδυασμένη πρόσθια και οπίσθια, ενδοσωματική: 2 ανατομικά επίπεδα
	383.11.03.01	Οστεοσύνθεση (δυναμική σταθεροποίηση) στη σπονδυλική στήλη: Με πρόσθια πλάκα-βίδες: 2 επίπεδα

Τραυματισμός νωτιαίου μυελού – χρόνια φάση

Με τον όρο «χρόνια φάση» μιας παραπληγίας ή τετραπληγίας εννοούμε το χρονικό διάστημα που επέρχεται μετά την ολοκλήρωση της θεραπευτικής αντιμετώπισης του οξέος συμβάντος, που προκάλεσε την πάρεση ή παράλυση (π.χ. ένας οξύς τραυματισμός του νωτιαίου μυελού).

Όταν προσέρχεται ασθενής σε αυτή τη χρόνια φάση, για αντιμετώπιση της παραπληγίας ή τετραπληγίας, πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση ένας κωδικός της κατηγορίας:

G82.- *Παραπάρεση και παραπληγία, τετραπάρεση και τετραπληγία, με το «2» ή «3» στον 5^ο χαρακτήρα.*

Σε περίπτωση αντίθετα που ένας ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο για αντιμετώπιση άλλου νοσήματος, όπως π.χ. ουρολοίμωξη, κάταγμα του μηριαίου οστού κ.τ.λ., πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός του νοσήματος αυτού, ακολουθούμενος από έναν κωδικό της κατηγορίας:

G82.- *Παραπάρεση και παραπληγία, τετραπάρεση και τετραπληγία, με 5^ο χαρακτήρα το «.2» ή «.3»*

καθώς και οι κωδικοί άλλων πιθανών νοσημάτων, από τα οποία πάσχει. Η σειρά καταχώρισης αυτών των διαγνώσεων πρέπει να συμφωνεί με τον ορισμό της κύριας διάγνωσης.

Για την κωδικοποίηση του ύψους της λειτουργικής βλάβης πρέπει επιπλέον να καταχωρίζεται ο κατάλληλος κωδικός της κατηγορίας:

G82.6-! *Λειτουργικό επίπεδο της βλάβης του νωτιαίου μυελού.*

Οι κωδικοί για τον τραυματισμό του νωτιαίου μυελού δεν πρέπει να καταχωρίζονται, καθώς αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο στην οξεία φάση.

Παράδειγμα 3

Ασθενής εισάγεται για αντιμετώπιση ουρολοίμωξης. Επιπλέον πάσχει από ατελή χαλαρή παραπληγία στο ύψος O2, ατελές σύνδρομο ιππουρίδας και νευρογενή κύστη.

Κύρια διάγνωση:	N39.0	Λοίμωξη του ουροποιητικού, μη καθορισμένης εντόπισης
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	G82.03	Χαλαρή παραπάρεση και παραπληγία: Χρόνια μερική διατομή του νωτιαίου μυελού
	G82.66!	Λειτουργικό επίπεδο της βλάβης του νωτιαίου μυελού: O2-I1
	G83.41	Ατελές σύνδρομο ιππουρίδας
	G95.81	Παράλυση της ουροδόχου κύστης σε βλάβη του κατώτερου κινητικού νευρώνα [LMNL]

Σημείωση: Κατά την καταχώριση μιας νευρογενούς κύστης πρέπει να καταχωρίζεται ένας πρόσθετος κωδικός της κατηγορίας G95.8-.

Κωδικοποίηση καταγμάτων ή εξάρθρημάτων σπονδύλων

Βλέπε επίσης την ΕΚΟΚ 1903 *Κάταγμα και εξάρθρημα* (σελίδα 159).

Σε πολλαπλά κατάγματα ή εξάρθρηματα, πρέπει το λειτουργικό ύψος κάθε κατάγματος ή εξάρθρηματος να κωδικοποιείται χωριστά.

1911

Παράδειγμα 4

Ασθενής εισάγεται με επιπλεγμένο ανοικτό κάταγμα 2^{ου} (II) βαθμού, του 2^{ου}, 3^{ου} και 4^{ου} θωρακικού σπονδύλου, με μετατόπιση στο ύψος Θ2/Θ3 και Θ3/Θ4, και ολική διατομή του νωτιαίου μυελού στο ύψος Θ3. Από τη νευρολογική εξέταση επιβεβαιώνεται ολική διατομή του νωτιαίου μυελού κάτω από το ύψος του Θ3.

Κύρια διάγνωση:	S24.11	<i>Ολική διατομή της θωρακικής μοίρας του νωτιαίου μυελού</i>
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	S24.72!	<i>Τραυματισμός της θωρακικής μοίρας σπονδυλικής στήλης, ύψος λειτουργικής βλάβης: Θ2/Θ3</i>
	S22.01	<i>Κάταγμα θωρακικού σπονδύλου: Θ1 και Θ2</i>
	S22.02	<i>Κάταγμα θωρακικού σπονδύλου: Θ3 και Θ4</i>
	S21.88!	<i>Κάκωση μαλακών μοριών 2ου (II) βαθμού σε ανοικτό κάταγμα ή εξάρθρημα θωρακικού τοιχώματος</i>
	S23.11	<i>Εξάρθρημα θωρακικού σπονδύλου: Θ1/Θ2 και Θ2/Θ3</i>
	S23.12	<i>Εξάρθρημα θωρακικού σπονδύλου: Θ3/Θ4 και Θ4/Θ5</i>

1911 Πολλαπλά τραύματα**Διαγνώσεις**

Τα μεμονωμένα τραύματα πρέπει, κατά το δυνατόν, να κωδικοποιούνται όσο ακριβέστερα γίνεται, ανάλογα με την εντόπιση και το είδος τους.

Οι συνδυαστικές κατηγορίες για πολλαπλά τραύματα (T00–T07 *Τραυματισμοί με συμμετοχή περισσότερων περιοχών του σώματος*) και οι κωδικοί των κατηγοριών S00–S99, όπου ο αριθμός «7» στον 4^ο χαρακτήρα κωδικοποιεί τον πολλαπλό τραυματισμό, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο όταν το πλήθος των προς κωδικοποίηση τραυμάτων υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό των σχετικών διαγνώσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ειδικοί κωδικοί (τραύμα ανάλογα με την εντόπιση/είδος) για τα βαριά τραύματα και η πολλαπλή κωδικοποίηση, για τους λιγότερο σοβαρούς τραυματισμούς (π.χ. επιφανειακοί τραυματισμοί, ανοικτές πληγές, καθώς και διάστρεμμα και θλάση) (βλέπε επίσης ΕΚΟΚ D012 *Πολλαπλή κωδικοποίηση* (σελίδα 21)).

Σημείωση: Το αλφαβητικό ευρετήριο του ICD-10-GrM προτείνει για τα «πολλαπλά τραύματα» ή για ένα «πολυτραύμα» έναν κωδικό της κατηγορίας T07 (*Μη καθορισμένοι πολλαπλοί τραυματισμοί*). Αυτοί οι κωδικοί είναι μη ειδικοί και γι' αυτό η χρήση τους πρέπει να αποφεύγεται.

Σειρά καταχώρισης των κωδικών σε πολλαπλά τραύματα

Στην περίπτωση όπου συνυπάρχουν πολλαπλά σαφώς καθορισμένα τραύματα, πρέπει να κωδικοποιείται ως κύρια διάγνωση το πιο σοβαρό εξ' αυτών.

Παράδειγμα 1

Ασθενής εισάγεται με εστιακή εγκεφαλική θλάση, τραυματικό ακρωτηριασμό ωτός, απώλεια συνείδησης διάρκειας 20 λεπτών, θλάση προσώπου, τραχήλου και ώμου, καθώς και ανοικτά τραύματα στην παρειά και τον μηρό.

Κύρια διάγνωση:	S06.31	Εστιακή εγκεφαλική θλάση
Δευτερεύουσες διαγνώσεις:	S06.70!	Απώλεια συνείδησης μετά από κρανιοεγκεφαλική κάκωση: Διάρκειας κάτω των 30 λεπτών
	S08.1	Τραυματικός ακρωτηριασμός του ωτός
	S01.41	Ανοικτό τραύμα: Παρειά
	S71.1	Ανοικτό τραύμα του μηρού
	S00.85	Επιπολής τραυματισμός άλλων τμημάτων της κεφαλής: Εκχύμωση
	S10.0	Εκχύμωση του λαιμού (λάρυγγας, αυχενική μοίρα οισοφάγου, φάρυγγας, τραχεία)
	S40.0	Θλάση του ώμου και του βραχίονα

Σε αυτή την περίπτωση, **δεν** καταχωρίζονται οι κωδικοί της κατηγορίας S09.7 Πολλαπλοί τραυματισμοί της κεφαλής και T01.8 Ανοικτά τραύματα με συμμετοχή άλλων συνδυασμών περιοχών του σώματος, εφόσον μπορούν να καταχωριστούν πιο ειδικοί κωδικοί.

Ιατρικές πράξεις

Σε περιπτώσεις αντιμετώπισης πολλαπλών τραυμάτων και πολυτραυματιών, πρέπει να καταχωρίζεται ο κατάλληλος πρόσθετος κωδικός, μαζί με τους κωδικούς των μεμονωμένων διενεργηθειών ιατρικών πράξεων, ως εξής:

398.01 Φροντίδα σε πολλαπλούς τραυματισμούς

ή

398.02 Φροντίδα σε πολυτραυματία.

1914

1914 Θερμικά ή χημικά εγκαύματα**Σειρά καταχώρισης των κωδικών**

Πρώτα πρέπει να κωδικοποιείται η ανατομική περιοχή με το σοβαρότερο θερμικό ή χημικό έγκαυμα. Κατά συνέπεια, ένα θερμικό ή χημικό έγκαυμα 3^{ου} (III) βαθμού πρέπει να κωδικοποιείται πριν από ένα θερμικό ή χημικό έγκαυμα 2^{ου} (II) βαθμού, ακόμη και όταν το τελευταίο καταλαμβάνει μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας του σώματος.

Θερμικά ή χημικά εγκαύματα της ίδιας ανατομικής περιοχής αλλά διαφορετικού βαθμού, πρέπει να κωδικοποιούνται ως θερμικά ή χημικά εγκαύματα του σοβαρότερου βαθμού.

Παράδειγμα 1

Ένα θερμικό έγκαυμα 2^{ου} (II) και 3^{ου} (III) βαθμού της ποδοκνημικής περιοχής, πρέπει να κωδικοποιείται ως εξής:

Κύρια διάγνωση: T25.3 *Θερμικό έγκαυμα 3ου βαθμού της ποδοκνημικής και του άκρου ποδός*

Τα θερμικά ή χημικά εγκαύματα που απαιτούν μεταμόσχευση δέρματος, πρέπει πάντα να κωδικοποιούνται πριν από εκείνα που δεν απαιτούν μεταμόσχευση.

Όταν συνυπάρχουν πολλαπλά θερμικά ή χημικά εγκαύματα του ίδιου βαθμού, τότε κωδικοποιείται πρώτα η ανατομική περιοχή του εγκαύματος που καταλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της επιφάνειας σώματος. Όλα τα υπόλοιπα θερμικά ή χημικά εγκαύματα, πρέπει, κατά το δυνατόν να καταχωρίζονται μαζί με την εκάστοτε εντόπισή τους.

Παράδειγμα 2

Ένα θερμικό έγκαυμα 2^{ου} (II) βαθμού του κοιλιακού τοιχώματος και του περινέου, πρέπει να κωδικοποιείται ως εξής:

Κύρια διάγνωση: T21.23 *Θερμικό έγκαυμα του κορμού, βαθμού 2α: Κοιλιακό τοίχωμα*

Δευτερεύουσα διάγνωση: T21.25 *Θερμικό έγκαυμα του κορμού, βαθμού 2α: Έξω γεννητικά όργανα*

Όταν το πλήθος των κωδικών για μία νοσηλεία υπερβαίνει τον μέγιστο αριθμό των σχετικών διαγνώσεων, είναι σκόπιμο να χρησιμοποιούνται οι κωδικοί για τα πολλαπλά θερμικά ή χημικά τραύματα (T29.- *Θερμικά ή χημικά εγκαύματα σε πολλαπλές περιοχές του σώματος*). Όταν αυτό είναι αναγκαίο, οι κωδικοί αυτοί χρησιμοποιούνται για τα θερμικά ή χημικά εγκαύματα 2^{ου} (II) βαθμού, ενώ για τα θερμικά ή χημικά εγκαύματα 3^{ου} (III) βαθμού πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται ειδικοί κωδικοί.

Επιφάνεια σώματος (ΕΣ)

Κάθε περίπτωση θερμικού ή χημικού εγκαύματος πρέπει επιπρόσθετα να καταχωρίζεται μαζί με έναν κωδικό των κατηγοριών:

T31.–! *Θερμικά εγκαύματα που ταξινομούνται σύμφωνα με την έκταση της επιφάνειας του σώματος που καταλαμβάνουν.*

T32.–! *Χημικά εγκαύματα που ταξινομούνται σύμφωνα με την έκταση της επιφάνειας του σώματος που καταλαμβάνουν*

έτσι ώστε να αναδεικνύεται το ποσοστό της επιφάνειας σώματος που έχει προσβληθεί.

Ο 4^{ος} χαρακτήρας περιγράφει το συνολικό ποσοστό της επιφάνειας σώματος που έχει προσβληθεί, αν αθροιστούν όλα τα μεμονωμένα θερμικά ή χημικά εγκαύματα.

Ένας κωδικός των κατηγοριών T31.–! και T32.–! πρέπει να καταχωρίζεται μόνο μία φορά μετά τον τελευταίο κωδικό της προσβεβλημένης περιοχής.

1915 Κακοποίηση και κακομεταχείριση ενηλίκων και παιδιών

Σε περιπτώσεις κακοποίησης και κακομεταχείρισης πρέπει να κωδικοποιούνται οι παρακάτω τραυματισμοί και ψυχικές διαταραχές.

Ένας κωδικός της κατηγορίας:

T74.– *Σύνδρομα κακοποίησης*

πρέπει να καταχωρίζεται ως αιτία των τραυματισμών ή ψυχικών διαταραχών, μόνο σε παιδιά και εφήβους μέχρι την ολοκλήρωση του 18^{ου} έτους της ηλικίας τους.

Αυτό ισχύει επίσης για την κωδικοποίηση του συνδρόμου Münchhausen.

1916 Δηλητηρίαση από φάρμακα, ναρκωτικά και βιολογικά δραστικές ουσίες

Η διάγνωση «δηλητηρίαση από φάρμακα ή ναρκωτικά» τίθεται σε περίπτωση ακούσιας λήψης ή ακατάλληλης χρήσης αυτών (π.χ. λήψη με σκοπό την αυτοχειρία και τον θάνατο).

Οι δηλητηριάσεις ταξινομούνται στις κατηγορίες:

T36–T50 *Δηλητηρίαση από φάρμακα, ναρκωτικά και βιολογικά δραστικές ουσίες*

και

T51–T65 *Τοξικές επιδράσεις από ουσίες πρωτίστως μη φαρμακευτικής χρήσης.*

Η πρόθεση για αυτοχειρία (X84.9! *Σκόπιμος αυτοτραυματισμός*) δεν πρέπει να κωδικοποιείται.

Σε περίπτωση που πραγματοποιείται νοσηλεία σε νοσοκομείο εξαιτίας μιας κλινικής εκδήλωσης που συνδέεται με τη δηλητηρίαση (π.χ. κώμα, αρρυθμία), πρέπει να καταχωρίζεται ο κωδικός της κλινικής εκδήλωσης ως κύρια διάγνωση (σύμφωνα με την ΕΚΟΚ D002 *Κύρια διάγνωση* (σελίδα 4)). Οι κωδικοί για τις ενεχόμενες δραστικές ουσίες (φάρμακα, ναρκωτικά, αλκοόλ) πρέπει να καταχωρίζονται ως δευτερεύουσες διαγνώσεις.

1916

Παράδειγμα 1

Ασθενής εισάγεται με κώμα, λόγω λήψης υπερβολικής δόσης κωδεΐνης.

Κύρια διάγνωση: R40.2 *Κώμα, μη καθορισμένο*

Δευτερεύουσα διάγνωση: T40.2 *Δηλητηρίαση: Άλλα οπιοειδή*

Παράδειγμα 2

Ασθενής εισάγεται με αιματέμεση λόγω ακούσιας λήψης κουμαρινικών αντιπηκτικών (συνταγογραφημένων), σε συνδυασμό με ακετυλοσαλικυλικό οξύ (μη συνταγογραφημένο).

Κύρια διάγνωση: K92.0 *Αιματέμεση*

Δευτερεύουσες διαγνώσεις: T39.0 *Δηλητηρίαση: Σαλικυλικά*

T45.5 *Δηλητηρίαση: Αντιπηκτικά*

Προαιρετικά: X49.9! *Ακούσια δηλητηρίαση*

Για την υπερδοσολογία ινσουλίνης πρέπει να καταχωρίζεται πρώτα ένας κωδικός της κατηγορίας E10–E14 (με το «6» στον 4^ο χαρακτήρα για *Σακχαρώδη διαβήτη με άλλες καθορισμένες επιπλοκές*). Η δηλητηρίαση (T38.3 *Δηλητηρίαση: Ινσουλίνη και από του στόματος υπογλυκαιμικά [αντιδιαβητικά] φάρμακα*) πρέπει να καταχωρίζεται ως δευτερεύουσα διάγνωση (βλέπε ΕΚΟΚ 0401 *Σακχαρώδης διαβήτης* (σελίδα 87)).

Σε *δηλητηριάσεις χωρίς κλινική εκδήλωση* πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση, σύμφωνα με την ΕΚΟΚ D002, ένας κωδικός των κατηγοριών T36–T50 *Δηλητηρίαση από φάρμακα, ναρκωτικά και βιολογικά δραστικές ουσίες* ή T51–T65 *Τοξικές επιδράσεις από ουσίες πρωτίστως μη φαρμακευτικής χρήσης* (βλέπε επίσης παράδειγμα 3).

Παράδειγμα 3

Μια ασθενής προσέρχεται στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και αναφέρει ότι έλαβε προ ολίγου 20 δισκία παρακεταμόλης, σε μία απερίσκεπτη αντίδραση. Μετά από την πλύση στομάχου, δεν παρουσιάζει καμία περαιτέρω κλινική εκδήλωση.

Κύρια διάγνωση: T39.1 *Δηλητηρίαση: Παράγωγα της 4-αμινοφαινόλης*

Ιατρική πράξη: 512.00 *Πλύση στομάχου*

1917

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Γενικοί κανόνες για την κωδικοποίηση (ΠΟΥ)

Το αλφαβητικό ευρετήριο περιλαμβάνει πολλούς όρους, οι οποίοι δεν περιέχονται στον συστηματικό κατάλογο του ICD-10-GrM. Για τον προσδιορισμό ενός κωδικού, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τόσο το αλφαβητικό ευρετήριο όσο και ο συστηματικός κατάλογος του ICD-10-GrM.

Πριν ξεκινήσει ο χρήστης τη διαδικασία της κωδικοποίησης, πρέπει να γνωρίζει τις βασικές αρχές ταξινόμησης και κωδικοποίησης. Επιπρόσθετα, πρέπει να του δίνεται η δυνατότητα πρακτικής εξάσκησης.

Ακολουθώς παρατίθενται συνοπτικά, για τον μη εξοικειωμένο χρήστη του ICD-10-GrM, τα βήματα που πρέπει να ακολουθούνται για την ορθή κωδικοποίηση:

1. Προσδιορισμός του είδους της πληροφορίας, η οποία πρέπει να κωδικοποιηθεί, και αναζήτηση στο αντίστοιχο τμήμα του αλφαβητικού ευρετηρίου. Σε περίπτωση που πρόκειται για νόσο ή τραυματισμό ή άλλη κατάσταση που ταξινομείται στα κεφάλαια I-XIX ή XXI, ο χρήστης πρέπει να ανατρέξει στο 1^ο μέρος του αλφαβητικού ευρετηρίου. Όταν πρόκειται για εξωτερική αιτία τραυματισμού ή συμβάν, που περιλαμβάνεται στο κεφάλαιο XX, ο χρήστης πρέπει να ανατρέξει στο 2^ο μέρος του αλφαβητικού ευρετηρίου.
2. Ανεύρεση του κύριου λήμματος. Σε νοσήματα και τραυματισμούς, το κύριο λήμμα αφορά συνήθως τη βασική ορολογία της παθολογικής κατάστασης. Επιπλέον, περιέχονται στο αλφαβητικό ευρετήριο, ως κύριοι όροι, καταστάσεις που περιγράφονται με επιθετικούς προσδιορισμούς ή επωνυμίες.
3. Κάθε σημείωση που αφορά το κύριο λήμμα πρέπει να διαβάζεται με προσοχή και να ακολουθείται.
4. Πρέπει να διαβάζονται όλες οι διευκρινίσεις που περιέχονται σε παρενθέσεις κάτω από το κύριο λήμμα (και που δεν επηρεάζουν τον κωδικό). Επίσης πρέπει να διαβάζονται όλα τα δευτερεύοντα λήμματα (αυτά που μπορεί να τροποποιήσουν τον κωδικό), ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι μεμονωμένες συνιστώσες της διάγνωσης.
5. Όλες οι παραπομπές του αλφαβητικού ευρετηρίου («βλέπε» και «βλέπε επίσης») πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.
6. Η ορθότητα του επιλεγμένου κωδικού πρέπει να διασταυρώνεται με τον συστηματικό κατάλογο. Επισημαίνεται, ότι μια κατηγορία κωδικών τριών χαρακτήρων στο αλφαβητικό ευρετήριο, με παύλα στον τέταρτο χαρακτήρα, αντιστοιχεί σε κωδικούς με υποδιαίρεσεις τεσσάρων χαρακτήρων στον συστηματικό κατάλογο του ICD-10-GrM. Περαιτέρω υποδιαίρεσεις, που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για επιπλέον θέσεις, δεν υπάρχουν στο αλφαβητικό ευρετήριο, και πρέπει καταρχήν να οριστούν στον συστηματικό κατάλογο του ICD-10-GrM για να μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν.

7. Πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα «περιλαμβάνονται» και «εξαιρούνται» [«περιλ.» ή «εξαιρ.»] τόσο του επιλεγμένου κωδικού όσο και του κεφαλαίου, της ομάδας ή του τίτλου κεφαλαίου.
8. Καταχώριση του κωδικού.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Στο παρόν παράρτημα θα βρείτε επαναδιατυπωμένες τις ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες για την κωδικοποίηση του Σακχαρώδη Διαβήτη, της Σήψης σε σχέση με τη νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, των Νεοπλασμάτων, της Κύησης, του Τοκέτου και της Λοχείας. Σκοπός του είναι η διευκόλυνση των υπεύθυνων κωδικοποίησης στην κωδικοποίηση περιστατικών που περιλαμβάνουν τέτοιες διαγνώσεις και πράξεις. Αποτελεί επικουρικές συμβουλές και προϋποθέτει τη γνώση των ειδικών κατευθυντηρίων οδηγιών όπως αυτές περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια.

1. Συμβουλές κωδικοποίησης για τον Σακχαρώδη Διαβήτη

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) μπορεί να αποτελεί είτε την κύρια αιτία νοσηλείας του ασθενούς στο νοσοκομείο (Κύρια Διάγνωση – PD) είτε να συνυπάρχει ως συννοσηρότητα (Δευτερεύουσα Διάγνωση – SD). Αναλυτικές οδηγίες με παραδείγματα σχετικά με την κωδικοποίηση ασθενών με ΣΔ μπορούν να βρεθούν στην Ειδική Κατευθυντήρια Οδηγία 0401 (βλέπε ΕΚΟΚ σελ. 87).

Αναλόγως του τύπου του ΣΔ, αυτός μπορεί να κωδικοποιηθεί με κάποιον από τους κωδικούς που παρατίθενται στον παρακάτω Πίνακα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η θεραπευτική αγωγή με τη χρήση ινσουλίνης **δεν** υποδηλώνει τον τύπο του ΣΔ και δεν αποδεικνύει ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη.

Τύποι Σακχαρώδη Διαβήτη

Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
E10.-	Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1]
E11.-	Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 2]
E12.-	Σακχαρώδης διαβήτης που σχετίζεται με υποσιτισμό
E13.-	Άλλες μορφές σακχαρώδους διαβήτη
E14.-	Μη καθορισμένος σακχαρώδης διαβήτης
O24.-	Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση
P70.0	Σύνδρομο βρέφους της μητέρας με διαβήτη της κύησης
P70.1	Σύνδρομο βρέφους διαβητικής μητέρας
P70.2	Νεογνικός σακχαρώδης διαβήτης
R73.-	Αυξημένα επίπεδα γλυκόζης αίματος

Η κωδικοποίηση των ασθενών με ΣΔ ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Γίνεται σύμφωνα με τη λογική της πολλαπλής κωδικοποίησης όπως περιγράφεται στην οδηγία D012 και συγκεκριμένα με το σύστημα «σταυρού-αστερίσκου» (ΕΚΟΚ σελ. 22).

Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι στις κωδικοποιήσεις με αυτό το σύστημα χρειάζεται η καταχώριση ενός κωδικού ICD-10-GrM που αφορά την αιτιολογία (το υποκείμενο αίτιο – εν προκειμένω ο ΣΔ) και επισημαίνεται με σταυρό. Ακολουθείται από έναν κωδικό που αφορά την κλινική εκδήλωση και επισημαίνεται με αστερίσκο. Σημειώνεται

ότι οι κωδικοί που επισημαίνονται με αστερίσκο δε μπορούν να καταχωριστούν αν δεν προηγείται κωδικός με σταυρό.

Ωστόσο, ειδικά για τον ΣΔ, οι κωδικοί των ομάδων E10-E14 του προηγούμενου πίνακα, εμπεριέχει στο 4^ο ψηφίο πληροφορία για την ύπαρξη ή όχι επιπλοκών (π.χ. κώμα, νεφρικές επιπλοκές κλπ).

Για τις κατηγορίες E10-E14, οι πέμπτοι χαρακτήρες 0-1 προορίζονται για χρήση με τις υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα .2-.6 όπως και .8 και .9 και αντιστοιχούν στον χαρακτηρισμό του ΣΔ ως μη απορρυθμισμένος ή απορρυθμισμένος. Για τις κατηγορίες E10-E14, οι πέμπτοι χαρακτήρες 2-5 μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με την υποκατηγορία τέταρτου χαρακτήρα .7 και αντιστοιχούν στην ύπαρξη ΣΔ με πολλαπλές επιπλοκές και διαβητικού ποδιού (σε ΣΔ που χαρακτηρίζεται ως μη απορρυθμισμένος ή απορρυθμισμένος αντίστοιχα). Οι υποκατηγορίες τέταρτου χαρακτήρα .0 (κώμα) και .1 (κετοξέωση) θεωρούνται εξ ορισμού απορρυθμισμένες οπότε εκ των πραγμάτων κωδικοποιούνται με τον πέμπτο χαρακτήρα 1.

Η τιμή του σακχάρου αίματος κατά τη στιγμή της εισαγωγής του ασθενούς δεν αποτελεί ένδειξη για τον χαρακτηρισμό του διαβήτη ως «απορρυθμισμένου» ούτε για τον σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1, ούτε για τον τύπου 2. Η καταχώριση ως «απορρυθμισμένου» ή «μη απορρυθμισμένου» στηρίζεται στην κλινική πορεία του ασθενούς (αναδρομικά). Ο όρος «απορρυθμισμένος» αναφέρεται στη μεταβολική κατάσταση.

Κωδικοποίηση διαβητικού ασθενούς

Το πιο σημαντικό βήμα στην κωδικοποίηση διαβητικού ασθενούς είναι η διαπίστωση αν ο κύριος λόγος νοσηλείας (η Κύρια Διάγνωση) αφορά τη θεραπευτική αντιμετώπιση

1. Του ΣΔ (με μία ή περισσότερες επιπλοκές)
2. Μιας επιπλοκής του ΣΔ
3. Άλλης νόσου με τον ΣΔ ως Δευτερεύουσα Διάγνωση
4. Διαβητικού ποδιού

1. ΣΔ ως Κύρια Διάγνωση

Όταν ο ασθενής έχει ως Κύρια Διάγνωση τον ΣΔ και όχι κάποια επιπλοκή του, εξετάζουμε αν ο ΣΔ έχει ή όχι επιπλοκές και αν είναι απορρυθμισμένος ή όχι. Οι επιπλοκές που κωδικοποιούνται στο 4^ο ψηφίο, δεν οδηγούν σε συγκεκριμένο DRG για τον Σακχαρώδη Διαβήτη.

Έτσι, καταλήγουμε σε 3 κύριες περιπτώσεις με δύο υποπεριπτώσεις κωδικοποίησης:

- A) ΣΔ χωρίς επιπλοκές που έχει ως κωδικό τον E1x.9- (δηλαδή E10 ως E14)
- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
- B) ΣΔ με μία επιπλοκή (ανεξαρτήτως ποια) που έχει ως κωδικό τον E1x.6- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα

Διάγνωση όταν απαιτεί τη χρήση επιπλέον πόρων και αντιμετώπιση σύμφωνα με τη D003 της ΕΚΟΚ.

- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
- Γ) ΣΔ με πολλαπλές επιπλοκές που έχει ως κωδικό τον E1x.7- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση όταν απαιτεί τη χρήση επιπλέον πόρων και αντιμετώπιση σύμφωνα με τη D003 της ΕΚΟΚ.
- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 2 όταν πρόκειται για ΣΔ με άλλες πολλαπλές επιπλοκές μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 3 όταν πρόκειται για ΣΔ με άλλες πολλαπλές επιπλοκές καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.

2. Μια επιπλοκή του ΣΔ ως Κύρια Διάγνωση

Όταν ο ασθενής έχει ως Κύρια Διάγνωση μια επιπλοκή του ΣΔ και όχι τον ίδιο τον ΣΔ, εξετάζουμε ποια είναι η επιπλοκή και αν ο ΣΔ είναι απορρυθμισμένος ή όχι. Για πολλαπλές επιπλοκές, πρέπει να επιλεγεί μία ως κύρια. Μετά τον ορισμό της επιπλοκής του διαβήτη καταχωρίζεται και η κλινική του εκδήλωση, σύμφωνα με τους πίνακες κατά σύστημα που υπάρχουν παρακάτω. Οι περιπτώσεις του υπεργλυκαιμικού κώματος (τέταρτο ψηφίο .0) και της κετοξέωσης (τέταρτο ψηφίο .1) θεωρούνται εξ ορισμού απορρυθμισμένες οπότε εκ των πραγμάτων κωδικοποιούνται με τον πέμπτο χαρακτήρα 1. Οι επιπλοκές που κωδικοποιούνται στο 4^ο ψηφίο, οδηγούν σε συγκεκριμένο DRG που σχετίζεται με το όργανο που επιπλέκεται.

Έτσι, καταλήγουμε σε 8 κύριες περιπτώσεις με δύο υποπεριπτώσεις (πλην του υπεργλυκαιμικού κώματος και της κετοξέωσης) κωδικοποίησης:

- A) Υπεργλυκαιμικό κώμα που έχει ως κωδικό τον E1x.01 (δηλαδή E10 ως E14)
- B) Κετοξέωση που έχει ως κωδικό τον E1x.11 (δηλαδή E10 ως E14).
- Γ) Νεφρικές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον E1x.2- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.
 - i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
- Δ) Οφθαλμικές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον E1x.3- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.
 - i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
- E) Νευρολογικές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον E1x.4- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.
 - i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.

- ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
- ΣΤ) Περιφερικές αγγειακές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον E1x.5- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.
 - i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
- Ζ) Υπογλυκαιμία/υπογλυκαιμικό κώμα που έχει ως κωδικό τον E1x.6- (δηλαδή E10 ως E14).
 - i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
- Η) Διαβητική αρθροπάθεια που έχει ως κωδικό τον E1x.6- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.
 - i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.

3. Άλλη νόσος ως Κύρια Διάγνωση με τον ΣΔ ή επιπλοκή του ως Δευτερεύουσα

Όταν ο ασθενής έχει ως Κύρια Διάγνωση μια άλλη νόσο και όχι τον ίδιο τον ΣΔ ή επιπλοκή του, εξετάζουμε αν ο ΣΔ έχει επιπλοκές και αν είναι απορρυθμισμένος. Οι επιπλοκές του ΣΔ (ως κλινικές εκδηλώσεις) κωδικοποιούνται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση όταν απαιτεί τη χρήση επιπλέον πόρων και αντιμετώπιση σύμφωνα με τη D003 της ΕΚΟΚ. Μετά τον ορισμό της επιπλοκής του διαβήτη καταχωρίζεται και η κλινική του εκδήλωση, σύμφωνα με τους πίνακες κατά σύστημα που υπάρχουν παρακάτω. Οι επιπλοκές κωδικοποιούνται στο 4^ο ψηφίο, ακόμα και αν δεν υπάρχει κατανάλωση πόρων.

Έτσι, καταλήγουμε σε 10 κύριες περιπτώσεις με δύο υποπεριπτώσεις (πλην του υπεργλυκαιμικού κώματος και της κετοξέωσης) κωδικοποίησης

- A) Υπεργλυκαιμικό κώμα που έχει ως κωδικό τον E1x.0- (δηλαδή E10 ως E14)
 - i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
- B) Κετοξέωση που έχει ως κωδικό τον E1x.1- (δηλαδή E10 ως E14).
 - i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
- Γ) Νεφρικές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον E1x.2- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.

- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
- Δ) Οφθαλμικές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον E1x.3- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.
- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
- Ε) Νευρολογικές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον E1x.4- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.
- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
- ΣΤ) Περιφερικές αγγειακές επιπλοκές που έχουν ως κωδικό τον E1x.5- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.
- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
- Ζ) Υπογλυκαιμία/υπογλυκαιμικό κώμα που έχει ως κωδικό τον E1x.6- (δηλαδή E10 ως E14).
- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
- Η) Διαβητική αρθροπάθεια που έχει ως κωδικό τον E1x.6- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση.
- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
- Θ) ΣΔ με πολλαπλές επιπλοκές που έχει ως κωδικό τον E1x.7- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση όταν απαιτεί τη χρήση επιπλέον πόρων και αντιμετώπιση σύμφωνα με τη D003 της ΕΚΟΚ.
- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 2 όταν πρόκειται για ΣΔ με άλλες πολλαπλές επιπλοκές μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 3 όταν πρόκειται για ΣΔ με άλλες πολλαπλές επιπλοκές καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
- Ι) ΣΔ χωρίς επιπλοκές που έχει ως κωδικό τον E1x.9- (δηλαδή E10 ως E14).
- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 0 όταν πρόκειται για ΣΔ μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 1 όταν πρόκειται για ΣΔ καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.

4. Διαβητικό πόδι

Όταν ο ασθενής νοσηλεύεται για θεραπευτική αντιμετώπιση συνδρόμου διαβητικού ποδιού τότε ως Κύρια Διάγνωση ορίζεται πάντα ο ΣΔ με πολλαπλές επιπλοκές (4^ο ψηφίο .7) και εξετάζουμε αν ο ΣΔ είναι απορρυθμισμένος. Οι επιπλοκές στο σύνδρομο του Διαβητικού Ποδιού ως κλινικές εκδηλώσεις καταχωρίζονται σύμφωνα με τον πίνακα που υπάρχει παρακάτω.

Έτσι, καταλήγουμε σε 1 κύρια περίπτωση με δύο υποπεριπτώσεις κωδικοποίησης

- A) ΣΔ με πολλαπλές επιπλοκές που έχει ως κωδικό τον E1x.7- (δηλαδή E10 ως E14). Η επιπλοκή κωδικοποιείται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσα Διάγνωση όταν απαιτεί τη χρήση επιπλέον πόρων και αντιμετώπιση σύμφωνα με τη D003 της ΕΚΟΚ.
- i) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 4 όταν πρόκειται για ΣΔ με διαβητικό πόδι μη καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.
 - ii) Στο πέμπτο ψηφίο χρησιμοποιείται το 5 όταν πρόκειται για ΣΔ με διαβητικό πόδι καθορισμένο ως απορρυθμισμένο.

Όλες αυτές οι περιπτώσεις βρίσκονται συγκεντρωμένες και κωδικοποιημένες στον παρακάτω αλγόριθμο.

Αλγόριθμος κωδικοποίησης περιστατικού με Σακχαρώδη Διαβήτη

Τύπος Σακχαρώδη Διαβήτη (ΣΔ)			
E10.- Ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 1]	E11.- Μη ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης [τύπου 2]	E13.- Άλλες μορφές σακχαρώδους διαβήτη	
Κύρια Διάγνωση		Δευτερεύουσα διάγνωση	Διαβητικό πόδι
Ο ΣΔ ως Κύρια Διάγνωση	Μια επιπλοκή ως Κύρια Διάγνωση	Άλλη νόσος ως Κύρια Διάγνωση	
Επιπλοκές	Επιπλοκές	Επιπλοκές	
Πολλαπλές επιπλοκές E1x.7- Μία επιπλοκή (ανεξαρτήτως ποια) E1x.6- (άλλη καθορισμένη επιπλοκή) Χωρίς επιπλοκές E1x.9-	Υπεργλυκαιμικό κώμα E1x.01 Κετοξέωση E1x.11 Νεφρικές επιπλοκές E1x.2- Οφθαλμικές επιπλοκές E1x.3- Νευρολογικές επιπλοκές E1x.4- Περιφερικές αγγειακές επιπλοκές E1x.5- Υπογλυκαιμία/ υπογλυκαιμικό κώμα E1x.6- (άλλη καθορισμένη επιπλοκή) Διαβητική αρθροπάθεια E1x.6- (άλλη καθορισμένη επιπλοκή)	Υπεργλυκαιμικό κώμα E1x.0- Κετοξέωση E1x.1- Νεφρικές επιπλοκές E1x.2- Οφθαλμικές επιπλοκές E1x.3- Νευρολογικές επιπλοκές E1x.4- Περιφερικές αγγειακές επιπλοκές E1x.5- Υπογλυκαιμία/ υπογλυκαιμικό κώμα E1x.6- (άλλη καθορισμένη επιπλοκή) Διαβητική αρθροπάθεια E1x.6- (άλλη καθορισμένη επιπλοκή) Πολλαπλές επιπλοκές E1x.7- Χωρίς επιπλοκές E1x.9-	Πολλαπλές επιπλοκές E1x.7-
Σημείωση: Οι επιπλοκές που κωδικοποιούνται στο 4 ^ο ψηφίο, δεν οδηγούν σε συγκεκριμένο DRG για τον Σακχαρώδη Διαβήτη	Προσοχή: Για πολλαπλές επιπλοκές, πρέπει να επιλεγθεί μία ως κύρια Σημείωση: Οι επιπλοκές που κωδικοποιούνται στο 4 ^ο ψηφίο, οδηγούν σε συγκεκριμένο DRG που σχετίζεται με το όργανο που επιπλέκεται	Σημείωση: Ο ΣΔ με επιπλοκές κωδικοποιούνται στο 4 ^ο ψηφίο, ακόμα και αν δεν υπάρχει κατανάλωση πόρων. Οι επιπλοκές κωδικοποιούνται επιπλέον ως κλινικές εκδηλώσεις όταν υπάρχει κατανάλωση πόρων	Σημείωση: Το σύνδρομο Διαβητικού Ποδιού κωδικοποιείται στο 4 ^ο ψηφίο πάντα με «πολλαπλές επιπλοκές
Απορρύθμιση	Απορρύθμιση	Απορρύθμιση	Απορρύθμιση
Με πολλαπλές επιπλοκές E1x.72 Μη απορρυθμισμένος E1x.73 Απορρυθμισμένος	E1x.01 Υπεργλυκαιμικό κώμα E1x.11 Κετοξέωση	Με πολλαπλές επιπλοκές E1x.72 Μη απορρυθμισμένος E1x.73 Απορρυθμισμένος	E1x.74 Μη απορρυθμισμένος E1x.75 Απορρυθμισμένος
Με μία ή χωρίς επιπλοκές E1x.x0 Μη απορρυθμισμένος E1x.x1 Απορρυθμισμένος	Άλλη (4 ^ο ψηφίο: 2, 3, 4, 5 ή 6) E1x.x0 Μη απορρυθμισμένος E1x.x1 Απορρυθμισμένος	Με μία ή χωρίς επιπλοκές E1x.x0 Μη απορρυθμισμένος E1x.x1 Απορρυθμισμένος	

Στους παρακάτω πίνακες αναγράφονται οι κωδικοί ICD-10-GrM όλων των πιθανών επιπλοκών ως κλινικές εκδηλώσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την κωδικοποίηση ασθενών με ΣΔ. Υπενθυμίζεται ότι οι επιπλοκές ως κλινικές εκδηλώσεις κωδικοποιούνται επιπλέον χωριστά ως Δευτερεύουσες Διαγνώσεις όταν απαιτούν τη χρήση επιπλέον πόρων και αντιμετώπιση σύμφωνα με τη D003 της ΕΚΟΚ, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά από τις παρούσες οδηγίες.

Νεφρικές επιπλοκές

Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
N08.3*	Σπειραματικές διαταραχές στο σακχαρώδη διαβήτη (E10-E14, με το 2+ στον τέταρτο χαρακτήρα)
N18.1	Χρόνια νεφρική νόσος, 1ου σταδίου
N18.2	Χρόνια νεφρική νόσος, 2ου σταδίου
N18.3	Χρόνια νεφρική νόσος, 3ου σταδίου
N18.4	Χρόνια νεφρική νόσος, 4ου σταδίου
N18.5	Χρόνια νεφρική νόσος, 5ου σταδίου

Οφθαλμικές επιπλοκές

Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
H28.0*	Διαβητικός καταρράκτης (E10-E14 με τέταρτο χαρακτήρα το .3+)
H36.0*	Διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια (E10-E14, με τέταρτο χαρακτήρα το .3+)
H54.-	Τύφλωση και ελαττωμένη όραση
H35.8	Άλλες καθορισμένες διαταραχές του αμφιβληστροειδούς

Νευρολογικές επιπλοκές

Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
G59.0*	Διαβητική μονονευροπάθεια (E10-E14, με τέταρτο χαρακτήρα .4+)
G63.2*	Διαβητική πολυνευροπάθεια (E10-E14, 5ος χαρακτήρας .4+)
G73.0*	Μιασθενικά σύνδρομα σε ενδοκρινολογικά νοσήματα
G99.0*	Αυτόνομη νευροπάθεια σε ενδοκρινολογικά και μεταβολικά νοσήματα

Περιφερικές αγγειακές επιπλοκές

Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
I79.2*	Περιφερική αγγειοπάθεια σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
I70.2-	Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων

Διαβητική αρθροπάθεια

Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
M14.2-*	Διαβητική αρθροπάθεια (E10-E14, με τέταρτο χαρακτήρα .6+)
M14.6-*	Νευροπαθητική αρθροπάθεια

Άλλες επιπλοκές στο διαβητικό πόδι

Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
L02.4	Δερματικό απόστημα, δοθιήνας και ψευδάνθρακας των άκρων
L03.02	Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] των δακτύλων του κάτω άκρου
L03.11	Φλέγμονας [κυτταρίτιδα] του κάτω άκρου
L89.-	Έλκος κατάκλισης και πίεσης
L97	Έλκος του κάτω άκρου, που δεν ταξινομείται αλλού
A46	Ερυσίπελας [κυτταρίτιδα]
M20.1	Βλαισός μεγάλος δάκτυλος του ποδός (επίκτητος)
M20.2	Δύσκαμπτος μεγάλος δάκτυλος του ποδός
M20.3	Άλλη (επίκτητη) παραμόρφωση του μεγάλου δακτύλου του ποδός
M20.4	Άλλη σφυροδακτυλία του ποδός (επίκτητη)
M20.5	Άλλες παραμορφώσεις του(ων) δακτύλου(ων) του ποδός (επίκτητες)
M20.6	Επίκτητη παραμόρφωση του(ων) δακτύλου(ων) του ποδός, μη καθορισμένη
M21.-	Άλλες επίκτητες παραμορφώσεις των άκρων
I70.20	Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Άλλη και μη καθορισμένη
I70.21	Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με ισχαιμικό άλγος που προκαλείται από κόπωση
I70.22	Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με άλγος ηρεμίας
I70.23	Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με εξέγκωση
I70.24	Αθηροσκλήρωση των αρτηριών των άκρων: Λαγονομηριαίος τύπος με γάγγραινα
Z89.-	Απώλεια άκρου

Άλλοι κωδικοί για ιδιαίτερες νοσολογικές οντότητες

Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
Εγκυμοσύνη	
O24.-	Σακχαρώδης διαβήτης στην κύηση
Νεογνά	
P70.-	Παροδικές διαταραχές του μεταβολισμού των υδατανθράκων ειδικές για το έμβρυο και το νεογνό
Υπερ-/Υπογλυκαμία χωρίς σακχαρώδη διαβήτη	
E15	Υπογλυκαιμικό κώμα, μη διαβητικό
E16.0	Φαρμακευτικής αιτιολογίας υπογλυκαμία χωρίς κώμα
E16.1	Άλλες μορφές υπογλυκαμίας
E16.2	Υπογλυκαμία μη καθορισμένη
E16.9	Διαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος, μη καθορισμένη
E89.1	Υποϊνσουλιναμία μετά από ιατρική επέμβαση
R73.0	Παθολογική δοκιμασία ανοχής γλυκόζης
R73.9	Υπεργλυκαμία, μη καθορισμένη

Σακχαρώδης διαβήτης μετά από ιατρική επέμβαση

Στην περίπτωση σακχαρώδους διαβήτη μετά από ιατρική επέμβαση πρέπει να καταχωρίζεται αρχικά ένας κωδικός από τους

E13.– Άλλες μορφές σακχαρώδους διαβήτη

Περιλαμβ.: σακχαρώδης διαβήτης σε βλάβη ή αφαίρεση του παγκρέατος ακολουθούμενος από τον κωδικό

E89.1 Υποϊνσουλιναίμια μετά από ιατρική επέμβαση.

Μεταβολικό σύνδρομο

Σε περίπτωση «μεταβολικού συνδρόμου» πρέπει να καταχωρίζονται χωριστά οι επιμέρους διαταραχές (βλέπε επίσης ΕΚΟΚ D004 *Σύνδρομο* (σελίδα 12)).

Διαταραχές της ενδοκρινούς έκκρισης του παγκρέατος

Οι κωδικοί

E16.0 Φαρμακευτικής αιτιολογίας υπογλυκαιμία χωρίς κώμα

E16.1 Άλλες μορφές υπογλυκαιμίας

E16.2 Υπογλυκαιμία, μη καθορισμένη

E16.8 Άλλες καθορισμένες διαταραχές της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος

E16.9 Διαταραχή της ενδοκρινικής λειτουργίας του παγκρέατος, μη καθορισμένη

δεν πρέπει να καταχωρίζονται σε **διαβητικούς ασθενείς** ως κύριοι κωδικοί.

2. Συμβουλές κωδικοποίησης για τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και τη Σήψη

Ασθενείς νοσηλευόμενοι στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και ασθενείς με σήψη απορροφούν σημαντικό κομμάτι των διαθέσιμων πόρων μιας υγειονομικής μονάδας. Επίσης, λόγω της ιδιαιτερότητας τους, έχουν αυξημένο βαθμό πολυπλοκότητας στην κωδικοποίηση τους για το σύστημα DRG. Σε αυτό το κεφάλαιο θα δούμε κάποιες συμβουλές που έχουν ως στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας για τον κωδικοποιητή.

Μηχανικός αερισμός

Ο μηχανικός αερισμός αποτελεί ένα πρακτικά αναπόσπαστο κομμάτι της θεραπευτικής αντιμετώπισης ασθενών στη ΜΕΘ. Επίσης, αποτελεί μια σημαντικότερη παράμετρο για τον καθορισμό του DRG που θα λάβει ο ασθενής. Για αυτόν τον λόγο χρειάζεται ακρίβεια στον προσδιορισμό της διάρκειας του μηχανικού αερισμού. Ο τρόπος υπολογισμού της περιγράφεται αναλυτικά στις Ελληνικές Κατευθυντήριες Οδηγίες Κωδικοποίησης (ΕΚΟΚ σελ. 119, Οδηγία 1001).

Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται οι πιο συχνοί κωδικοί ιατρικών πράξεων που σχετίζονται με τη διαχείριση των αεραγωγών.

Κωδικοί ΕΤΙΠ σχετικοί με τη διαχείριση των αεραγωγών

Κωδικός ΕΤΙΠ	Περιγραφή
331.01.xx	Παροδική τραχειοστομία
331.02.xx	Μόνιμη τραχειοστομία
570.01	Απλή ενδοτραχειακή διασωλήνωση
570.04	Διασωλήνωση με σωλήνα διπλού αυλού
570.06	Τοποθέτησης μάσκας για μηχανική υποστήριξη της αναπνοής

Αξιολόγηση βαρύτητας νοσηλευόμενου στη ΜΕΘ ενηλίκων και παιδιών

Προκειμένου να αξιολογηθεί με ακρίβεια η βαρύτητα ενός περιστατικού που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ενηλίκων, χρησιμοποιούνται ειδικοί κωδικοί που αποδίδουν «πόντους εντατικής φροντίδας». Αυτοί οι πόντοι υπολογίζονται σε ημερήσια βάση με τη χρήση τροποποιημένων μορφών του SAPS II (Simplified Acute Physiology Score), που αξιολογεί τη σοβαρότητα του νοσηλευόμενου περιστατικού, και του TISS (Therapeutic Intervention Scoring System), που καταγράφει τον νοσηλευτικό και θεραπευτικό φόρτο. Μπορείτε να βρείτε τους πίνακες που περιγράφουν αυτές τις κλίμακες στην ΕΤΙΠ.

Για ασθενείς που νοσηλεύονται στη ΜΕΘ παιδιών ακολουθείται παρόμοια διαδικασία που χρησιμοποιεί, αντί για το SAPS II και το TISS, μια διαφορετική κλίμακα 25 σημείων.

Προς διευκόλυνση του υπολογισμού των πόντων και αντιστοίχιση στον κατάλληλο κωδικό ΕΤΙΠ, διατίθεται ειδική εφαρμογή στην πλατφόρμα κωδικοποίησης. Μπορείτε να βρείτε τους πίνακες που περιγράφουν αυτές τις κλίμακες στην ΕΤΙΠ.

Για την καταχώριση ενός κωδικού ETIP για Ιατρική σύνθετη περίθαλψη σε μονάδα εντατικής θεραπείας ενηλίκων ή παιδών πρέπει να συντρέχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Αυτές περιγράφονται αναλυτικά στην ETIP, στις σημειώσεις των αντίστοιχων κωδικών.

Κωδικοποίηση ασθενών με λοίμωξη

Για ασθενή που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ ενηλίκων για 1 ημέρα, ο αντίστοιχος κωδικός θα είναι σίγουρα ο 598.00.00

Για ασθενή που νοσηλεύεται στη ΜΕΘ παιδών για 1 ημέρα, ο αντίστοιχος κωδικός θα είναι σίγουρα ο 598.13.00

Η κωδικοποίηση των ασθενών με λοίμωξη ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες. Γίνεται σύμφωνα με τη λογική της πολλαπλής κωδικοποίησης όπως περιγράφεται στην οδηγία D012 και συγκεκριμένα με το σύστημα «σταυρού-αστερίσκου» (ΕΚΟΚ σελ. 22).

Συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι στις κωδικοποιήσεις με αυτό το σύστημα χρειάζεται η καταχώριση ενός κωδικού ICD-10-GrM που αφορά την αιτιολογία (το υποκείμενο αίτιο) και επισημαίνεται με σταυρό. Ακολουθείται από έναν κωδικό που αφορά την κλινική εκδήλωση και επισημαίνεται με αστερίσκο. Σημειώνεται ότι οι κωδικοί που επισημαίνονται με αστερίσκο δε μπορούν να καταχωριστούν αν δεν προηγείται κωδικός με σταυρό.

Παράδειγμα

Ένας ασθενής πάσχει από καντινιασική μηνιγγίτιδα. Αρχικά, καταχωρίζεται ο κωδικός B37.5+ Καντινιασική μηνιγγίτιδα (G02.1*). Στο τέλος του κωδικού υπάρχει σε παρένθεση ο κωδικός με αστερίσκο που πρέπει να καταχωριστεί, ώστε να απεικονίζεται στο σύνολό της η κλινική πληροφορία. Εν προκειμένω, ο κωδικός είναι ο G02.1* Μηνιγγίτιδα σε μυκητιασικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού.

Υπάρχουν διάφοροι όροι και καταστάσεις που συναντώνται σε ασθενείς με λοίμωξη ή σήψη και θα αναφερθούν παρακάτω. Στον ακόλουθο πίνακα περιγράφονται τέτοιοι όροι.

Όροι που σχετίζονται με λοιμώξεις

Όρος	Περιγραφή
Βακτηριαμία	Η απομόνωση βακτηρίων από καλλιέργειες αίματος
Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS]	Γενικευμένη φλεγμονώδης αντίδραση που αποδίδεται σε διάφορα αίτια (π.χ. λοίμωξη, έγκαιμα, τραύμα)
Σήψη (σηψαιμία)	SIRS που προκαλείται από λοίμωξη
Βαριά σήψη	Σήψη με επιπλοκές οργάνων
Σηπτική καταπληξία	Βαριά σήψη με καταπληξία

Παρακάτω θα εξετάσουμε συνοπτικά αυτές τις καταστάσεις στο πλαίσιο της νοσηλείας σε ΜΕΘ.

Βακτηριαμία

Ως βακτηριαμία ορίζεται η απομόνωση βακτηρίων από το αίμα (θετική καλλιέργεια). Η κωδικοποίηση της βακτηριαμίας γίνεται σύμφωνα με την οδηγία D012 *Πολλαπλή κωδικοποίηση* (ΕΚΟΚ σελ. 22 - σύστημα «σταυρού-αστερίσκου»). Μοναδική εξαίρεση αποτελεί η βακτηριαμία από μηνιγγιτιδόκοκκο που κωδικοποιείται με τον κωδικό:

A39.4 *Μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία, μη καθορισμένη*

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις χρησιμοποιείται ένας κωδικός της ομάδας A49.- ή με έναν άλλον κωδικό που περιγράφει τον συγκεκριμένο παθογόνο μικροοργανισμό π.χ.:

A54.9 *Γονοκοκκική λοίμωξη, μη καθορισμένη.*

Αντίθετα, η σηψαιμία πρέπει να κωδικοποιείται με τον αντίστοιχο κωδικό της σηψαιμίας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Αυτό ισχύει και για την κλινική εκδήλωση της **ουροσήψης**.

Κωδικοί ICD-10-GrM για τη σηψαιμία	
A02.1	Σηψαιμία από σαλμονέλλα
A32.7	Σηψαιμία από λιστέρια
A39.2	Οξεία μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία
A39.3	Χρονία μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία
A39.4	Μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία, μη καθορισμένη
A40.-	Στρεπτοκοκκική σηψαιμία
A41.-	Άλλες μορφές σηψαιμίας
B37.7	Καντινιασική σηψαιμία
P36.-	Βακτηριακή σηψαιμία του νεογνού

Η σηψαιμία που σχετίζεται με αποβολή, έκτοπη κύηση, μύλη κύηση, τοκετό ή λοχεία πρέπει να κωδικοποιείται με τους αντίστοιχους κωδικούς από τον παρακάτω πίνακα. Πρόσθετα πρέπει να χρησιμοποιείται και ένας κωδικός από τον προηγούμενο πίνακα, που παραπέμπει στην ύπαρξη σηψαιμίας, καθώς και επιπρόσθετος κωδικός που παραπέμπει στον παθογόνο μικροοργανισμό.

Κωδικοί ICD-10-GrM για τη σηψαιμία που σχετίζεται με αποβολή, έκτοπη κύηση, μύλη κύηση, τοκετό ή λοχεία	
O03-O07	Κύηση που καταλήγει σε αποβολή (αυτόματη ή προκλητή)
O08.0	Λοίμωξη των γυναικείων γεννητικών οργάνων και της πυέλου μετά από αποβολή, εξωμήτριο και μύλη κύηση
O75.3	Άλλη λοίμωξη κατά τη διάρκεια του τοκετού
O85	Επιλόχειος πυρετός


Σήψη(σηψαιμία) και Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS]

Ήδη από το 2016, έχουν αλλάξει οι ορισμοί της σήψης σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες του Surviving Sepsis Campaign επικεντρώνοντας στις επιπλοκές οργάνων και όχι σε κλινικοεργαστηριακές παραμέτρους όπως η θερμοκρασία, οι σφύξεις της καρδιάς, ο αναπνευστικός ρυθμός και ο αριθμός των λευκοκυττάρων στη γενική αίματος, που αποτελούν τα κριτήρια ορισμού του SIRS. Ωστόσο, το σύστημα DRG χρησιμοποιεί ακόμα την παλιά κατάταξη, οπότε η γνώση αυτών των παραμέτρων είναι απαραίτητη. Σε επόμενη αναθεώρηση του συστήματος, θα αναπροσαρμοστούν αντιστοίχως και οι ορισμοί.

Για τον καθορισμό του SIRS πρέπει να λαμβάνονται υπόψη:

1. Τα κριτήρια ισχύουν για ασθενείς άνω των 16 ετών
2. Τα κριτήρια και οι επιπλοκές οργάνων πρέπει να τεκμηριώνονται στον ιατρικό φάκελο. Βλέπε σχετικά την Εικόνα και τον Πίνακα παρακάτω
3. Για την περίπτωση του SIRS με λοίμωξη, πρέπει να τεκμηριώνεται η λοίμωξη είτε με θετική καλλιέργεια είτε με σαφή κλινικά κριτήρια

Κριτήρια SIRS και σήψης σύμφωνα με το σύστημα Gr-DRG



- Κριτήρια SIRS (τουλάχιστο 2)
1. Πυρετός ($\geq 38.0^{\circ}\text{C}$) ή υποθερμία ($\leq 36,0^{\circ}\text{C}$)
 2. Ταχυκαρδία ($\geq 90/\text{min}$)
 3. Ταχύπνοια ($\geq 20/\text{min}$) ή υπεραερισμός (στα αέρια αρτ. αίματος $\text{PaCO}_2 \leq 33\text{mmHg}$)
 4. Λευκοκυττάρωση ($\geq 12000/\text{mm}^3$) ή λευκοπενία ($<4000/\text{mm}^3$) ή $\geq 10\%$ άωρες μορφές ουδετεροφίλων

Πρώτα πρέπει να καταχωρίζεται ένας κωδικός για τη σηψαιμία ή το υποκείμενο νόσημα που προκαλεί SIRS μη λοιμώδους αιτιολογίας και μετά να ακολουθεί ένας κωδικός της κατηγορίας R65.-! *Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS]*. Για την κωδικοποίηση συστηματικών επιπλοκών, παθογόνων μικρο-οργανισμών και πιθανής αντοχής αυτών, πρέπει να χρησιμοποιούνται πρόσθετοι κωδικοί.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι επιπλοκές οργάνων στη σήψη με τον αντίστοιχο κωδικό και την περιγραφή τους.

Επιπλοκές οργάνων στη σήψη

Επιπλοκή	Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
Οξεία εγκεφαλοπάθεια	G93.4 <i>Εγκεφαλοπάθεια, μη καθορισμένη</i>	Διαταραγμένη εγρήγορση, αποπροσανατολισμός, ανησυχία, παραλήρημα
Οξεία υπόταση – καταπληξία	R57.2 <i>Σηπτική καταπληξία (shock)</i>	Συστολική αρτηριακή πίεση ≤ 90 mmHg ή μέση αρτηριακή πίεση ≤ 70 mmHg τουλάχιστον για μία ώρα παρά την επαρκή χορήγηση υγρών και εφόσον αποκλειστούν άλλα αίτια καταπληξίας
Σχετική ή απόλυτη θρομβοπενία	D69.58 <i>Άλλη δευτεροπαθής θρομβοπενία, μη χαρακτηρισμένη ως ανθεκτική στη μετάγγιση</i>	Πτώση των αιμοπεταλίων περισσότερο από 30% εντός 24ώρου ή απόλυτος αριθμός αιμοπεταλίων $\leq 100000 / \text{mm}^3$, αφού έχει αποκλειστεί η θρομβοπενία λόγω οξείας αιμορραγίας
Αρτηριακή υποξαιμία	J96.00 <i>Οξεία αναπνευστική ανεπάρκεια, που δεν ταξινομείται αλλού: Τύπου I [υποξαιμία]</i>	$\text{PaO}_2 \leq 70$ mmHg χωρίς οξυγόνο ή ο λόγος $\text{PaO}_2/\text{FiO}_2 \leq 250$ mmHg με οξυγόνο και εφόσον έχει αποκλειστεί προφανής καρδιακή ή πνευμονική νόσος ως αιτία υποξαιμίας
Νεφρική δυσλειτουργία	N17.9 <i>Οξεία νεφρική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη</i>	Διούρηση 0,5 ml/kg βάρους σώματος/h ή λιγότερο για τουλάχιστον 2 ώρες παρά την επαρκή χορήγηση υγρών και/ή αύξηση της κρεατινίνης ορού περισσότερο από 2 φορές πάνω από την ανώτερη φυσιολογική τιμή
Μεταβολική οξέωση	E87.2 <i>Οξέωση</i>	Έλλειμμα βάσης ≤ -5 mmol/l ή συγκέντρωση γαλακτικού πάνω από 1,5 φορές πάνω από την ανώτερη φυσιολογική τιμή

Ωστόσο, όταν η σήψη προκύπτει ως επιπλοκή από χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις, που δεν ταξινομείται αλλού πρέπει να χρησιμοποιείται κάποιος από τους κάτωθι κωδικούς.

Κωδικοποίηση σήψης ως επιπλοκή από χειρουργικές επεμβάσεις και ιατρικές πράξεις, που δεν ταξινομείται αλλού

Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
T80.2	Λοιμώξεις μετά από έγχυση, μετάγγιση ή ένεση για θεραπευτικούς σκοπούς
T81.4	Μόλυνση μετά από ιατρική επέμβαση, που δεν ταξινομείται αλλού
T88.0	Λοίμωξη μετά από εμβόλιο [ανοσοποίηση]

Αν υπάρχει σηπτική καταπληξία, καταχωρίζεται επιπρόσθετα ο κωδικός R57.2 *Σηπτική καταπληξία (shock)*

Σειρά καταχώρισης κωδικών στη σήψη

Γίνεται κατανοητό ότι για τη σωστή ταξινόμηση στα αντίστοιχα DRG, έχει σημασία η ορθή σειρά καταχώρισης των κωδικών σε ένα περιστατικό με σήψη. Η σειρά είναι η ακόλουθη:

1. Κωδικός σήψης (βλέπε παραπάνω στον πίνακα Κωδικών ICD-10-GrM για τη σηψαιμία)
2. Κωδικός SIRS με λοίμωξη και με/χωρίς επιπλοκή οργάνων (R65.1! ή R65.0!)
3. Αν υπάρχει σήψη με επιπλοκές οργάνων (R65.1!), καταχωρίζεται ο κωδικός της επιπλοκής (π.χ. R57.2 *Σηπτική καταπληξία (shock)*).
4. Εφόσον είναι γνωστό το υπεύθυνο παθογόνο και ανευρίσκεται να είναι ανθεκτικό/πολυανθεκτικό, πρέπει να καταχωρίζεται επιπρόσθετος κωδικός από τον παρακάτω πίνακα.

Κωδικοποίηση ανθεκτικών και πολυανθεκτικών παθογόνων στα αντιβιοτικά

Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
U80.00!	Χρυσίζων σταφυλόκοκκος [<i>Staphylococcus aureus</i>] ανθεκτικός στην οξακιλλίνη ή μεθικιλίνη [MRSA]
U80.01!	Χρυσίζων σταφυλόκοκκος [<i>Staphylococcus aureus</i>] ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια, κινολόνες, στρεπτογραμίνες ή οξαζολιδινόνες [λινεζολίδες] και μη ανθεκτικός (ευαίσθητος) στην οξακιλλίνη ή μεθικιλίνη
U80.10!	Πνευμονιόκοκκος [<i>Streptococcus pneumoniae</i>], ανθεκτικός στην πενικιλίνη ή στην οξακιλλίνη
U80.11!	Πνευμονιόκοκκος [<i>Streptococcus pneumoniae</i>], ανθεκτικός στις μακρολίδες, οξαζολιδινόνες ή στρεπτογραμίνες και μη ανθεκτικός (ευαίσθητος) στην πενικιλίνη και οξακιλλίνη
U80.20!	<i>Enterococcus faecalis</i> , ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια
U80.21!	<i>Enterococcus faecalis</i> , ανθεκτικός στις οξαζολιδινόνες ή με υψηλού επιπέδου αντοχή στις αμινογλυκοσίδες και μη ανθεκτικός (ευαίσθητος) στα γλυκοπεπτίδια
U80.30!	<i>Enterococcus faecium</i> , ανθεκτικός στα γλυκοπεπτίδια
U80.31!	<i>Enterococcus faecium</i> , ανθεκτικός στις οξαζολιδινόνες ή στρεπτογραμίνες ή με υψηλού επιπέδου αντοχή στις αμινογλυκοσίδες και μη ανθεκτικός (ευαίσθητος) στα γλυκοπεπτίδια
U80.4!	Κολοβακτηρίδιο [<i>Escherichia coli</i>], κλεμψιέλλα [<i>Klebsiella</i>] και πρωτέας [<i>Proteus</i>] ανθεκτικά στις κινολόνες, καρβαπενέμες, αμικασίνη, ή με τεκμηριωμένη ανθεκτικότητα στις β-λακτάμες [ESBL]
U80.5!	<i>Enterobacter</i> , <i>Citrobacter</i> και <i>Serratia</i> ανθεκτικά στις καρβαπενέμες, κινολόνες ή αμικασίνη
U80.6!	<i>Pseudomonas aeruginosa</i> και άλλοι αζυμωτικοί βακτηριακοί παράγοντες ανθεκτικοί στις καρβαπενέμες, κινολόνες, αμικασίνη, κεφταζιδίμη ή πιπερακιλλίνη/ταζοβακτάμη
U80.7!	<i>Burkholderia</i> και <i>Stenotrophomonas</i> ανθεκτικά στις κινολόνες, αμικασίνη, κεφταζιδίμη, πιπερακιλλίνη/ταζομπακτάμη, ή κοτριμοξαζόλη

U81!	Βακτήρια πολυανθεκτικά στα αντιβιοτικά
U82.0!	Μυκοβακτηρίδιο φυματίωσης [Mycobacterium tuberculosis] ανθεκτικό σε ένα ή παραπάνω αντιφυματικά πρώτης γραμμής
U82.1!	Πολυανθεκτική φυματίωση [MDR-TB]
U82.2!	Άτυπα μυκοβακτηρίδια ή Nocardia ανθεκτικά σε ένα ή παραπάνω αντιφυματικά πρώτης γραμμής
U83!	Κάντιντα [Candida] ανθεκτική στη φλουконаζόλη ή βορικοναζόλη
U84!	Ιός του απλού έρπητα [HSV] ανθεκτικός στα αντιικά φάρμακα
U85!	Ιός της επίκτητης ανοσολογικής ανεπάρκειας του ανθρώπου [HIV] ανθεκτικός στα αντιικά φάρμακα και στους αναστολείς πρωτεάσης

Εφόσον, υπάρχουν ανθεκτικά/πολυανθεκτικά παθογόνα στα αντιβιοτικά, αυτά θα πρέπει να κωδικοποιούνται ασχέτως της βαρύτητας της σήψης σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα.

Όταν υπάρχει αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών με Συνδυαστική θεραπεία σε αποικισμό ή λοίμωξη από πολυανθεκτικά στελέχη μικροβίων καταχωρίζεται ως Ιατρική Πράξη, ένας κωδικός ΕΤΙΠ της ομάδας 598.07.xx.xx *Συνδυαστική θεραπεία σε αποικισμό ή λοίμωξη από πολυανθεκτικά στελέχη μικροβίων*, αναλόγως της χρήσης μονάδας απομόνωσης και της διάρκειας των ημερών θεραπείας, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα. Οι προϋποθέσεις χρήσεις των συγκεκριμένων κωδικών παρατίθενται στις Σημειώσεις της εν λόγω ομάδας.

Συνδυαστική θεραπεία σε αποικισμό ή λοίμωξη από πολυανθεκτικά στελέχη μικροβίων

Κωδικός ΕΤΙΠ	Περιγραφή
598.07.00.xx	Σύνθετη περίθαλψη σε τμήματα λοιμώξεων με μονάδα απομόνωσης
598.07.01.xx	Σύνθετη περίθαλψη όχι σε ειδική μονάδα απομόνωσης

Τελική αντιστοίχιση του περιστατικού σε DRG σήψης

Η τελική αντιστοίχιση σε DRG σήψης εξαρτάται εντέλει πέρα από τη διάγνωση της σήψης, από την ηλικία, τη βαρύτητα του περιστατικού σε σχέση με τις συννοσηρότητες/επιπλοκές (CCL και PCCL του περιστατικού) και την ηλικία. Αναλόγως της τελικής αντιστοίχισης, το περιστατικό θα λάβει ένα από τα DRG που φαίνονται στον παρακάτω πίνακα με τους αντίστοιχους Συντελεστές Κόστους Βαρύτητας (ΣΒΚ). Καθίσταται σαφές λοιπόν, ότι έχει μεγάλη σημασία η ακριβής καταγραφή όλων των σχετικών διαγνώσεων και πράξεων που αφορούν το περιστατικό προκειμένου να γίνει η σωστή αντιστοίχιση.

Πίνακας των DRG σήψης

DRG	Περιγραφή
T60A	Σήψη με πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου, με εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε
T60B	Σήψη με πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία <16 ετών ή με παρα-/τετραπληγία ή χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία <16 ετών ή με παρα-/τετραπληγία
T60C	Σήψη με πολλαπλές επιπλοκές ή μετά από μεταμόσχευση οργάνου, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥16 ετών ή χωρίς παρα-/τετραπληγία ή χωρίς πολλαπλές επιπλοκές εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, με σύνθετη διάγνωση ή εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥16 ετών ή με παρα-/τετραπληγία
T60D	Σήψη χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία < 10 ετών
T60E	Σήψη χωρίς πολλαπλές επιπλοκές, εκτός από κατάσταση μετά από μεταμόσχευση οργάνου, χωρίς σύνθετη διάγνωση, χωρίς εξαιρετικά υψηλής βαρύτητας Σ/Ε, ηλικία ≥ 10 ετών
T60F	Σήψη, θάνατος < 5 ημέρες μετά την εισαγωγή

ΣΒΚ: Συντελεστής Βαρύτητας Κόστους; Σ/Ε: Συννοσηρότητα/Επιπλοκή

Κωδικοί ΕΤΙΠ για συνδυαστική θεραπεία σε αποικισμό ή λοίμωξη από πολυανθεκτικά στελέχη μικροβίων

Κωδικός ΕΤΙΠ	Περιγραφή
598.07.00.xx	Συνδυαστική θεραπεία σε αποικισμό ή λοίμωξη από πολυανθεκτικά στελέχη μικροβίων: Σύνθετη περίθαλψη σε τμήματα λοιμώξεων <u>με</u> ειδική μονάδα απομόνωσης
598.07.01.xx	Συνδυαστική θεραπεία σε αποικισμό ή λοίμωξη από πολυανθεκτικά στελέχη μικροβίων: Σύνθετη περίθαλψη <u>όχι σε</u> ειδική μονάδα απομόνωσης

Κοινοί κωδικοί ICD-10-GrM και ΕΤΙΠ στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται κοινοί κωδικοί ICD-10-GrM και ΕΤΙΠ που χρησιμοποιούνται στη ΜΕΘ και μπορεί να έχουν αντίκτυπο στην απεικόνιση της βαρύτητας του περιστατικού σε σχέση με τις συννοσηρότητες/επιπλοκές (CCL και PCCL του περιστατικού).

Κοινοί κωδικοί ICD-10-GrM στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Κωδικός ICD-10-GrM	Περιγραφή
A04.7	Εντεροκολίτιδα από <i>Clostridium difficile</i>
A40.-	Στρεπτοκοκκική σηψαιμία
A41.-	Άλλες μορφές σηψαιμίας
B37.-	Καντιντίαση
B95.-!	Στρεπτόκοκκος [<i>Streptococcus</i>] και σταφυλόκοκκος [<i>Staphylococcus</i>] ως αιτιολογικός παράγοντας σε νοσήματα που ταξινομούνται σε άλλα κεφάλαια
D69.4-	Άλλη πρωτοπαθής θρομβοπενία
D69.5-	Δευτεροπαθής θρομβοπενία
D69.8	Άλλες καθορισμένες αιμορραγικές διαθέσεις
E87.-	Άλλες διαταραχές των υγρών, των ηλεκτρολυτών και της οξεοβασικής ισορροπίας
G00.-	Μικροβιακή μηνιγγίτιδα που δεν ταξινομείται αλλού
G01*	Μηνιγγίτιδα σε μικροβιακά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G02.-*	Μηνιγγίτιδα σε άλλα λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
G40.3	Γενικευμένη ιδιοπαθής επιληψία και επιληπτικά σύνδρομα
G40.5	Ειδικά επιληπτικά σύνδρομα
G40.6	Κρίσεις μείζονος επιληψίας [grand mal], μη καθορισμένες (με ή χωρίς ελάσσονες επιληπτικές κρίσεις [petit mal])
G40.7	Ελάσσονες επιληπτικές κρίσεις [petit mal], μη καθορισμένες, χωρίς κρίσεις μείζονας επιληψίας [grand mal]
G40.8	Άλλη επιληψία
G40.9	Επιληψία, μη καθορισμένη
G41.-	Status epilepticus [Επιληπτική κατάσταση]
J13	Πνευμονία από στρεπτόκοκκο της πνευμονίας [<i>S. pneumoniae</i>]
J14	Πνευμονία από αιμόφιλο της ινφλουέντζας [<i>H. influenzae</i>]
J15.-	Βακτηριακή πνευμονία, που δεν ταξινομείται αλλού
J16.-	Πνευμονία από άλλους λοιμογόνους μικροοργανισμούς, που δεν ταξινομείται αλλού
J17.-*	Πνευμονία σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
J18.-	Πνευμονία από μη καθορισμένους μικροοργανισμούς
J90	Πλευριτική συλλογή, που δεν ταξινομείται αλλού
J91*	Πλευριτική συλλογή σε νοσήματα που ταξινομούνται αλλού
J96.-	Αναπνευστική ανεπάρκεια, που δεν ταξινομείται αλλού
K72.-	Ηπατική ανεπάρκεια, που δεν ταξινομείται αλλού
N17.9	Οξεία νεφρική ανεπάρκεια, μη καθορισμένη
R18	Ασκίτης
R31	Μη καθορισμένη αιματοουρία
R40.2	Κώμα, μη καθορισμένο
R56.0	Πυρετικοί σπασμοί
R57.-	Καταπληξία [shock], που δεν ταξινομείται αλλού
R64	Καχεξία
R65.-!	Σύνδρομο συστηματικής φλεγμονώδους αντίδρασης [SIRS]

U80.-!	Λοιμογόνοι παράγοντες ορισμένης ανθεκτικότητας στα αντιβιοτικά, που απαιτούν ειδική θεραπευτική αγωγή ή ειδικά υγειονομικά μέτρα πρόληψης
U81!	Βακτήρια πολυανθεκτικά στα αντιβιοτικά
U83!	Κάντιντα [Candida] ανθεκτική στη φλουκοναζόλη ή βορικοναζόλη
Z43.-	Χειρισμοί τεχνητών στομιών
Z93.-	Ύπαρξη τεχνητής στομίας

Κοινοί κωδικοί ΕΤΙΠ στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας

Κωδικός ΕΤΙΠ	Περιγραφή
331.01.xx	Παροδική τραχειοστομία
331.02.xx	Μόνιμη τραχειοστομία
539.00.00	Θεραπεία ασθενών ακινητοποιημένων στη νοσοκομειακή κλίνη: Φυσιοθεραπεία σε ειδική κλίνη
570.01	Απλή ενδοτραχειακή διασωλήνωση
570.04	Διασωλήνωση με σωλήνα διπλού αυλού
570.06	Τοποθέτησης μάσκας για μηχανική υποστήριξη της αναπνοής
583.xx	Θεραπευτικός καθετηριασμός και τοποθέτηση αγγειακών γραμμών
585.03.xx.xx	Αιμοδιήθηση
585.04.xx.xx	Αιμοκάθαρση [αιμοδιύλιση]
585.05.xx.xx	Αιμοδιαδιήθηση [Haemofiltration]
593.00	Καταγραφή της αναπνευστικής, καρδιακής και κυκλοφορικής λειτουργίας χωρίς μέτρηση της πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας και της κεντρικής φλεβικής πίεσης
593.01.xx	Καταγραφή της αναπνευστικής, καρδιακής και κυκλοφορικής λειτουργίας με καταγραφή της κεντρικής φλεβικής πίεσης
593.02	Καταγραφή της αναπνευστικής, καρδιακής και κυκλοφορικής λειτουργίας με καταγραφή της πίεσης της πνευμονικής αρτηρίας
598.00.xx	Ιατρική σύνθετη περίθαλψη σε μονάδα εντατικής θεραπείας (βασική αντιμετώπιση)
598.01.xx.xx	Σύνθετη νευρολογική περίθαλψη του οξέος αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου
598.07.xx.xx	Συνδυαστική θεραπεία σε αποικισμό ή λοίμωξη από πολυανθεκτικά στελέχη μικροβίων
598.13.xx	Ιατρική σύνθετη περίθαλψη σε μονάδα εντατικής θεραπείας παιδών (βασική αντιμετώπιση)

3. Συμβουλές κωδικοποίησης για τα νεοπλάσματα

Οι ασθενείς με νεοπλασίες αποτελούν μια κατηγορίας ασθενών που χρήζουν διαφοροποίησης στον τρόπο κωδικοποίησης προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα γίνει η σωστή αντιστοίχιση με το ανάλογο DRG, ώστε να απεικονιστεί σωστά η κατανάλωση

πόρων εκ μέρους του νοσοκομείου. Για αυτόν τον λόγο, έχουν αναπτυχθεί ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες, επιπλέον των γενικών που απεικονίζονται στον Πίνακα 1.

Η σειρά με την οποία καταχωρίζονται οι κωδικοί εξαρτάται από τη θεραπευτική αντιμετώπιση κατά τη διάρκεια της νοσηλείας. Ο κωδικός του νεοπλασματος καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση σε κάθε νοσηλεία μέχρι να ολοκληρωθεί οριστικά η θεραπευτική αντιμετώπιση. Αν ο ασθενής εισάγεται για την αντιμετώπιση μόνο των μεταστάσεων πρωτοπαθούς νεοπλασματος, αυτές καταχωρίζονται ως κύρια διάγνωση και το πρωτοπαθές νεόπλασμα ως δευτερεύουσα διάγνωση. Σε περίπτωση που αντιμετωπίζονται αμφότερα το πρωτοπαθές νεόπλασμα και οι μεταστάσεις, πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση, αυτή για την οποία καταναλώθηκαν οι περισσότεροι πόροι. Εφόσον, ο ασθενής δεν νοσηλεύεται για άλλο λόγο ως κύρια διάγνωση, το πρωτοπαθές νεόπλασμα και οι μεταστάσεις κωδικοποιούνται ως δευτερεύουσες διαγνώσεις και ισχύουν οι γενικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης ή οι ειδικές, αν υπάρχουν για την κύρια διάγνωση.

Στον Πίνακα 1 υπάρχουν συνοπτικά οι ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης. Στην πρώτη στήλη αναφέρεται η νόσος που αντιμετωπίζεται. Στη δεύτερη στήλη αναφέρεται η συνθήκη, δηλαδή επιπλέον στοιχεία που μας δίνουν πληροφορίες για ειδικές περιπτώσεις νόσου-θεραπείας. Στην τρίτη στήλη παρατίθεται ο κανόνας κωδικοποίησης. Υπενθυμίζεται ότι οι ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης υπερισχύουν των γενικών κατευθυντηρίων οδηγιών κωδικοποίησης και ακολουθούνται κατά προτεραιότητα.

Πίνακας 1. Ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης για τα νεοπλάσματα

Νόσος που αντιμετωπίζεται	Συνθήκη	Κανόνας
Πρωτοπαθές νεόπλασμα	Θεραπεία νεοπλασματος	PD: Νεόπλασμα
Πρωτοπαθές νεόπλασμα	Θεραπεία νεοπλασματος άγνωστης εντόπισης και συστηματική χημειοθεραπεία	PD: C80.-
Μετάσταση	Θεραπεία μετάστασης	PD: Μετάσταση SD: Νεόπλασμα
Χημειοθεραπεία/ακτινοθεραπεία	Συστηματική	PD: Νεόπλασμα (βλ. Πίνακα 2) SD: Μεταστάσεις (αν υπάρχουν)
Χημειοθεραπεία/ακτινοθεραπεία	Περιοχική	PD: Μετάσταση SD: Νεόπλασμα
Σύμπτωμα νεοπλασματος	Θεραπεία συμπτώματος	PD: Σύμπτωμα SD: Νεόπλασμα
Υποτροπή νεοπλασματος	Θεραπεία υποτροπής	PD: Νεόπλασμα
Χειρουργικός καθαρισμός νεοπλασματος	Χειρουργικός καθαρισμός	PD: Νεόπλασμα
Θετική βιοψία	Αρνητικό παθολογοανατομικό παρασκεύασμα	Dx: Νεόπλασμα
Πρωτοπαθές νεόπλασμα	Επέκταση σε γεινιάζον όργανο	Dx: Νεόπλασμα Δεν κωδικοποιείται η επέκταση

Πρωτοπαθές νεόπλασμα	Άγνωστη πρωτοπαθής εστία και επικαλύπτουσα αλλοίωση σε επικαλυπτόμενες ανατομικά περιοχές	PD: Xxx.8 (επικαλύπτουσα αλλοίωση) εφόσον δεν υπάρχει συνδυαστικός κωδικός
Πρωτοπαθές νεόπλασμα	Άγνωστη πρωτοπαθής εστία	Dx: C76.-
Πρωτοπαθές νεόπλασμα	Κακόηθες ανοσοπερπλαστικό ή λευχαιμία	Dx: C88.x0/1, C90.x0/1, C91-C95.x0/1 (ΕΚΟΚ 0208 σελ. 72)
Πρωτοπαθές νεόπλασμα	Λευχαιμία μη ανταποκρινόμενη σε θεραπεία εφόδου	Dx: C91-C95 με επιπρόσθετο κωδικό C95.8! (ΕΚΟΚ 0208 σελ. 72)
Θετικό ιστορικό	Ιαθέν νεόπλασμα	SD: Z85.- (όχι σε όψιμες μεταστάσεις)
Θετικό ιστορικό	Ιαθέν νεόπλασμα και follow-up	PD: Z08.- SD: Z85.-
Πρωτοπαθές νεόπλασμα	Θεραπευτική έγχυση κυτταροτοξικών ουσιών ή BCG στην ουροδόχο κύστη	PD: Νεόπλασμα Z51.1 δεν επιτρέπεται ως διάγνωση Πράξη: 554.01.04 καταχωρείται άπαξ
Μετάσταση	Λεμφαγγειακή καρκινωμάτωση	Dx: Μεταστάσεις
Πρωτοπαθές νεόπλασμα	Λέμφωμα εκτός λεμφαδένων	Dx: C81-C88 Στα λεμφώματα δεν επιτρέπονται οι κωδικοί του Πίνακα 3 ως Dx
Πρωτοπαθές νεόπλασμα	Λέμφωμα με οστικές μεταστάσεις	Dx: C79.5
Πρωτοπαθές νεόπλασμα στους λεμφαδένες, αίμα κλπ	Νεοπλασία λεμφικού/αιμοποιητικού ή συναφούς ιστού με μεταστάσεις στον εγκέφαλο/μήνιγγες	Dx: C79.3

PD: Κύρια διάγνωση, SD: Δευτερεύουσα διάγνωση, Dx: διάγνωση

Στον Πίνακα 2 περιλαμβάνονται οι κωδικοί ΕΤΙΠ για τη συστηματική ακτινοθεραπεία και θεραπεία με αντισώματα και κυτοκίνες και η περιγραφή τους.

Πίνακας 2. Ιατρικές πράξεις σχετικά με τη συστηματική ακτινοθεραπεία και θεραπεία με αντισώματα και κυτοκίνες

Κωδικός ΕΤΙΠ	Περιγραφή
552.03.04	Ολοσωματική ακτινοθεραπεία
553.00.02	Θεραπεία των αιμοποιητικών οργάνων με ραδιοϊσότοπα
553.00.05	Άλλη συστηματική θεραπεία με ραδιοϊσότοπα
553.00.06	Ενδοφλέβια μοριακή στοχευμένη θεραπεία με ραδιοϊσότοπα
553.00.07	Ενδοφλέβια θεραπεία με ραδιενεργά επισημασμένα αντισώματα
553.00.09	Ενδοφλέβια θεραπεία με ραδιενεργά επισημασμένες μεταβολικές ουσίες
553.01	Ακτινοθεραπεία με ιώδιο

554.07.00	Άλλη ανοσοθεραπεία: Με μη τροποποιημένα αντισώματα
554.07.01	Άλλη ανοσοθεραπεία: Με τροποποιημένα αντισώματα
554.07.02	Άλλη ανοσοθεραπεία: Με ανοσοτροποποιητικά φάρμακα

Λεμφώματα που θεωρούνται «εξωλεμφαδενικά» ή που εντοπίζονται σε άλλες θέσεις εκτός των λεμφαδένων (π.χ. λέμφωμα MALT στομάχου) πρέπει να καταχωρίζονται με τους κωδικούς των κατηγοριών C81 ως C88. Ένα λέμφωμα δε θεωρείται μεταστατικό, ανεξάρτητα από τον αριθμό των προσβεβλημένων εντοπίσεων. Στον Πίνακα 3 περιλαμβάνονται οι κωδικοί ICD που δεν επιτρέπεται να κωδικοποιούνται στα λεμφώματα και η περιγραφή τους.

Πίνακας 3. Μη επιτρεπτοί ICD κωδικοί στα λεμφώματα

Κωδικός ICD	Περιγραφή
C77.-	Δευτεροπαθές και μη καθορισμένο νεόπλασμα των λεμφαδένων
C78.-	Δευτεροπαθές κακήθες νεόπλασμα οργάνων του αναπνευστικού και του πεπτικού συστήματος
C79.0	Δευτεροπαθές κακήθες νεόπλασμα του νεφρού και της νεφρικής πυέλου
C79.1	Δευτεροπαθές κακήθες νεόπλασμα της ουροδόχου κύστης και άλλων και μη καθορισμένων οργάνων του ουροποιητικού συστήματος
C79.2	Δευτεροπαθές κακήθες νεόπλασμα του δέρματος
C79.4	Δευτεροπαθές κακήθες νεόπλασμα άλλων και μη καθορισμένων τμημάτων του νευρικού συστήματος
C79.6	Δευτεροπαθές κακήθες νεόπλασμα της ωσθήκης
C79.7	Δευτεροπαθές κακήθες νεόπλασμα του επινεφριδίου
C79.8-	Δευτεροπαθές κακήθες νεόπλασμα άλλων καθορισμένων εντοπίσεων
C79.9	Δευτεροπαθές κακήθες νεόπλασμα μη καθορισμένης εντόπισης

Χημειοθεραπεία με κυτταροστατικά και ανοσοθεραπεία

Στο πλαίσιο αντιμετώπισης ασθενών με νεοπλάσματα, η αντιμετώπισή τους με χορήγηση χημειοθεραπείας παρεντερικά (όχι από το στόμα) αποτελεί μια πολύ συχνή πράξη. Η χημειοθεραπεία πρέπει να κωδικοποιείται σύμφωνα με το πρωτόκολλο διάρκειας και πολυπλοκότητας της ενδοοσοκομειακής παρεντερικής χημειοθεραπείας. Εξατομικευμένες αναγκαστικές καθυστερήσεις δε λαμβάνονται υπόψη. Οι συντομεύσεις λαμβάνονται υπόψη, εφόσον μπορούν να οδηγήσουν σε χαμηλότερη κατάταξη. Κάθε νοσηλεία και κάθε κύκλος πρέπει να κωδικοποιούνται χωριστά. Οι κωδικοί ETIP που αντιστοιχούν στη χορήγηση παρεντερικής χημειοθεραπείας ανήκουν στην ομάδα 554 της ETIP. Κατά την κωδικοποίησή τους είναι **πολύ σημαντική** η ανάγνωση των σημειώσεων κάθε πράξης προκειμένου να επιλεγεί η σωστή, σύμφωνα με τα παραδείγματα, καθώς και ο ορισμός της χρονικής διάρκειας του πρωτοκόλλου, επειδή αυτή καθορίζει τον τερματικό κωδικό. Στον Πίνακα 4 περιλαμβάνονται οι κωδικοί ETIP για την παρεντερική χημειοθεραπεία και η περιγραφή τους.

Πίνακας 4. Κωδικοί ΕΤΙΠ παρεντερικής χημειοθεραπείας με κυτταροστατικά και ανοσοθεραπεία

Κωδικός ΕΤΙΠ	Περιγραφή
554.01.xx	Έγχυση και τοπική θεραπεία με κυτταροστατικά και ανοσοτροποποιητικά φάρμακα
554.02.xx.xx	Απλή χημειοθεραπεία
554.03.xx.xx	Μετρίως σύνθετος και εντατικός κύκλος χημειοθεραπείας
554.04.xx	Ιδιαίτερα σύνθετος και εντατικός κύκλος χημειοθεραπείας
554.06.xx	Υπέρθερμη χημειοθεραπεία

4. Συμβουλές κωδικοποίησης για την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία

Η κωδικοποίηση ασθενών που νοσηλεύονται στο πλαίσιο κύησης, τοκετού ή λοχείας, είτε ως κύρια κατάσταση που απαιτεί νοσηλεία είτε ως δευτερεύουσα, είναι από τις πιο σύνθετες περιπτώσεις προκειμένου να απεικονιστεί ακριβώς ο νοσηλευτικός φόρτος και η κατανάλωση πόρων, ώστε να αποδοθεί το σωστό DRG. Για αυτόν τον λόγο, έχουν καταρτιστεί ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης, που αναπτύσσονται παρακάτω. Περιγράφεται σε χωριστές ενότητες η κωδικοποίηση:

- της διάρκειας κύησης, κύησης ως συνυπάρχουσας κατάστασης και έκβασης τοκετού
- του τοκετού
- της προγραμματισμένης και επείγουσας καισαρικής τομής
- του πρόωρου τερματισμού της κύησης και
- των επιπλοκών.

Διάρκεια κύησης, κύηση ως συνυπάρχουσα κατάσταση και έκβαση τοκετού

Σε κάθε εγκυμονούσα ασθενή που νοσηλεύεται πρέπει να καταχωρίζεται ως δευτερεύουσα διάγνωση η διάρκεια κύησης (κωδικός κατηγορίας 009.-). Μόνη εξαίρεση του κανόνα αποτελεί η νοσηλεία για αντιμετώπιση μιας επιπλοκής προηγηθείσας προκλητής αποβολής.

Όταν εισάγεται μια ασθενής λόγω νοσήματος, το οποίο ούτε επιπλέκει την κύηση, ούτε επιπλέκεται από αυτήν, τότε πρέπει να καταχωρίζεται το νόσημα αυτό ως κύρια διάγνωση, με την Z34 *Επίβλεψη φυσιολογικής κύησης* και τη διάρκεια (ηλικία) κύησης (009.-) ως δευτερεύουσες διαγνώσεις.

Σε κάθε νοσηλεία με τοκετό πρέπει να καταχωρίζεται ως δευτερεύουσα διάγνωση για τη μητέρα η έκβαση του τοκετού (κωδικός κατηγορίας Z37.-!).

Τοκετός

Στον Πίνακα 1 υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις νοσηλείας που καταλήγουν σε τοκετό και ο τρόπος που κωδικοποιούνται.

Πίνακας 1. Ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης για τον τοκετό

Είδος τοκετού	Συνθήκη	Κανόνας
Αυτόματος κολπικός τοκετός μονόδυμης κύησης	Κωδικοποιείται μόνο όταν δεν υπάρχουν ανωμαλίες ή επιπλοκές	PD: O80 Επιτρεπόμενες ιατρικές πράξεις: 591.00, 373.00, 373.08.00, 626.00, 626.01 (βλέπε Πίνακα 2)
Τοκετός σε πολύδυμη κύηση	Σε περίπτωση που τα νεογνά πολύδυμης κύησης γεννιούνται με διαφορετικές μεθόδους, κωδικοποιούνται όλες οι μέθοδοι	PD: O30.- SD: Z37.-! (όχι Z37.1!) Πράξεις: 626.01
Τοκετός πριν από την εισαγωγή της μητέρας	Καμία ιατρική πράξη ή επιπλοκή	PD: Z39.0
	Υπαρξη επιπλοκής	PD: επιπλοκή SD: Z39.0
	Διακομιδή νεογνού και μεταφορά της μητέρας ως συνοδού με περίθαλψη στο νέο νοσοκομείο	Καταχώριση του Z39.0 και από το νέο νοσοκομείο σύμφωνα με τις δύο προηγούμενες περιπτώσεις
	Διακομιδή της μητέρας μετά από καισαρική για περίθαλψη χωρίς άλλες καταστάσεις/επιπλοκές για PD/SD	PD: Z39.0 SD: Z48.8
Διενέργεια τοκετού κατά τη διάρκεια νοσηλείας για άλλο λόγο	Θεραπευτική αντιμετώπιση αρχικού νοσήματος >7 ημέρες πριν τον τοκετό	PD: αρχικό νόσημα SD: τοκετός
	Θεραπευτική αντιμετώπιση αρχικού νοσήματος ≤6 ημέρες πριν τον τοκετό	PD: τοκετός SD: αρχικό νόσημα
Πρόωρος τοκετός (διάρκεια κύησης < 37 εβδομάδες)	Χρησιμοποιούνται οι διαγνώσεις O60.1 Πρόωρες (αυτόματες) ωδίνες με πρόωρο τοκετό ή O60.3 Πρόωρος τοκετός χωρίς αυτόματες ωδίνες	<ul style="list-style-type: none"> Αν η αιτία του πρόωρου τοκετού είναι γνωστή PD: αιτία πρόωρου τοκετού SD: O60.1 ή O60.3 Αν η αιτία του πρόωρου τοκετού δεν είναι γνωστή PD: O60.1 ή O60.3
Πρόωρες ωδίνες που έχουν επίδραση στη διαστολή του τραχήλου, με διάρκεια κύηση < 37 εβδομάδες	Τελειόμηνος τοκετός στην ίδια νοσηλεία	<ul style="list-style-type: none"> Αν η αιτία των πρόωρων ωδινών είναι γνωστή PD: αιτία πρόωρων ωδινών SD: O60.2 Αν η αιτία των πρόωρων ωδινών δεν είναι γνωστή PD: O60.2

	ΟΧΙ τελειόμνηος τοκετός στην ίδια νοσηλεία	<ul style="list-style-type: none"> • Αν η αιτία των πρόωρων ωδινών είναι γνωστή PD: αιτία πρόωρων ωδινών SD: O60.0 • Αν η αιτία των πρόωρων ωδινών δεν είναι γνωστή PD: O60.0
Ψευδής τοκετός (ωδίνες που δεν έχουν επίδραση στη διαστολή του τραχήλου)	Αναλόγως της διάρκειας κύησης χρησιμοποιούνται οι διαγνώσεις O47.0 <i>Ψευδής έναρξη τοκετού πριν τη συμπλήρωση 37 εβδομάδων κύησης</i> ή O47.1 <i>Ψευδής έναρξη τοκετού από την 37η εβδομάδα κύησης και μετά τη συμπλήρωσή της</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Αν η αιτία του ψευδούς τοκετού είναι γνωστή PD: αιτία ψευδούς τοκετού SD: O47.0 ή O47.1 • Αν η αιτία του ψευδούς τοκετού δεν είναι γνωστή PD: O47.0 ή O47.1
Παρατεταμένος τοκετός (>18 ώρες τακτικών ωδινών)	Καταχωρίζεται μία από τις διαγνώσεις O63.- <i>Παρατεταμένος τοκετός</i> O75.5 <i>Παράταση τοκετού μετά από τεχνητή ρήξη των εμβρυϊκών υμένων</i> O75.6 <i>Παράταση τοκετού μετά από αυτόματη ή μη καθορισμένη ρήξη των εμβρυϊκών υμένων</i>	PD: O63.- ή O75.5 ή O75.6
Παράταση της φάσης εξώθησης σε επισκληρίδια αναισθησία	Χρησιμοποιείται η διάγνωση O74.6 <i>Άλλες επιπλοκές της ραχιαίας και επισκληρίδιας αναισθησίας κατά τη διάρκεια των ωδινών και του τοκετού</i>	PD: O74.6
Αύξηση χρονικής διάρκειας και παράταση κύησης	Ο τοκετός επισυμβαίνει μετά τη συμπλήρωση της 41ης εβδομάδας κύησης ή το νεογνό εμφανίζει σαφή στοιχεία παρατασικού νεογνού	PD: O48 Πράξη: 626.01
Καισαρική τομή	Βλέπε ενότητα παρακάτω στην ενότητα Προγραμματισμένη και επείγουσα καισαρική τομή	Καταχωρίζονται ιατρικές πράξεις του Πίνακα 3

PD: Κύρια διάγνωση, SD: Δευτερεύουσα διάγνωση, Dx: διάγνωση

Πίνακας 2. Επιτρεπόμενες ιατρικές πράξεις για την κωδικοποίηση αυτόματου κολπικού τοκετού μονόδυμης κύησης

Κωδικός ΕΤΙΠ	Περιγραφή
591.00	Επισκληρίδια παρακέντηση και έγχυση για αντιμετώπιση πόνου
373.00	Τεχνητή ρήξη υμένων [αμνιοτομή]
373.08.00	Επισιοτομή
626.00	Παρακολούθηση και διενέργεια φυσιολογικού τοκετού
626.01	Παρακολούθηση και διενέργεια τοκετού υψηλού κινδύνου

Ο κωδικός 626.01 μπορεί να καταχωριστεί μόνο εφόσον ο τοκετός υψηλού κινδύνου καταλήγει σε αυτόματο κολπικό τοκετό χωρίς επιπλοκές.

Προγραμματισμένη και επείγουσα καισαρική τομή

Προγραμματισμένη ή πρωτογενής καλείται η καισαρική τομή που διενεργείται πριν ή μετά την έναρξή των ωδίνων, αλλά έχει αποφασιστεί πριν την έναρξή τους. **Επείγουσα** καλείται η καισαρική τομή που κρίνεται απαραίτητη εξαιτίας μιας επείγουσας κατάστασης ή της εξέλιξης του τοκετού, λόγω πιθανότητας επιπλοκών της μητέρας ή του εμβρύου (π.χ. σύνδρομο HELLP, διακοπή συσπάσεων, εμβρυϊκή δυσπραγία), ακόμα και αν αυτή ήταν αρχικά προγραμματισμένη.

Για την κωδικοποίηση πρέπει να καταχωρίζεται ο αντίστοιχος κωδικός της κατηγορίας: 374 Καισαρική τομή και ανάπτυξη του παιδιού.

Πίνακας 3. Κωδικοί ιατρικών πράξεων που αφορούν την καισαρική τομή

Κωδικός ΕΤΙΠ	Περιγραφή
374.00.-	Κλασική καισαρική τομή
374.01.-	Καισαρική τομή υπερτραχηλικά και δια του σώματος της μήτρας
374.02.-	Εξωπεριτοναϊκή καισαρική τομή
374.03.-	Αφαίρεση ενδοπεριτοναϊκού εμβρύου
374.09.-	Άλλη καισαρική τομή

Πρόωρος τερματισμός της κύησης

Για τον πρόωρο τερματισμό της κύησης ισχύουν τρεις περιπτώσεις:

- Όταν η κύηση τερματίζεται ως προκλητή αποβολή (βάρος κυήματος < 500 g χωρίς σημεία ζωής)
- Όταν η κύηση τερματίζεται πρόωρα με γέννηση θνησιγενούς νεογνού (βάρος κυήματος >= 500 g χωρίς ενδείξεις ζωής)
- Όταν η κύηση τερματίζεται πρόωρα με γέννηση ζώντος νεογνού

Η ορθή κωδικοποίηση περιγράφεται στο Πίνακα 4.

Πίνακας 4. Ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης για τον πρόωρο τερματισμό της κύησης

Περιγραφή	Συνθήκη	Κανόνας
Προκλητή αποβολή (βάρους κυήματος < 500 g χωρίς σημεία ζωής)	Πρέπει να καταχωρίζεται κωδικός που περιγράφει την προκλητή αποβολή ως κύρια διάγνωση με έναν κωδικό που αποδίδει την αιτία του τερματισμού	PD: O04.- SD: αιτία τερματισμού π.χ. O35.0 <i>Περίθαλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) διαμαρτίας διάπλασης του κεντρικού νευρικού συστήματος του εμβρύου</i>
Γέννηση θνησιγενούς νεογνού (βάρους κυήματος >= 500 g χωρίς ενδείξεις ζωής)	Πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση η αιτία για τον τερματισμό της κύησης και ως δευτερεύουσες ένας κωδικός για πρόωρο τοκετό και ένας κωδικός με έκβαση για θνησιγενές νεογνό	PD: αιτία τερματισμού π.χ. O35.0 <i>Περίθαλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) διαμαρτίας διάπλασης του κεντρικού νευρικού συστήματος του εμβρύου</i> SD: O60.1 ή O60.3 και Z37.1! ή Z37.3! ή Z37.4! ή Z37.7!
Γέννηση ζώντος νεογνού	Πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση η αιτία για τον τερματισμό της κύησης και ως δευτερεύουσες ένας κωδικός για πρόωρο τοκετό και ένας κωδικός με έκβαση για ζων νεογνό	PD: αιτία τερματισμού π.χ. O35.0 <i>Περίθαλψη της μητέρας λόγω (υποψίας) διαμαρτίας διάπλασης του κεντρικού νευρικού συστήματος του εμβρύου</i> SD: O60.1 ή O60.3 και Z37.0!

PD: Κύρια διάγνωση, SD: Δευτερεύουσα διάγνωση, Dx: διάγνωση

Επιπλοκές

Οι ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης αφορούν την κωδικοποίηση επιπλοκών μετά από:

- αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση
- ανώμαλη προβολή και θέση εμβρύου
- μειωμένες εμβρυικές κινήσεις
- ουλή μήτρας
- λοιπές επιπλοκές κατά την κύηση

Η ορθή κωδικοποίηση περιγράφεται στο Πίνακα 5.

Πίνακας 5. Ειδικές κατευθυντήριες οδηγίες κωδικοποίησης για λοιπές επιπλοκές της κύησης

Επιπλοκή	Συνθήκη	Κανόνας
Επιπλοκές μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση	Κωδικός της κατηγορίας 008.- <i>Επιπλοκές μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση</i> καταχωρείται ως <u>κύρια διάγνωση</u> μόνο αν η ασθενής εισάγεται λόγω απώτερης επιπλοκής μετά από προηγηθείσα αποβολή. Η διάρκεια κύησης σε αυτή την περίπτωση ΔΕΝ κωδικοποιείται.	PD: 008.-
	Όταν κωδικοποιείται επιπλοκή που σχετίζεται με τους κωδικούς 003-007 καταχωρίζεται κωδικός της κατηγορίας 008.- <i>Επιπλοκές μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση</i> ως <u>δευτερεύουσα διάγνωση</u> για πιο συγκεκριμένη κωδικοποίηση. Η διάρκεια κύησης σε αυτή την περίπτωση κωδικοποιείται.	PD: 003.- ή 004.- ή 005.- ή 006.- ή 007.- SD: 008.- και 009.-!
	Όταν κωδικοποιείται επιπλοκή που σχετίζεται με τους κωδικούς 000-002 καταχωρίζεται κωδικός της κατηγορίας 008.- <i>Επιπλοκές μετά από αποβολή, έκτοπη και μύλη κύηση</i> ως <u>δευτερεύουσα διάγνωση</u> . Η διάρκεια κύησης σε αυτή την περίπτωση κωδικοποιείται.	PD: 000.- ή 002.- SD: 008.- και 009.-!
	Όταν εισάγεται μια ασθενής λόγω κατακράτησης τμήματος του πλακούντα μετά από προηγηθείσα ατελή αποβολή, πρέπει να καταχωρίζεται ως κύρια διάγνωση μια ατελής αποβολή με επιπλοκές (003–006) και στον 4ο χαρακτήρα το «0» έως «3». Η διάρκεια κύησης σε αυτή την περίπτωση ΔΕΝ κωδικοποιείται.	PD: 003.0/003.1/003.2/003.3 ή 004.0/004.1/004.2/004.3 ή 005.0/005.1/005.2/005.3 ή 006.0/006.1/006.2/006.3
Ανώμαλη προβολή και θέση εμβρύου	Οι ανώμαλες εμβρυϊκές προβολές και θέσεις κατά τον τοκετό πρέπει να κωδικοποιούνται. Οι ινιακές προβολές όπως η πρόσθια, οπίσθια, πλάγια και διαγώνια ινιακή προβολή πρέπει να καταχωρούνται μόνον εφόσον ακολουθεί ιατρική επέμβαση. Ο κωδικός 080 <i>Φυσιολογικός τοκετός ενός νεογνού ΔΕΝ</i> πρέπει να καταχωρίζεται.	Dx: 032.- ή 064.-
Μειωμένες εμβρυϊκές κινήσεις	Όταν ΔΕΝ είναι γνωστή η υποκείμενη αιτία	Dx: 036.8

	Όταν είναι γνωστή η υποκείμενη αιτία. Σε αυτή την περίπτωση δεν κωδικοποιείται ο Ο36.8 <i>Περίθαλψη της μητέρας λόγω άλλων καθορισμένων επιπλοκών του εμβρύου.</i>	Dx: υποκείμενη αιτία
Ουλή μήτρας	Όταν υπάρχει ουλή μήτρας από προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση κωδικοποιείται όταν: <ul style="list-style-type: none"> • η ασθενής εισάγεται για προγραμματισμένη καισαρική τομή λόγω προηγηθείσας καισαρικής τομής. • η προσπάθεια κοιλιακού τοκετού αποτυγχάνει λόγω ουλής της μήτρας (π.χ. καισαρική τομή ή άλλη χειρουργική τομή) και η ασθενής οδηγείται σε καισαρική τομή. • η υφιστάμενη ουλή μήτρας απαιτεί ιατρική αντιμετώπιση, αλλά ο τοκετός δεν διενεργείται κατά τη διάρκεια αυτής της νοσηλείας, π.χ. ιατρική παρακολούθηση πριν τον τοκετό λόγω άλγους μήτρας εξαιτίας υφιστάμενης ουλής. 	Dx: Ο34.2 <i>Περίθαλψη της μητέρας για ουλή της μήτρας από προηγηθείσα χειρουργική επέμβαση</i> Εκτός αν πρόκειται για τον Ο75.7 <i>Κοιλιακός τοκετός μετά από προηγηθείσα καισαρική τομή</i> Οπότε δεν καταχωρίζεται ο Ο34.2 αλλά ο Ο75.7
Λοιπές επιπλοκές κατά την κύηση	Καταστάσεις που σχετίζονται κυρίως με την κύηση πρέπει να κωδικοποιούνται με ειδικούς κωδικούς της ομάδας Ο20 - Ο29 <i>Άλλα νοσήματα της μητέρας που σχετίζονται κυρίως με την κύηση.</i>	Dx: Ο20 - Ο29 <i>Άλλα νοσήματα της μητέρας που σχετίζονται κυρίως με την κύηση</i>
	Διάχυτες ενοχλήσεις και συμπτώματα κατά την κύηση, για τα οποία δεν ανευρίσκεται συγκεκριμένη αιτία, πρέπει να καταχωρίζονται με τον κωδικό Ο26.88 <i>Άλλες καταστάσεις που συνδέονται με την κύηση.</i>	Dx: Ο26.88
	Για την καταχώριση άλλων επιπλοκών της κύησης (ή καταστάσεων που επιδεινώνονται στην κύηση ή που αποτελούν την κύρια αιτία μαιευτικών χειρισμών) υπάρχουν οι κωδικοί Ο98.- <i>Λοιμώδη και παρασιτικά νοσήματα της μητέρας που ταξινομούνται αλλού αλλά επιπλέκουν την κύηση, τον τοκετό και τη λοχεία και</i> Ο99.- <i>Άλλα νοσήματα της μητέρας που ταξινομούνται αλλού αλλά επιπλέκουν την κύηση, τον</i>	PD: Ο98.- ή Ο99.-

	<p><i>τοκετό και τη λοχεία</i></p> <p>οι οποίοι πρέπει να καταχωρίζονται σε συνδυασμό με κωδικούς δευτερεύουσας διάγνωσης προκειμένου να αποδοθεί η υποκείμενη νόσος (βλέπε παραδείγματα 2 και 3 στην ΕΚΟΚ σελ. 126-7).</p>	
--	---	--

PD: Κύρια διάγνωση, SD: Δευτερεύουσα διάγνωση, Dx: διάγνωση

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

A

AIDS, βλέπε. HIV, 70

C

CPAP, 124

- μάσκες-CPAP, 122

G

Graft-versus-Host- disease (GVHD), 62

H

HIV

- εκδήλωση (εις), 71
- επιπλοκές, 69
- εργαστηριακή ένδειξη, 69
- κωδικοί, 69
- οροθετικός, ασυμπτωματικός, 70
- συμπτώματα, 69

M

MALT λέμφωμα, 83

S

SIRS, 72

W

Weaning, 121

A

αγγειακή νόσος

- διαβητική, 96

αγγειοπάθεια

- διαβητική, 96

αερισμός, μηχανικός, 119

- ασθενείς που διακομίζονται, 123

- διασωλήνωση, 119

- έναρξη της διάρκειας μηχανικού αερισμού, 120

- κατ' οίκον ασθενείς, 119

- καταγραφή της διάρκειας, 119

- λήξη της διάρκειας μηχανικού αερισμού, 121

- ορισμός, 119

- σε νεογνά, 119

- τερματισμός της διαδικασίας αποδέσμευσης (ορισμός), 121

αιμοκάθαρση, 131

αιμορραγία

- από το ορθό, 126

- πεπτικού, 125

αιμορραγία πεπτικού, 125

αιτιολογία

- κωδικοποίηση, 22, 24

Ακοκκιοκυτταραιμία, 72

ακράτεια, 155

ακράτεια κοπράνων, 104, 155

ακράτεια ούρων, 155

ακράτεια ούρων, 104

ακρωτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων (FGM),

(Α.Γ.Γ.Ο), επεμβάσεις αποκατάστασης, 132

άλγος

- οξύ, 155

ανασθεώρηση

-καρδιοχειρουργικής επέμβασης, 116

αναισθησία

- γενική, 57

αναστόμωση

- για αιμοκάθαρση

-- σύγκλιση, 118

ανεπιθύμητη ενέργεια

- από φάρμακα

-- μετά από λήψη σύμφωνα με την ιατρική οδηγία, 173

ανώμαλη

- προβολή και -θέση εμβρύου, 140

ανωμαλίες θέσης (εμβρύου), 140

αορτοστεφανιαία παράκαμψη

- προσωρινός βηματοδότης, 116

απινιδωτής, 117

- αντικατάσταση γεννήτριας, 117

από το ορθό αιμορραγία, 126

αποβολή

- ατελής, 134

- επαπειλούμενη, 4

- επιπλοκές μετά, 133

- ορισμός, 133

- σε πρόωρο τερματισμό της κύησης, 135

αποκατάσταση

- ουλή, 127

απορρύθμιση σακχαρώδη διαβήτη, 88

απώλεια αισθήσεων

- χωρίς τραυματισμό, 164

απώλεια ακοής (αιφνίδια), 109

αρθροσκόπηση, 55

ασυμπτωματική κατάσταση HIV, 70

ατομικό αναμνηστικό νοσήματα, 10

αυτόματος τοκετός

- μονόδυμη κύηση, 136

- πολύδυμα, 137

αφαίρεση υλικών οστεοσύνθεσης, 16

αφυδάτωση

- σε γαστρεντερίτιδα, 126

Β

- βακτηριαμία, 71
 βαρηκοΐα, 109
 βηματοδότης
 - αντικατάσταση γεννήτριας, 117
 - μόνιμος, 117

Γ

- γάγγραινα
 - επαπειλούμενη, 4
 γαστρεντερίτιδα, 126
 γαστρίτιδα
 - με έλκος στομάχου, 125
 γειτνιάζουσες περιοχές
 - άγνωστη πρωτοπαθής εστία, 79
 - ασαφής/μη καθορισμένη εστία, 80
 - γνωστή πρωτοπαθής εντόπιση, 79
 γέννηση ζώντος νεογνού
 - σε πρόωρο τερματισμό της κύησης, 136

Δ

- δευτερεύουσα διάγνωση
 - ατομικό αναμνηστικό, 10
 - ευρήματα, παθολογικά, 12
 - στον σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, 92
 δευτερεύουσες διαγνώσεις
 - σειρά καταχώρησης, 12
 - συμπτώματα, 12
 δευτερογενής
 - εισαγωγή φακού (στον καταρράκτη), 107
 - σακχαρώδης διαβήτης, 99
 δευτεροπαθείς καταστάσεις
 - ειδικοί κωδικοί, 16
 - ορισμός, 14
 δηλητηρίαση
 - από φάρμακα/ναρκωτικά, 171
 διαβητικό πόδι, 96
 διάγνωση
 - αμφοτερόπλευρη, 21
 - δευτερεύουσα-, βλέπε. δευτερεύουσα διάγνωση, 10
 - κύρια-, βλέπε επίσης κύρια διάγνωση, 4
 διαγνωστικές πράξεις
 - κωδικοποίηση, 39
 διαδικασία αποδέσμευσης
 - διάρκεια, 121
 - μάσκες-CRP, 122
 διακομιδή
 - εσωτερική, 7
 διακομιδή επιστροφή εντός 24 ωρών, 66
 διαταραχή
 - ιατρογενής, 36
 διπλή ταξινόμηση, 25
 δυσφαγία, 104
 δωρεά ιστού
 - δότης, 60
 δωρεά οργάνου
 - δότης, 60
 δωρεά οργάνων

- αποτυχία μεταμόσχευσης και απόρριψη
 μοσχεύματος, 62
 - δωρεά από ζώντα δότη, 60
 - λήπτης, 61
 - μετά θάνατον, 61

Ε

- Ε.Τ.Ι.Π.
 - δομή, 41
 - συνδυαστικοί κωδικοί, 44
 εγκεφαλική αποπληξία, βλέπε επίσης εγκεφαλικό επεισόδιο, 103
 εγκεφαλικό επεισόδιο, 103
 - οξύ, 103
 - παλαιό, 103
 έγχυση κυτταροτοξικών ουσιών, 82
 εισαγωγή για χειρουργική επέμβαση, χειρουργική επέμβαση μη διενεργηθείσα, 18
 εκδήλωση
 - HIV, 71
 έκτοπη κύηση
 - επιπλοκές μετά, 133
 εκχύμωση, 159
 έλκος στομάχου
 - με γαστρίτιδα, 125
 έμφραγμα του μυοκαρδίου
 - οξύ, 111
 - παλαιό, 111
 - υποτροπιάζον, 111
 εμφύτευμα μαστού, αφαίρεση, 127
 ενδοθωρακική
 - κάκωση (ανοικτή), 162
 ενδοθωρακική - κάκωση (ανοικτή), 162
 ενδοκρανιακή
 - κάκωση (ανοικτή), 162
 ενδοσκόπηση, 55
 - πολλαπλές ανατομικές περιοχές, 56
 εξαιρέσεις
 - ICD-10-GrM, 32
 - Ε.Τ.Ι.Π., 47
 εξάρθημα, 159
 εξέταση, κλινική
 - υπό γενική αναισθησία, 56
 επανεισαγωγή, 8
 επανεκτίμηση
 - σε κακήθες νεόπλασμα, 82
 επανεπέμβαση, 57
 - μετά από καρδιοχειρουργική επέμβαση, 116
 - προγραμματισμένη, 16
 επάνοδος
 - από άλλο νοσοκομείο, 9
 επαπειλούμενο
 - νόσημα, 3
 επιπλοκές
 - ανοικτά τραύματα, 163
 - αντιμετώπιση, 46
 - από χειρουργικές επεμβάσεις, 37
 - ιατρογενείς, 36
 - κατά την κύηση, 138
 - μετά από αποβολή, έκτοπη κύηση και μύλη κύηση, 133
 - μετά από θυρεοειδεκτομή, 37
 - σε ασθενή που φέρει βηματοδότη, 37

- στο σακχαρώδη διαβήτη
 - κύρια διάγνωση, 88
 - του σακχαρώδη διαβήτη
 - δευτερεύουσα διάγνωση, 92
- επιτολής τραυματισμός, 159
 επισκληρίδια αναισθησία
 - στη φάση εξώθησης, 144
 εφελκίδα, 159

Θ

- θερμικά/χημικά εγκαύματα
 - επιφάνεια σώματος, 171
 - σειρά καταχώρησης των κωδικών, 170
 Θλάση
 - οστού-, 161
 θνησιγενές νεογνό
 - ορισμός, 133
 - σε πρόωρο τερματισμό της κύησης, 135

Ι

- ιατρική πράξη
 - αμφοτερόπλευρη, 50
 - αντιμετώπιση διεγχειρητικών επιπλοκών, 46
 - διακομιδή επιστροφή εντός 24 ωρών, 66
 - διακοπή, 49
 - καθιερωμένη διαδικασία, 60
 - με/χωρίς συσκευή καρδιοπνευμονικής παράκαμψης, 115
 - μη ολοκληρωμένη, 49
 - πολλαπλώς διενεργηθείσα, 50
 - που δε χρήζει κωδικοποίησης, 58
 - σειρά, 39
 - στάδια
 - κωδικοποίηση, 39
 ιατρική πράξη/επέμβαση
 - κωδικοποίηση γενικά, 39
 ιοκυστική νόσος, 99
 ισχαιμική καρδιοπάθεια, 111
 - χειρουργική αντιμετώπιση, 112

Κ

- καθιερωμένη διαδικασία
 - κωδικοποίηση, 60
 καισαρική τομή, 144
 κακοήθεια
 - θεραπεία πόνου, 157
 κακόηθες νεόπλασμα
 - ατομικό ιστορικό, 81
 - γειτνιάζουσες περιοχές, 79
 - έγχυση κυτταροτοξικών ουσιών, 82
 - επανεκτίμηση, 82
 - μεταστάσεις, 76
 - συμπληρωματικές θεραπείες, 75
 - συμπτώματα, 78
 - τακτική εξέταση παρακολούθησης [follow-up]
 - σειρά καταχώρησης των κωδικών, 82
 - υποτροπή, 78
 - σταδιοποίηση, staging, 75
 Κακομεταχείριση, 171
 Κακοποίηση, 171

- κάκωση
 - ανοικτή
 - θώρακας, 162
 - κεφαλή, 162
 - κοιλία, 162
 κάκωση
 - νωτιαίου μυελού
 - οξεία φάση, 165
 Κάκωση μαλακών μοριών
 - σε κάταγμα, 159
 καρδιά
 - επέμβαση
 - επανεπέμβαση, 116
 - με/χωρίς συσκευή καρδιοπνευμονικής παράκαμψης, 115
 καρδιακή
 - καρδιοαναπνευστική ανακοπή, 113
 καρδιοπάθεια
 - ισχαιμική, 111
 - υπερτασική, 114
 καρδιοπνευμονική παράκαμψη
 - με/χωρίς συσκευή καρδιοπνευμονικής παράκαμψης, 115
 κάταγμα, 159
 - ανοικτό, 162
 - εξάρθρημα-, 160
 - σε συνδυασμό με εξάρθρημα, 160
 κάταγμα με εξάρθρημα, 160
 κάταγμα σπονδύλου- και εξάρθρημα, 167
 καταρράκτης
 - δευτερογενής εισαγωγή φακού, 107
 - σε διαβήτη, 95
 κατάχρηση ουσιών (ψυχοτρόπων)
 - κωδικοποίηση, 102
 κλινική εκδήλωση
 - έως σύνδρομο, 13
 κύηση
 - αύξηση χρονικής διάρκειας, 143
 - διάχυτες ενοχλήσεις, 139
 - επιπλοκές, 138
 - κωδικοποίηση της διάρκειας, 137
 - τερματισμός, πρόωρος, 135
 - ως συνυπάρχουσα κατάσταση, 140
 κύρια διάγνωση, 4
 - παραπάνω διαγνώσεις πιθανές, 7
 - σε εισαγωγή για αιμοκάθαρση, 131
 - σε περίπτωση τοκετού, 140
 - σε σακχαρώδη διαβήτη με επιπλοκές, 88
 - σύμπτωμα, 6
 - σύνδρομο, 13
 - υγιή νεογνά, 147
 - ύποπτες καταστάσεις, 7
 κυστική ίνωση, 99
 κωδικοποίηση
 - γενική, 3
 - δευτεροπαθείς καταστάσεις και επεμβάσεις αντιμετώπισής τους, 14
 - διαγνωστικές πράξεις, 39
 - διπλή κωδικοποίηση, 21
 - καθιερωμένη διαδικασία, 60
 - με υποκατηγορία, 19
 - με υποκατηγορίες, 20
 - με υπόλοιτες κατηγορίες, 35
 - πολλαπλή, 25

- πολλαπλή κωδικοποίηση
 - ICD-10GrM, 22
 - Ε.Τ.Ι.Π., 45
 - στάδια ιατρικής πράξης, 39
 - σύμπτωμα, 5
 - σύνδρομο, 13
 - συνδυαστικοί κωδικοί, 20
 - τμήμα της ιατρικής πράξης, 49
- κώφωση, 109

Λ

- λαπαροσκόπηση, 55
- λειτουργικές διαταραχές κύστης
 - νευρογενείς
 - σε κάκωση νωτιαίου μυελού, 167
- λεμφαγγειακή καρκινωμάτωση, 83
- λέμφωμα, 83
- λήψη οργάνων
 - προς μεταμόσχευση, 60

Μ

- μαστεκτομή (υποδόρια), προληπτική, 127
- μειωμένες εμβρυϊκές κινήσεις, 141
- μέλαινα, 126
- μέρος της ιατρικής πράξης, κωδικοποίηση, 49
- μεταβολικό σύνδρομο, 99
- μεταμόσχευση, 60
 - αιμοποιητικά βλαστοκύτταρα, 62
 - νόσος μοσχεύματος έναντι ξενιστή (GVHD), 62
- μεταστάσεις
 - σειρά καταχώρησης των κωδικών, 76
- μονόδυμη κύηση, αυτόματος κολπικός τοκετός, 136
- μόσχευμα
 - ανεπάρκεια και απόρριψη
 - κερατοειδής, 107
 - αποτυχία και απόρριψη, 62
- μύλη κύηση
 - επιπλοκές μετά, 133

Ν

- νάρκωση
 - κλινική εξέταση υπό γενική αναισθησία, 56
- νεογνά
 - νοσούντα, 147
 - παροδική ταχύπνοια, 150
 - σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας, 150
 - σύνδρομο εισρόφησης, 150
 - υγιή, 147
- νεογνική περίοδος
 - ορισμός, 147
- νευρογενής κύστη, 167
- νευροπάθεια
 - διαβητική, 95
- νεφροπάθεια
 - διαβητική, 93
 - υπερτασική, 114
- νόσημα
 - αμφοτερόπλευρο, 21
 - επαπειλούμενο, 3
 - ιατρογενές, 36

- οξύ και χρόνιο, 17
- νόσημα - επικείμενο, 3
- νοσήματα
 - ατομικό αναμνηστικό, 10
- νόσος
 - υποκείμενη, 5
- νόσος υαλοειδούς μεμβράνης, 150
- νωτιαίος μυελός
 - κάκωση
 - νευρογενής κύστη, 167
 - οξεία φάση, 165
 - τραυματισμός
 - κάταγμα και εξάρθρωμα σπονδύλου, 167
 - χρόνια φάση, 166
 - τραυματισμός του νωτιαίου μυελού, 164

Ο

- οίδημα ωχράς κηλίδας, 95
- οξυτενή κονδυλώματα
 - πρωκτογεννητικά, 131
- ορισμός
 - αποβολή, 133
 - δευτερεύουσες διαγνώσεις, 10
 - δηλητηρίαση, 171
 - θνησιγενές νεογνό, 133
 - κύρια διάγνωση, 4
 - νεογνική περίοδος, νεογνό, 147
 - περιγεννητική περίοδο, 147
 - περιγεννητική περίοδος, 147, 149
 - προγραμματισμένη/επείγουσα καισαρική τομή, 144
- Ορισμός
 - γέννηση ζώντος νεογνού, ζωντανό νεογνό, 133
- όροι (κοινά αποδεκτοί)
 - συστηματικός κατάλογος νοσημάτων ICD-10-GrM, 31
- οστική θλάση, 161
- οστική συμμετοχή σε λέμφωμα, 83
- ουδετεροπενία, 72
- ουλή
 - αποκατάσταση, 127
- ουλή μήτρας, 141
- ουροσήψη, 71
- οφθαλμικά νοσήματα
 - διαβητικά, 94
- όψιμα αποτελέσματα βλέπε επίσης δευτεροπαθείς καταστάσεις, 14

Π

- πάγκρεας
 - διαταραχή ενδοκρινής έκκριση, 99
- παράταση (κύησης), 143
- παρατεταμένος τοκετός, 144
- παρεντερική θεραπεία
 - σε νεογνά, 150
- παροδική ταχύπνοια του νεογνού, 150
- περιγεννητική περίοδος
 - ορισμός, 149
- περιλαμβάνονται
 - Ε.Τ.Ι.Π., 46
- Περιλαμβάνονται
 - ICD-10-GrM, 31

πλαστική χειρουργική, 127
 πνευμονικό οίδημα, οξύ, 113
 πολλαπλό τραύμα, 168
 πολυτραύμα, 168
 πόνος
 - θεραπεία πόνου, 155
 - χρόνιος, 156
 προβολή εμβρύου
 - ανώμαλη, 140
 πρόωρα νεογνά
 - άρωστα, 147
 πρόωρες
 - ωδίνες, 142
 πρόωρη γέννα, 142
 πρόωρος
 - τοκετός, 142
 πρωκτογεννητικά οξυτενή κονδυλώματα, 131
 πυρετικοί σπασμοί, 155

Σ

σακχαρώδης διαβήτης
 - απορρυθμισμένος, 88
 - δευτεροπαθής, 99
 - διαβητικό πόδι, 96
 - με επιπλοκές
 -- αγγειακές, 96
 -- αγγειοπάθεια, 96
 -- δευτερεύουσα διάγνωση, 92
 -- νευροπάθεια, 95
 -- νεφρική, 93
 -- νεφροπάθεια, 93
 -- οξεία μεταβολική, 93
 -- οφθαλμός, 94
 -- σμφιβληστροειδοπάθεια, 95
 - με καταρράκτη, 95
 - μετά από ιατρική επέμβαση, 88
 - που σχετίζεται με υποσιτισμό, 88
 - τύποι, 87
 - με επιπλοκές
 -- κύρια διάγνωση, 88
 σηψαιμία, 71
 σκληροειδίτις, 125
 σμφιβληστροειδοπάθεια
 - διαβητική
 -- με οίδημα ωχράς κηλίδας, 95
 σταδιοποίηση, staging, 75
 σταυρός - αστερίσκος - σύστημα, 22
 στηθάγχη, 111
 στοιχεία κακοήθους όγκου
 - μόνο από τη βιοψία, 79
 σύμπτωμα
 - ως κύρια διάγνωση, 6
 συμπτώματα
 - ως δευτερεύουσες διαγνώσεις, 12
 συμφύσεις, ενδοκοιλιακές, 125
 σύνδρομο, 13
 - διαβητικό πόδι, 96
 - μεταβολικό, 99
 σύνδρομο
 - συγγενές, 14
 σύνδρομο Münchhausen, 171
 σύνδρομο αναπνευστικής δυσχέρειας νεογνού, 150
 σύνδρομο εισρόφησης στο νεογνό, 150

συνδυαστικοί κωδικοί
 - ICD-10-GM, 20
 - Ε.Τ.Ι.Π., 44
 συνολική διάρκεια μηχανικού αερισμού, 120

Τ

τερματισμός
 - της κύησης, 135
 τετραπληγία/παραπληγία
 - μη τραυματική, 104
 - τραυματική, 164
 τοκετός
 - έκβαση, 137
 - κύρια, 140
 - μονόδυμη κύηση, 136
 - παρατεταμένος, 144
 - πολύδυμα, 137
 - πριν την εισαγωγή, 141
 - πρόωρος, 142
 τοκετός ζώντος νεογνού
 - ορισμός, 133
 τοξίκωση οξεία [οξεία μέθη]
 - κωδικοποίηση, 101
 τραύμα
 - πολλαπλό-, 168
 - πολυτραύμα, 168
 τραύμα (ανοικτό), 161
 τραυματισμός
 - ανοικτά τραύματα, 161
 - επιτολής, 159
 - του νωτιαίου μυελού, 164
 -- χρόνια φάση, 166
 Τραυματισμός
 - με απώλεια των αισθήσεων, 163
 τραυματισμός – του νωτιαίου μυελού
 -- οξεία φάση, 164

Υ

υπερτασική
 - καρδιοπάθεια, 114
 - νεφροπάθεια, 114
 υποδόρια μαστεκτομή, προληπτική, 127
 υποκατηγορία
 - μη καθορισμένο, 19
 υποκατηγορία, 19
 - άλλο, 19
 υπόλοιπες κατηγορίες
 - ΜΚΑ, 34
 - ΜΤΑ, 35
 ύποπτο νόσημα
 - κύρια διάγνωση ως ύποπτο νόσημα, 7
 υποτροπή
 - κακήθες νεόπλασμα, 78

Φ

φάρμακα
 - ανεπιθύμητη ενέργεια, 173
 - δηλητηρίαση, 171

Χ

χειρουργικές επεμβάσεις
- πρόσθετες πληροφορίες, 46
χειρουργική επέμβαση
- μη διενεργηθείσα, 18
χειρουργικός καθαρισμός
- περιοχή όγκου, 79
ΧΜΛ, 11
χορήγηση οξυγόνου
- σε νεογνά, 150
χρόνια μυελογενής λευχαιμία, 11

Ψ

ψευδής έναρξη τοκετού, 142

Ω

ωδίνες
- πρόωρες, 142

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΩΔΙΚΩΝ

Ευρετήριο Κωδικών ICD-10-GrM

Κωδικός ICD-10	ΕΚΟΚ	Σελίδα	Κωδικός ICD-10	ΕΚΟΚ	Σελίδα
A02.1	0103	72	C44.3	P005	52
A08.0	1602	149	C44.6	P005	52
A17.0+	D012	23	C50.4	0201	75
A18.0+	D012	23	C52	0206	80
	D013	35	C53.-	0206	80
A22.8†	D013	33	C53.8	0206	79
A27.-†	D013	33	C57.8	0206	80
A30.-	D013	33	C61	0201	77
A32.1†	D013	33	C71.1	0201	75
A32.7	0103	72	C76.-	0206	80
A39.2	0103	72	C77.-	0215	83
A39.3	0103	72	C78.-	0215	83
A39.4	0103	72	C78.2	0214	83
A40.-	0103	72	C78.7	0201	76, 77
A41.-	0103	72	C79.0	0215	83
A46	0401	98	C79.1	0215	83
	D013	32, 33	C79.2	0215	83
A49.-	0103	71	C79.3	0215	83
A50.4	D013	33	C79.4	0215	83
A54.4+	D012	22	C79.5	0215	83
A54.8	D012	24		1806	157
A54.8†	D013	33	C79.6	0215	83
A54.9	0103	71	C79.7	0215	83
A63.0	1403	132	C79.8-	0215	83
A70	D013	35	C79.9	0215	83
B05.2	D013	35	C80.-	0201	76, 77
B20	0101	70, 71	C81.4	0201	75
B20-B24	0101	69	C81-C88	0215	83
B21	0101	70	C88.-	0208	80
B22	0101	70	C90.-	0208	80
B23.0	0101	69, 70	C91-C95	0208	80, 81
B23.8	0101	70	C92.0-	D006	17
B24	0101	70	C92.1-	D006	18
B37.0	0101	71, 72	C95.8!	0208	81
B37.7	0103	72		D012	29
B59	D013	35	C97!	D012	29
B90.-	D005	16		P005	52
B91	D005	15, 16	D50.9	1510	139
B92	D005	16	D59.2	1917	173
B94.-	D005	16	D70.-	0103	72
B94.0	D005	15	E00-E07+	D012	24
B95!-B98!	D012	25	E05.0	D012	24
B95.-!	D012	28	E10.-	0401	87
B95.6!	1905	163	E10.20+	0401	94
B96.-!	D012	29	E10.30+	0401	91
B97.-!	D012	29		D012	26
B98.-!	D012	29	E10.50+	0401	91
C16.0	0206	79		D012	26
C16.2	0201	78	E10.61	0401	89
C18.4	0201	76, 77, 78	E10.61+	0401	89
C34.1	1806	157	E10.73+	0401	90
C41.4	1806	156	E10.73†	D012	27
C44.2	P005	52	E10.75+	0401	98

E10.91	0401	88	G99.0*	0401	97
E10+-E14+	0401	93, 94, 95, 96	H02.8	D009	20
E10-E14	0401	87, 89, 90,	H02.9	D009	20
	----	91,93	H16.-	0704	107
	---- 1916	172	H18.-	0704	107
E11.-	0401	87	H20.-	0704	107
E11.20	0401	92	H25.-	0401	95
E11.72+	0401	93	H26.-	0401	95
E12.-	0401	87	H26.9	D009	20
E13.-	0401	87, 88	H27.0	0702	107
E14.-	0401	87	H28.0*	0401	95
E15-E16+	D012	24	H35.8	0401	95
E16.0	0401	99	H36.0*	0401	90, 91, 93, 95
E16.1	0401	99		D012	26, 27
E16.2	0401	99	H44.0	0704	107
E16.8	0401	99	H44.1	0704	107
E16.9	0401	99	H54.-	0401	95
E20-E34+	D012	24	H54.4	D005	15
E64.-	D005	16	H57.9	D009	20
E68	D005	16	H59.-	D015	36
E70-E89+	D012	24	H65.3	D007	18
E84.-	0403	99, 100	H75.0*	D012	23
E84.0	0403	99	H90.-	0801	109
E84.1	0403	100	H91.-	0801	109
E84.8-	0403	99	H95.-	D015	36
E84.80	0403	99, 100	I05.-	D013	34
E84.87	0403	99	I05.0	D013	34
E84.88	0403	99	I05.1	D013	34
E86	1107	126	I10.00	0401	92
E89.-	D015	36	I11.-	0904	114
E89.0	D015	37	I12.-	0905	114
E89.1	0401	88		0906	115
F00-F09	D012	25		D013	32
F10.0	0501	101	I13.-	0906	115
F10.1	0501	102	I20.-	0901	111
F10.2	0501	101	I20.0	0901	111, 113
F10-F19	0501	101		D001	4
G01*	D012	23	I21.-	0901	111
	D013	33	I22.-	0901	111
G04.9	0603	104	I25.11	0901	112
G09	D005	16	I25.12	0901	112
G59.0*	0401	95	I25.13	0901	112
G63.2*	0401	93, 96, 97, 98	I25.14	0901	112
G63.3*	D012	24	I25.15	0901	112, 113
G73.0*	0401	96	I25.16	0901	112
G81.0	0601	103	I25.2-	0901	111
G81.1	D005	15	I25.8	0901	112
G82.-	0603	104, 105	I46.-	0903	113
	1910	166	I50.-	0904	114
G82.03	1910	167		0906	115
G82.6-!	0603	104, 105	I50.1-	D012	24
	1910	166	I50.14	0902	113
	D012	29	I51.-	0904	114
G82.66!	1910	167	I60-I64	0601	103
G83.2	D005	15	I62.0	D013	32
G83.41	1910	167	I63.3	0601	103
G90.-	D013	35	I67.80!	D012	29
G90.0-	D013	35	I69.-:	0601	103
G90.00	D013	35		D005	16
G90.08	D013	36	I69.4	D005	15
G90.1	D013	36	I70.20	0401	97
G95.8-	1910	167		D010	21
G95.81	1910	167	I70.21	0401	97
G97.-	D015	36	I70.22	0401	91, 92, 97

	D012	26	L50.5	D009	19
170.23	0401	97, 98	L50.6	D009	19
	D001	4	L50.8	D009	19
170.24	0401	97	L50.9	D009	19
	D010	21	L57.0	P005	52
179.2*	0401	90, 91, 96, 98	L89.-	0401	97
	D012	26, 27	L89.0-	0401	97
180.28	D015	37	L89.1-	0401	97
188.-	D013	32	L89.2-	0401	97
188.0	D006	18	L89.3-	0401	97
197.-	D015	36	L89.9-	0401	97
J01.1	D007	18	L90.5	1205	127
J10-J15	D013	35	L97	0401	97
J16.-	D013	35	M01.1-*	D012	23
J16.0	D013	35	M01.15*	D012	23
J16.8	D013	35	M01.16*	D012	23
J17.0*	D012	24	M20.1	0401	97
J18.-	D013	35	M20.2	0401	97
J18.9	D013	35	M20.3	0401	97
J20.1	0403	99	M20.4	0401	97
J35.0	D007	18	M20.5	0401	97
J44.1-	D006	17	M21.27	0401	97
J45.0	1510	140	M21.37	0401	98
J81	0902	113	M21.4	0401	98
J91*	D012	24	M21.57	0401	98
J95.-	D015	36	M21.67	0401	98
K20	0501	102	M49.0-*	D012	23
K21.0	1105	126	M54.5	1806	156
K22.8	1105	126	M68.0-*	D012	23
K25.-	1103	125	M73.0-*	D012	22
K25.0	1105	125	M73.09*	D012	22
K29.-	1103	125	M84.03	D005	15
K29.0	1917	173	M90.0-*	D012	23
K31.-	D013	31	M96.-	D015	36
K31.0	D013	31	N04.1	D004	14
K31.1	D013	31, 32	N08.3*	0401	89, 90, 94
K35.-	1101	125		D012	27
K36	1101	125	N18.-	0905	114
	D013	33		0906	115
K37	1101	125	N18.5	0401	94
K40.20	D011	21	N39.0	1910	167
K57.0-K57.1	D013	31	N39.3	1804	155
K62.5	1105	126	N39.4-	1804	155
K62.8	1403	131	N39.47!	D012	29
K66.0	1102	125	N48.8	1403	131
K67.1*	D012	24	N88.8	1403	131
K72.7-!	D012	29	N89.8	1403	131
K85.00	D006	17	N90.8	1403	131
K86.1	D006	17		1406	132
K91.-	D015	36	N99.-	D015	36
K92.-	1105	126	O00.1	1504	134
K92.0	1916	172	O00-O02	1504	134
K92.0-K92.2	D013	31	O03.3	1504	135
K92.2	1105	126	O03-O06	1504	134
L02.4	0401	97	O03-O07	1504	135
L03.02	0401	97	O04.-	1505	135
L03.10	1905	163	O08.-	1504	133, 134, 135
L03.11	0401	97	O08.1	1504	134
L50.-	D009	19	O08.3	1504	134, 135
L50.0	D009	19	O09.-!	1505	135, 136
L50.1	D009	19		1508	137
L50.2	D009	19		1519	142, 143
L50.3	D009	19		D012	29
L50.4	D009	19	O09.1!	1504	134, 135

	D012	28		1606	151
O09.4!	1510	139, 140	P91.3	1606	151
O09.5!	1509	138	P91.4	1606	151
O09.6!	1520	144	P91.5	1606	151
O09.6!	1506	137	P91.6	1606	151
O09.7!	1520	143	Q02	D004	14
O20.0	D001	4	Q21.0	D004	13
O20-O29	1510	138	Q40.0	D013	31
O24.0 έως O24.3	0401	87	Q40.1	D004	14
O24.4	0401	87	Q87.-	D004	14
O26.-	1510	139	Q87.8	D004	14
O26.82	1510	139	Q90.0	D004	13
O26.88	1510	139	R00-R99	D002	6
O30.0	1509	137, 138	R02	D010	21
O32.1	1512	141	R13.-	0601	104
O32.5	1509	138	R15	1804	155
O34.2	1515	141	R32	1804	155
O35.0	1505	135, 136	R40.0	1909	164
O36.8	1514	141	R40.1	1909	164
O47.-	1519	143	R40.2	1909	164
O47.0	1519	143		1916	172
O47.1	1519	143	R47.0	0601	103
O48	1520	143,144	R52.-	1806	157
O60.0	1519	142	R52.0	1806	155
O60.1	1505	136	R52.1	1806	157
	1509	138	R52.2	1806	157
	1519	142	R56.0	1805	155
O60.2	1519	142	R59.-	D013	32
O60.3	1505	136	R59.1	0101	70
	1519	142	R65.-!	0103	73
O63.-	1521	144		D012	29
O64.1	1512	141	R65.0!	0103	72
O64.8	1509	138	R65.1!	0103	73
O71.6	D013	34	R65.2!	0103	73
O74.6	1524	144	R65.3!	0103	73
O75.5	1521	144	R65.9!	0103	73
O75.6	1521	144	R73.0	0401	87
O80	1506	136, 137	R75	0101	69, 70
	1512	141	S00.85	1911	169
O94	D005	16	S00-S99	1911	168
O94-O99	1510	138	S01.41	1911	169
O98.-	1510	139	S01.83!	1905	162
O98.7	0101	69, 71		D012	29
O99.-	1510	139	S01.87!-S01.89!	1905	163
O99.0	1510	139	S02.1	1909	164
O99.5	1510	140	S06.31	1911	169
P01.1	1602	149	S06.5	1909	164
P07.12	1601	148	S06.7-!	1909	164
P20.-	1606	151		D012	29
P21.0	1606	151	S06.70!	1911	169
P21.1	1601	148	S06.71!	1909	164
P22.0	1601	148	S08.1	1911	169
	1604	150	S09.7	1911	169
P22.1	1605	150	S10.0	1911	169
P23.-	D013	35	S14.7!	1910	164
P24.-	1605	150		D012	29
P25.1	1601	148	S21.83!	1905	162
P28.0	1602	149		D012	29
P36.-	0103	72	S21.87!-S21.89!	1905	163
P59.9	1601	148	S21.88!	1910	168
P70.0	0401	87	S22.01	1910	168
P70.1	0401	87	S22.02	1910	168
P70.2	0401	87	S22.06	1910	165
P90	1601	147	S23.11	1910	168

S23.12	1910	168	T82.1	0911	117
S23.14	1910	165, 166		D015	37
S24.11	1910	168	T82.7	0911	117
S24.12	1910	166	T82.8	0911	117
S24.12	1910	165	T85.4	1205	127
S24.7!	1910	164	T85.78	1205	127
	D012	29	T85.82	1205	127
S24.72!	1910	168	T85.88	1205	127
S24.75!	1910	165	T86.-:	P015	62
S31.83!	1905	162	T86.83	0704	107
	D012	28, 29, 30	T89.0-	1905	163
S31.87!-S31.89!	1905	163	T90-T98	D005	16
S34.7!	1910	164	T92.1	D005	15
	D012	29	U60.-!	D012	30
S34.72!	1910	165	U61.-!	D012	30
S36.03	1905	162	U69.00!	D012	30
	D012	30	U69.10!	D012	30
S36.49	1905	162	U80.-!	D012	30
	D012	30, 31	U81!	D012	30
S37.03	1905	162	U82.-!	D012	30
	D012	30	U83!	D012	30
S40.0	1911	169	U84!	D012	30
S41.87!	1903	160, 161	U85!	D012	30
S42.11	1902	159	U99.-!	D012	28
S42.21	0401	92	X49.9!	1916	172
	1903	161	X84.9!	1916	171
S42.41	1902	159	Y57.9!	1917	173
S43.01	1903	160, 161	Z00.5	P015	60, 61
S52.21	1903	160	Z03.-	D002	7
S52.31	D005	17	Z03.0 έως Z03.9	D002	7
S52.51	D011	22	Z03.6	D002	7
S61.0	1905	163	Z08.-	0209	82
S62.32	1510	140	Z08.1	0209	82
	D012	28	Z21	0101	69, 70
S71.1	1911	169		1917	173
S71.88!	1903	160	Z33!	D012	28
S72.3	1903	160	Z34	1510	140
Sx1.84!	D012	29		D012	28
Sx1.84!-Sx1.89!	1903	159, 161	Z37.-!	1507	137
Sx1.85!	D012	29		D012	30
Sx1.86!	D012	29	Z37.0!	1505	136
Sx1.87!	D012	29		1506	137
Sx1.88!	D012	29		1520	143, 144
Sx1.89!	D012	29	Z37.1!	1505	136
T00-T07	1911	168	Z37.2!	1509	137, 138
T01.8	1911	169	Z38.-:	1601	147, 148
T07	1911	168	Z38.0	1601	147, 148
T21.23	1914	170		1602	149
T21.25	1914	170	Z38.1	1601	147
T25.3	1914	170	Z39.-	1518	141
T29.-	1914	170	Z42.-	1205	127
T31.-!	1914	171	Z42.1	1205	127
	D012	29	Z45.0-	0911	117
T32.-!	1914	171	Z47.0	D005	17
	D012	29	Z48.8	0912	118
T36-T50	1916	171, 172		1518	142
T38.3	1916	172	Z49.1	1401	131
T39.0	1916	172	Z50.-!	D012	28
T39.1	1916	172	Z51.1	0212	82
T40.2	1916	172	Z52.-	P015	60, 61, 62
T45.5	1916	172	Z52.01	P015	61, 63
T51-T65	1916	171, 172	Z52.1	P015	63
T74.-	1915	171	Z52.2	P015	63
T80-T88	D015	37	Z52.3	P015	63

Z52.4	P015	61, 64	Z89.6	0401	98
Z52.6	P015	64	Z89.7	0401	98
Z52.8	P015	64	Z95.0	0911	117
Z53	D007	18	Z95.1	0901	112, 113
Z54.-!	D012	28	Z95.5	0901	112, 113
Z85.-	0209	81, 82	Z96.1	0704	107
Z85.5	0209	82	Z99.2	1401	131
Z89.5	0401	98			

Ευρετήριο Κωδικών ΕΤΙΠ

Κωδικός ΕΤΙΠ	ΕΚΟΚ	Σελίδα	Κωδικός ΕΤΙΠ	ΕΚΟΚ	Σελίδα
110.00	P008	56	344.08.00.00	P003	42
126.06.00	0911	117	344.08.00.01	P003	43
146.03.00	D004	14	344.08.00.02	P003	43
162.00.00.00	P007	56	344.08.00.03	P003	43
163.06.00	P007	56	344.08.00.98	P003	43
166.01	0209	82	344.08.01	P003	42, 43
171	P014	59		P006	55
184.04	P005	53	344.08.01.00	P003	43
185.03.02	P005	53	344.08.02	P003	42
220.00	1909	164		P006	55
220.03	1910	166	344.08.03	P003	42
222.05	P001	41		P006	55
282.00	P009	57	344.08.04	P003	42
302.03.00.00	P006	55	344.08.05	P003	42
303.09.03.04	1806	156	344.08.06	P003	42
303.09.14.00	1806	156	344.08.10	P003	42
305.06.04.00	P004	49	344.08.11	P003	42
305.09.11	P006	55	344.08.12	P003	42
306.02.08	P013	58	344.08.13	P003	42
306.03.02	P003	44	344.08.14	P003	42
311.02	P015	64	344.08.98	P003	42, 43
311.03.00	P015	64	344.08.98.00	P003	43
312.05	P015	65	344.08.99	P003	42, 43
318.01.00	P005	52	345.05.06.04	P001	41
321.02.00	P005	52	346.07.06.01	P015	65
328.09.01	P013	57	346.07.09.01	P015	65
331.01	1001	119, 123	346.07.09.02	P015	65
331.02	1001	119, 123	346.09.01	1102	125
333.05.02	P015	65	346.09.02	1102	125
333.05.03	P015	65	350.03.03	P015	64
334.00.01	P004	50	350.03.04	P015	64
334.00.13	P013	58	350.03.05	P015	64
334.09.06	P013	57, 58	350.03.06	P015	64
335.01	P003	44	350.04	P015	64, 65
335.01.01.02	P003	44	351.01.00.02	P001	40
335.02.00.00	0909	116	351.01.01.01	P006	55
336.02	0908	116	352.08	P015	65
336.03.01	0909	116	353.00.03.01	D011	21
336.03.02	0909	116	354.01.00	P004	50
337.05.00	P015	65	355.04.08	P015	61, 64
337.05.01	P015	65	355.05	P015	64, 65
337.05.02	P015	65	355.09.03	P013	57
337.05.03	P015	65	358.00	P003	47
337.05.04	P015	65	358.00.00	P003	47
337.09.05	0909	116	358.00.01	P003	47
	P013	57	368.03.00.04	P004	49
339.03.04.02	0401	91, 93	368.05.03	P001	40
339.04.06	0912	118	370.02.01	P008	56
341.00.00.00	P015	63	372.00.01	P001	40
341.00.00.01	P015	63	372.07.01	1509	138
341.00.01.00	P015	63	373.00	1506	136
341.00.01.01	P015	61, 63	373.03	P004	50
341.01	P015	63	373.08.00	1506	136
344	P003	42	374	1525	144
344.08	P003	42	374.00.00	1525	145
	P006	55	374.00.01	1509	138
344.08.00	P003	42		1525	145
	P006	55	374.09.00	P013	57

378.03	P015	63	554.07.01	0201	77
378.03.00	P003	46	554.07.02	0201	77
378.04	P003	45	556	P005	53
	P015	63	556.00.02	1601	148
378.04.00.13	P003	46	563 έως 566	P005	53
378.06	P003	45	563.00.03	P005	53
378.07.03.05	D005	17	570	1001	123
379.00.01.06	D011	22	570.00	1001	124
382.00	P003	45, 46		P005	53
382.00.00	P003	45	570.01	1001	119, 124
382.00.00.00	P003	46	570.04	1001	119
382.00.02	P003	45	570.06	1001	119
382.00.07	P003	45	571	P005	54
382.01.01.02	P013	57	571.01	1001	119, 123
382.09.01	P003	45	571.01.00	1001	124
382.09.10	P003	45	571.01.00.00	1001	124
382.09.12	P003	45	571.02.00	1001	124
382.09.14	P003	45	571.07	1001	124
382.09.17	P003	45	572.00	P005	53
382.09.21	P003	45	577.01	0903	113
383.06.04.01	1910	166	580.00	P005	54
383.11.03.01	1910	166	580.02	P005	54
386.04.08	P005	54	580.05	P015	63
389.04.00.08	P005	52	581	P005	54
389.04.00.10	P005	52	581.00.08	P005	54
389.04.00.15	P005	52	581.00.08.00	P005	54
391.09.00	P005	52	581.00.08.01	P005	54
393.00.04	0401	91, 93	581.00.08.02	P005	54
393...399	P003	46	583.07.19.00	P005	51
398.01	1911	169	585.01	0908	115, 116
398.02	1911	169	585.01.04	0908	115
398.03	P013	57, 58	585.01.05	0908	115
399.05	P004	494	585.03.01	1401	131
	P014	59	585.03.07	1401	131
501	P005	53	585.03.08	1401	131
501.00	1603	150	585.04.06	1401	131
512.00	1916	172	585.04.07	1401	131
515.02.01	P005	53	585.05.01	1401	131
515.03	P005	53	585.05.07	1401	131
517	P005	53	585.05.08	1401	131
519.01	P005	53	585.07.01	1401	131
	P014	59	585.07.02	1401	131
519.02	P005	53	586.02	P015	64
531.00	P003	45	586.02.00	P015	65
	P014	59	590	P009	57
539.00	P005	53	590.00	P009	57
551.00.01	P004	50	591	1806	156
552.03.04	0201	77		P001	40
553.00.02	0201	77		P005	53
553.00.05	0201	77	591.00	1506	136
553.00.06	0201	77		P001	40
553.00.07	0201	77	591.09	1806	156
553.00.09	0201	77		P001	40
553.01	0201	77	592 έως 593	P005	53
554.01.04	0212	82	626.00	1506	136, 137
554.02	0201	77	626.01	1506	136
554.03	P001	40		1509	137
554.07	P014	59		1520	143, 144
554.07.00	0201	77			

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Απριλίου 2023

Η Αναπληρώτρια Υπουργός

ΑΣΗΜΙΝΑ ΓΚΑΓΚΑ